In the 5th Edition of Mr Ray's Wisdom of God, in the Creation 8° Lond. 1709 page 245 is the following Paragraph.

Sixthly, & lastly, We shall only mention the Names of some other Vegetables which with eighteen or twenty Thousand more of that Kind, do manifest to Mankind the illustrious Bounty & Providence of the Almighty & Omniscient Creator towards his undeserving Creatures; as the Cotton Trees; the Manyoc or Cassava; the Potatoe; the Jesuits bark Tree; the Poppy; the Rhubarb; the Scammony; the Jalap; the Coloquintida; the China; Sarsa; the Serpentaria Virginiana, or Snake-weed; the Nisi or Gensing; the Numerous Balsam and Gum Trees, many of which are of late much illustrated by the great Industry & Skill of that most discerning Botanist Dr Leonard *Plukenet*. Of what great Use all these and innumerable other Plants are to Mankind in the several Parts of Life, few or none can be ignorant; besides the known Uses in curing Diseases, in feeding & clothing the Poor, in building, in dying, in all Mechanicks there may be as many more not yet discovered, & which may be reserved on Purpose to exercise the Faculties bestowed on Man, to find out what is necessary, convenient, pleasant or profitable to him.

41636/C

Dr Linnæus in his Bibliotheca Botanica before his Hortus Cliffortianus No. 8 has ye following Paragraph. Plukenetius Plantas raras & exoticas plures, quam alius ullus exhibuit, ut eo carere nequeat ullus in exoticis Plantis. Opus incomparabile.

Plukenet was born in 1642 & died 1706

Plukenet Phyt. V. Ph. Trans. 193 pa. 528

& No. 196 p. 618

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30414829_0001

10 D (17) 20495
4 Vol 2 12 6

John Innys
1754
Redland Court
Glouc.

"Dr. Leonard Plukenet, born 1642, a learn'd, critical & laborious Botanist. He wanted that Patronage to which his Merit entitled him, & seems to have felt the want severely. Towards the close of his Life, however, he is said to have obtain'd the Superintendency of the Garden at Hampton-court, & he was honour'd with the Title of Royal Professor of Botany. He probably died soon after the Year 1705. Great part of his Herbarium came into the Hands of Sir Hans Sloane, & is now in the British Museum. He made a Collection of 8000 Plants, which for his Time, was astonishingly large. Though he was in Possession of so great a Number of Plants, yet he

was not systematic enough to make any great Improvements in the Science"

— Uvedale L.L.D. the Friend & fellow-Collegiate of Plukenet, resided at Enfield, where he had a botanic Garden on the old walls of which, the Hieracium murorum is now said to grow. His Herbarium siccum is now preserved in the British Museum. Mr. R. Brown, has named a new Holland Plant, ^Uvedalia^ of the Class & order Didynamia Angiospermia. We have no particulars of his domestic or personal History, only that his Name was popularly pronounced Oodle. Petiver established a Genus, Uvedalia, now sunk in Polymnia. The Genus formed by Brown approaches Mimulus, nay he himself suspects it is scarcely distinct.

Linnaeus named a singular or odd kind of Plant, Plukenetia volubilis, of the Class Monoecia & order adelphia, in ~~honour~~ ^remembrance^ of Plukenet, with a view to express the singularities of ~~his~~ his Ideas.

LEONARDI PLUKENETII, M. D.

OPERA OMNIA BOTANICA,

In SEX TOMOS Diviſa.

41636/C 20493

LEONARDI PLUKENETII, M.D.

OPERA OMNIA BOTANICA,

In SEX TOMOS Diviſa;

VIZ.

I, II, III. PHYTOGRAPHIA,
IV. ALMAGESTUM BOTANICUM,
V. ALMAGESTI BOTANICI MANTISSA,
VI. AMALTHEUM BOTANICUM.

In quibus,

STIRPES

Illuſtriores minus cognitæ, Exoticæ,

Rarioreſque noviſſimè detectæ ad plures CHILIADAS deſcribuntur,

Tum Iconibus TABULIS ÆNEIS CCCCLIV.

Summa Cura depictis figurantur.

LONDINI:

Apud GUIL. & JOAN. INNYS, Regiæ Societatis Typographos, in Areâ Occidentali Divi Pauli, MDCCXX.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY


Collins ſculp.
LEONARDI PLUKENETT. D.M.
EFFIGIES Ætat: ſuæ 48 Año Dom: 1690

LEONARDI PLUKENETIJ.

PHYTOGRAPHIA,

Sive

Stirpium Illuſtriorum, & minus cognitarum

ICONES,

TABULIS ÆNEIS,

Summâ diligentiâ elaboratæ;
Quarum unaquæq; Titulis deſcriptorijs,
ex Notis Suis proprijs, & Characteriſticis
deſumptis, inſignita; ab alijs ejuſdem
Sortis, facile diſcriminatur.

PARS PRIOR.

MEMINISSE IUVABIT.



J. Collins fec:

Εμπειρον. εἶναι συμβουλεύω ἰατρὸν ἐπι διουτε
πάντων φυτῶν. Gal. de Antidot. lib. 1. cap. 15.

LONDINI. MDCXCI.

SUMPTIBUS AUTORIS

[illegible] of
[illegible] of [illegible]
of London [illegible] very valuable
[illegible]
[illegible] Supreme
p. [illegible] 58

[illegible] 11 more
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 240 [illegible] p. 17

-ble Henry Compton D.D.
consecrated Bp of Oxford
.1674 & on the 18th of Dec.
was translated to the See
ndon & departed this Life
lham July 7. 1713. & was
d in ye Church Yard —

- 13.6
10
4.3.0

HONORATISSIMO

et

ÆTERNUM REVERENDO

PRÆSULI ac DOMINO

DOMINO

HENRICO COMPTON

LONDINENSI EPISCOPO. &c. &c. &c.

Omnium Botanophilorum MECÆNATI *summè colendo.*

LEONARDUS PLUKENETIUS

Has suas TABULAS PHYTOGRAPHICAS *in priori Parte comprehensas.*

Quòd

HUJUS FAVORE ut plurimùm Illustrantur, submiſsâ cum observantiâ, in devoti animi teſseram, gratæq; mentis symbolum, VOTIVAS reddit, jure meritoq;


Offert. Dicat. Consecrat.

LECTORI BENEVOLO.


Natura parens sui studiosa, conservatrix, artis & pulchritudinis suæ, sibi conscia perditura fructum sui, si amplum hunc terrarum Orbem solitudini ostenderet, ut desiderium contemplandi fertiliſsimum stirpium apparatum, quem in ipsâ superficie subministrat nobiliſsima hæc quam pedibus calcamus Terra, in nobis excitaret & conservaret, Novitate animos nostros ad se allicit, dum indiès e varijs Asiæ Provincijs, & à Primoribus prorsùs incognitas in apricum producit plantas: Quamplurimi etiàm Europæ loci à Majoribus nostris non ritè examinati, Novas formas, Novasq; species, quotidie nobis suppeditant. Africa quoq; vel his nostris temporibus, monstra sua gignere non desijt: sed Novi aliquid ex Plantarum genere, semper ab extremis parturientis Africæ oris, ad nos adportatur. Nec hic Natura subsistit, sed continuè Novas ex alieno Orbe, in lucem profert plantas. Novæq; virtutes à filijs Artis, in salutem humani generis inveniuntur; Vigilant enim Sæculi nostri Botanici, qui (ut Cl. Raij verbis utar) nec Majorum inventis contenti, ad ulteriora tendunt, nec alios sibi inquisitionum terminos, & columnas figunt, quam quas Natura terris fixit, Universum Orbem curis suis complexi. Illi silicet stimulo mihi fuêre, ut nulli sudori, operæ, ac sumptui parcerem, quin tam indigenas, quàm exoticas stirpes inquirerem, atq; colligerem, quarum investigatio ab ipsâ Adolescentiâ, nobis amœniſsimâ varietate se commendarit; fateor equidèm Botanica in omni ævo, melioris luti Quamplurimis excoli; et in Arte medendi vel antiquiſsima est ratio, per simplices Herbas, morbos abigendi; Hujus enim Cognitionem ad Principes, etiàm & Magnates, pertinere, Salomonis (regum omnium quos Sol unquàm aspexit Sapientiſsimi) Alexandri magni, Mithridatis, Diocletiani, & aliorum docuêre exempla; Imperatores & Reges non pauci Heroesq; Inclyti, Indagationem, & peritiam hujus Naturalis Philosophiæ partis se digniſsimam judicarunt, rati se Herbariæ rei colendo studium, optimè de humano genere mereri, nec minus solidam, veramq; laudem indè, quàm ex Triumphis, ad omnem Posteritatem, nomini suo libare poſse; Hanc tanti fecerunt Ethnici, ut ejus Inventionem, Dijs dignam æstimarint, & licet dubitare videantur, de primo eorum Inventore, consentiunt, tamèn tandèm, Apollinem illâ prærogativâ maximè præeminere, his Poetæ verbis.

Inventum Medicina meum est, Opiferq; per Orbem
Dicor, et Herbarum subjecta potentia Nobis.

et semper fuit adeò incredibilis apud Antiquos existimationis Herbarum Scientia, ut æqualis censebatur gloria, Herbam inveniſse & Vitam juvaſse. Quicquid enim hujus Sæculi sentiunt alij, nobis satis persuasum, Studium hoc Botanicum neceſsariam eſse Physicæ & Medicinæ partem, multis jucunditatis, & Delectationum condimentis gratiosam, & toti generi humano, utilitate quam maximè commendabilem: Visum igitur fuit, ut Nobiliſsimæ Botanices Scientiæ, ulterius inserviam, Plantarum aliquot Icones non alibi expreſsæ, periergâ manu, et emodulatâ ad Plantarum ipsarum dimensiones naturales, proportione quâdam, effigiare, & adumbrare, et earum plures, compendij gratiâ, in unam Tabellam conjeci; Opus non minus varium, quàm ipsa est Natura, ubi Orientis & Occidentis Indiæ Montium, Sylvarum, Vallium, litorum & camporū, Stirpes nativæ, & alumnæ à nullo Claſsico Autore anteà celebratæ, sed prorsus Novæ, & hactenus inauditæ, oculis vestris obversantur; singulis etiàm hujusmodi Novis plantis, nomenclaturam, proprijs & genuinis Symbolis insignitam accommodavimus. ut quæ rem ipsam aptiſsimè notat, & clarior foret omnis earum Cognitio simul & Cognatio, quam insuper diſsimilitudinis collationis & similitudinis ope, inter Congeneres, & simillimas, iteratæ inspectioni, & ex Plantis ipsis expansioni, adaptavimus. Nam hæc omnia ex αὐτοψία didicerimus, non ut Nicander Colophonius, qui ab agro remotiſsimus, rustica aggredi, non veritus: neq; ut Pamphilus, quem Galenus reprehendit, quod eam non conspexerit; nè dum per Somnium viderit, de his tamèn scripserit: Has nobis vidiſse contigit omnes, & etiamnum præ manibus sunt, quas in Herbario nostro vivo, impræsentiarum conspicere licet, aliasq; permultas, & indictas habeo, quas tamèn in præsenti non exhibeo, quià Chartæ penuria, & typorum immodica deterrent impensa; neq; enim potest quis, ullam certam cognitionem sibi arrogare Vegetabilium, quæ nunquàm aspexit. Benevolus interim Lector has Tabulas Phytographicas æquo suscipiet animo, donèc Herbarij vivi Catalogus, Plantarum circitèr Octo millium comprehendens consequatur, nec dubito quin candidi Rei Herbariæ cultores, non solùm admiraturi sint, sed grati recolent, quod tot incognitas (octingenti ferè numerantur) in his Tabulis nostris duas in partes distributis, luci nunc damus, & si quid, vel etiàm Viris eruditioribus, unquàm Novitate suâ, se commendarit; Tabulæ nostræ Phytographicæ, Novi Orbis, Novis (ie) noviſsimè detectis, & hucusq; ineditis stirpibus, sunt refertiſsimæ, quibus amplum Exscriptoribus campum damus, in quo plantas legere poſsunt, easq; generali Plantarum Indici, seu Pinaci inserere, quæ in nostro Orbe jamdudùm innatuerunt; ex quibus omnibus non desperarem, nos Botanophilis perplacuiſse, & plurimas ab ijs gratias promeruiſse, tùm ob ea, quæ jàm præstitimus in hoc opere nunc edito, tùm ob ea, quæ præstituri sumus in Catalogo nostro, brevi edendo, ut hac ratione, votis meis ampliſsimè satisfactum iri arbitrarer. Utaris ergò Lector amice his nostris laboribus, quos [illegible] huic operi impendimus, ac stirpes hasce peregrinas, rariſsimas, & hactenus inauditas, quæ nunc exactis Imaginibus Orbi panduntur, adspicias, [illegible] omnibus inexhaustam Sapientiæ profunditatem, & Majestatem divinam in ipsis Condendis, comperies; His nobiscum ad Dei gloriam, tuamq; ac cæterorum utilitatem, & oblectamentum paratis, fruere pro otio, & incolumis age; Vale.



Tab. I.
f1. Abies Pinum referens folijs ex omni parte prorumpentib. Abies folijs praelong. ...
Hist. an Picea minor C. B. P. Pinus maritima minor ejusd. Cat. H. Ac. Lugd.
2. Absinth. minus odoratu Gangeticum, floribus Chamaemeli solitarijs, e foliorum alis.
3. Absinth. tenuifol. elegans ex Hispania; D.ris Turnefortij.
4. Acacia ō Spinosa Wagæ. Malabar. Similis è Maderaspatan. lit. a fol. ad justā magnitudinem ...
5. Acaciæ similis ō Spinosa ramulis alternis Maderaspatana. an Nili camaram. H. M. pro hujus Synonymo ...
Indicā arborea Zanon. ponitur à Breyn. Prod. i. cum Nellikam ejusd. huic magis convenire videtur.
6. Acaciæ quodammodo accedens, s. Ceratiæ & Acaciæ media Iamaicensis spinosa bigeminatis folijs,
flosculis stamin., atronitente fructu, Siliquis parum intortis. lit. a flosculos. b. Siliqua et fructum ...
Unguis Cati Arbor Americana spinosa siliquosa Par. Batav. Prodr.



Tab. II.

f. 1. *Acacia Maderaspat. spinosa* Intsiæ *accedens, cortice cinereo, ramulis communi pediculo binis. a. folium ad natural. dimensionē exprimit.*

2. *Acacia gloriosa Lentisci fol: spinos. flore spicato luteo, ſiliquâ magnâ muricatâ. Arbor exot. spinos. fol. Lentisci C.B.P. Inimboy Bras. Marcgr. Bonduch* Zanon. *Caretti* H.M. *lit. a. folium ad verā magnitud. cum aculeo sursûm spectante. lit. b. lobum spinis crebriorib; armatū indicat.*


3. *Acacia ō spinosa minor ē* Quaracoa *ſ. Curaſsavica fl. alb. globoso. fortē Tchoaxin* Mexcicens. *Hernand.*

4. *Acer virginianum folio majore subtùs argenteo, suprà viridi splendente. Acer floresc. Virginiana Vulgō. Arborē hanc magnitudine & proceritate eximiam* in Hort. D. Ioh. Tradescanti *Lambethæ ad Austrū jamolī enutritam ſæpè conspeximꝰ; sed eam ibi unquām floruiſse a nemine memoratum audiȷ̂mus.*



Tab. III.

1. Acer Benghalense Laurin. folijs fructu tergemino. totidem membranulis extantib; alato.
2. Adianth. alb. floridu. s. Filicula petræa crispa Ray Hist. Adianth. album crispū Alpinū Schwenckfeld I.B.
3. Adianth. folijs minutim in oblongum ſciſsis, pediculo Viridi. C.B.P. Ad. alb. tenuiſ. Rutæ murariæ accedens I.B.
4. Adianth. album florid. Cicutariæ folio Virginianū nostrum. D. Ray Hist. app.
5. Adiant. radicos. humisparsū. s. Filicula pellucid. nostras Coriandri foliolis mollicellis globuliferum Adiant. petræum perpusillum Anglicū folijs bifid. vel trifid. Newtoni Ray. Hist. forte Filicula saxatilis fol. Coriandri. Mentz. pugil.
6. Adianth. radicos. erectius foliolis imis biſectis, cæteris Vero in-tegris tenuiſsime crenatis. forte Filicula saxatil. Coriandri folijs rotund. leviter serratis Mentzel. pugil Rarior. Pl.



Tab. IV

f. 1. *Adianth. nigrum Chinens. tenuitèr diviſum, pinnulis minimis, obtusis, plerumq; bifidis.* Ray. Hiſt. app. ~~an Filix~~ *ſaxatilis crispa* Park. *lit. a. ramulum ad juſtam magnitudinem denotat.*

2. *Adianth. nigrū ſ. Dryopteris Chinensis lanuginosa* Ray. Hiſt. app. *an Lonchitis Maranthæ, Ceterach ramosum Quorund* Lob. Ic. *ſ. Polypodium Huons. Hiſt.* Lugd. *quæ ſecundùm utrosq; Bauhinos sunt unū & idem.*

3. *Adianth. Chinense perelegans ramos. folio flabelliformi cum rubedine perfuso. Adianthum folijs Coriandri ramosum* Ray. Hiſt. app. *has tres Adianthorum species habuit Cl. Rajus ab egregio Botanico & Pharmacopæo Londinensi* D.^no Iacobo *Petiver qui poſteà ad Icones exsculpendas, nobis libentèr conceſsit.*

4. *Æschynomene mitis ſ. Mimosa* De Tunquin *pinnulis amplioribus Chamæfilici marinæ æmulis. ſub* Ovali *titulo recepimus, foliorum formâ Tsjampangam* H. M. *haud multùm abludit.*



Tab. V.

f. 1. Æsch. mitis Americ. foliatis Acaciæ breviorib; Br. Cent. 1. Mimosa Americ. supina veluti spinulis exasperata, pinnis Acaciæ latiorib; & brevioribus ejusd. Prodr. 2.

2. Æschyn. mitis ſ. Mimosa angustiori ſiliquâ folijs perexignis Maderaspatana Æsch. folijs minimis nostra. Ray. Hist. app.

3. Alcea Indica frutesc. folijs ad marginem exasperatis Brijoniæ albæ divisuris. è Sinu Bengalens. allata est nobis.

4. Alcea ſpinos. Maderaspatana fol. profundè laciniatis, Cannabis in modum penta-phyllæa. ſaporis acidi àn Acetosa Indica Bonti. Huj; meminit Cl. vir & ſedulus exoticar. Pl. explorator D^r. Herman in Cat. H. Ac. Lugd. pag. 27.



Tab.VI.
f.1. *Alcea Cretica flore immaculati candoris peramplo. in Hort. Medic. D. Morgan Londini Suburbano, jam olim exculta fuit.*
2. *Alcea acetosa Indica mitis folijs superioribus Goſsipij in modum tripartito diviſis. Althæa Indica Goſsipij folio Acetoſæ sapore* CHAL.
3. *Altea Indic. Ulmi folio prægrandis, subtùs incana flore amplo purpureo, Althæa magna 5q. capsularis folijs integris subtùs albicantibus, floribus magn.* Banist. Cat. Virgin. apud. Ray Histor. *inferiora enim hujus folia ſunt prorsùs integra, ſuperiora tamen in lacinias ternas leviter inciſa, & aversâ parte albicantia.*
4. *Alcea s. Bamia American. parvo flore, petalis rotundioribus.*
5. *Anchusa lutea minor* C. B. P. I B. Park. *item Symphytum angusti fol. Apulum* ejusd. Park. *Anchus. echioid. lutea. Cerinthes flore, montana.* Col. ecphr.



Tab. VII

f. 1 Alcea Ind. fol. hastato, fl. parvo, purpur. longo petiola insidente, pericarp. compacto, duro in 5 q.q. cellulas, totidem semina includentes dispertito.

2. Althæa frutesc. Ind. Orient. Populi albæ minoris fol. tenuiter dentato molli. an Althæa Americ. frutesc. Populi alb. folijs Par. Bat. Pr.

3. Alsine Caryophylloid. tenui fol. fl. albo punctato. an Als. Caryophylloid. tenuifol. montana Lini flore Ray Hist. fortè etiam Polygonum Caryophylli Holostei flore Cat. H.R. Bles. Betonica. s. Tunicæ minimæ similis Planta I. B.?

4. Alsin. palustr. Ericæ folia Polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. Saxifraga palustr. Anglica Good=yeri Park. item Alsin. nodosa Germanic. ejusd. Park. Alsine nodosa Germanic. alias Arenaria. C.B.P. Arenaria I. B.

5. Alsine formis paludosa tricarpos flosculis albis inapertis. Alsine palustris Portulacæ aquatic. similis. Ray. Hist. Alsin. palustr. minima flosculis albis, fructu Coriandri exiguo Mentz. pugil. Portulaca exigna. s. arvensis Camerarij I. B.

6. Alsin. spuria pusilla repens folijs Saxifragæ aureæ Ray. Cat. Pl. Angl. Hujus notitiam Doctiſs. nostro Raio debem. proindè miratus sum quo casu in Celeberrim. Autoris Histor. Universal. hæc plantula omiſsa fuit.



Tab. VIII.

f. 1. Althæa fruteſc. folio acuto virente molli, flore ſpecioſo. an Althæa fruteſc. folio acuto flore magno Schol. [illegible] Althæa profundè ſerrato. ſ. dentato folio I.B. Althæa flore majore C.B.P. et fortaſſè eadem cum Althæa arborea Olbiæ Provincialis Advers. Lob. & Icon. Malva ſylveſtr. perennis folio profundè laciniato & dentato Moris. Hiſt.

[illegible] Althæa fruteſc. Bryoniæ folio incana flore minore. Althææ ſpecies quibusdam arborea altera, vel Bryoniæ folio I. B. Alth. ſempervirens Bryoniæ fol. Park. Alth. fruteſc. Bryoniæ folio; item Alth. fruteſc. folio acuto parvo flore C.B.P. Malva fruteſc. folio acuto auriculato Hederæ inſtar Moris. Hiſt. Althæa Olbiæ vulgò putata.

[illegible] Althæa fruticans Hiſpanic Aceris Monſpeſſulan. incanis folijs grandiflora ſaponis odore. Alth. fruteſc. folio rotundiore incano C.B.P. Alth. arboreſc. I.B. Alcea fruteſc. folio rotundiore incano Moris. Hiſt. item Malva Hiſpan. folijs mollib; undulatis in margine ſuperiùs micis ſulphureis ad ſolem lucentibus donatis ejusd. Moris. Hiſt. quoàd deſcriptionem; at in Tabul. huic Titulo alterius Icon ſubſtituitur, Althæa Provincialis Penæ Advers. ex ſententia D. Ray Hiſt. 603.



Tab. ix. f. 1. Alsines facie myosotis Bisnagarica frutescens flosculis pallidè flavescentib; cujus folia sunt ad caulem alterno positu, (non per intervalla geminata) incana, hirsuta; flosculi quidèm ut Anagallidis, non tamèn cærulei, alioquin haud admodùm diversi nimis incautè est enim reverâ Convolvuli minimi species Bisnagarica.

2. Althæa Indica latiori folio cordiformi, ad summum sinuato. Malva Indica frutescens folio cordato P.B.P.

3. Althæa rostrata Cormandeliens. Pimpinellæ major. fol. subrotundo.

4. Althæa fruticosa minor Gangetica folijs exignis margine spinosis.

5. Althæa Ind. floscul. parvis folliculatim (fortè fasciculatim) ramulis adfixis. Breyn. Prodr. 1. Malva American Carpini folio, florib; aureis fasciculatis parvis P. B. P. è Maderaspatan nobis allata est.

6. Althæa Virginian. bidens Pimpinellæ maj. acutiore folio, flosculis minimis luteis. fortè Alcea Mori folio Virginian. min. Sch. Bot.





I. Collins. de: & f:.

Tab. X.

f. 1. *Amaranth; albus Gangeticus Salviæ angustis folijs paniculâ conglomeratâ. an Amarant. Alopecuroid. Indicus frutesc. lanuginos; folijs Salviæ angustiorib; & longiorib;* Br. Prod. 2? *Salvia Amaranthoides Mich. Nutij Fascic. Herbar.*

2. *Amarant. Ind. min. lanuginos. Sampsuchi folijs, spicâ albâ ad foliorum exortum gemellâ. an Amarant. Alopec. Ind. frutesc. lanuginos; folijs Salviæ latiorib; & breviorib;* Br. Prod. 2?

3. *Amarant. verticillat; min. Bengalens. Serpyll. folijs incanis.*

4. *Amarant. spicat; Dictamni Creticæ folio Maderaspatenſis.*

5. *Ambrosia maxima inodora Marrubij aquatic. folijs tenuitèr laciniatis Virginiana.*

6. *Ambrosia (forsàn) è Chinâ Anguriæ folijs accedens. à D.no Petiver recepi.*



1. *Ammi majus exoticum folijs per ambitum eleganter inciſis. an Ammi alterum ſemine Apij* C.B.P. *Ammi odore Origani* I B. *noſtra folia à Dauco Cretico* Zanon. *haud multum abludunt.*

2. *Amomum Virgin. Evonymo Virgin. ſimile, florib;* & *fructu ſparsim erumpentib; Amomum Virginianum Cornifœminæ facie* Ray Hiſt.

3. *Amygdalus Indica nana.* Cat. H.R. Paris. *Amygdalus pumila* Cat. H.R. Bles.

4. *Amygdalo-perſica nana flore carneo pleno Africana. Perſica Malus Africana nana flore incarnato pleno* Cat. H. Ac. Lugd. *hujus ramulum a. floribus onuſtum denotat. munere Nobiliſsimi Domini Henrici Baronis de Colrane hanc primum accepimus.*



Tab. XII.

f. 1. *Angolam forte* H. M. *Arbor Indica baccifera fructu umbilicato, rotundo, Cerasi magnitudine, dicocco.* Ray Hiſt. *ē sinu Gangetico nobis advenit.*

2. *Anisum Africanum fruticeſcens folio, & caule, rore cæruleo tinctis. Ferula fruticosa sempervirens folijs Anisi Galbainfera, ex quâ Galbanum Officinarum* P. B. P.

3. *Anthyllis s. Alsine maritima lignosior Anthylloides, folijs tomentosis Bisnagarica.*

4. *Antirrhinum purpureum multicaule, folijs tenuiſsimis, sursūm inflexis, florib; sparſis, calyce spinulis asperato.*



Tab. XIII

f. 1. *Apocynum Canadense maximum flore minimo herbaceo* Cat. H.R.B.les. *itèm Apocyn. Virgin. flore herbacco, siliquâ longiſſimâ, & tenuiſsimâ* Moriſon. Præluđ. Botan.

2. *Arbor Aristolochiæ folijs Maderaspatana fructu parvo, Medicæ adinstàr involuto. an Gummi Elemi fundens Arbor Orientalis?*

3. *Arbor baccifera Orientalis, folio rhomboide, fructu calyculato. Caſsia Cinamomea s. Canella de mato.* Linschot. part. 4. Ind. Orient.

4. *Arbor è Cormandèl vasculifera folijs amplis Mijrsinites rigidiorib; nostra* Ray. Hist.



Tab. XIV.

f. 1. Arbuscula Bengalensis, Aceris minore folio incano alternatim posito.

2. Arbuscula è Maderaspatán folijs Aceris alternâ vice lucidè virentibus.

3. Arbuscula Zeylanica Aceris folio baccifera, folijs è directo, magis angulosis.

4. Arbuscula Bisnagarica Aceris folio parvo aculeata, folijs è regione binis

5. Arbor aromatica è Corimandèl Laurinis folijs binis ternisve. nostra D. Ray Hist.

6. Arbor Prunifera. sphærulas saponarias ferens tetraphylla, ex Ind. Orient. an Saponaria Arbor Zeylanic-trifolia semine Lupini: Conghas Zeylanensib; P. B P.

7. Aster Americanus frutescens Satureiæ folijs scabris floribus amplis, saturatè Violaceis.



Tab. XV.

f. 1. *Artemisia Chinensis cujus mollugo Moxa dicitur, fortè Ytzecuinpatli Mexic.* Hernand. *an Artemisia Virginiana* Park?

2. *Aristolochia Violæ fruticos. folijs virginiana, cujus radix Serpentaria dicitur.*

3. *Asarum è Terrâ Mariana Violæ luteæ vel Asarinæ folijs, Serpentaria nigra Nostratib; dicta.*

4. *Asparagus aculeatus minor sarmentosus è Maderaspatan.*

5. *Asparagus (fortè) aculeatus major spinas plurimas ab eodem exortu pro folijs ferens. an Asparag; aculeatus Siculus Raij Hist.? an Spina umbellâ folijs viduâ C B P.? Drypis Theophrasti Anguillaræ I B?*

6. *Aster exoticus* Hyoseridis *folio minore noster D. Ray Hist.* app.

7. *Aster African; Stœchadis inodoræ folijs incanis flore albicante. Aster Afric. Stœchad. folio noster* Ray H. app.

8. *Aster Bengalensis omnium minimus, summo caule biflorus.*



Tab. XVI.
f. 1. *Aster luteus latifol. glaber foliis rigidis, & minutiſsimè crenatis. an Aster luteus folio glabro & crenato C.B.P.*[2] *ubi Synonyma huic Plantæ à Casp. Bauhin. malè sunt appropriata.*


2. *Aster peregrinus Cisti folio non crenato, flore magno luteo. an Aster odoratus flore luteo stellato exoticus* Cat. Pat. à Turre: *fortè. Aster Conyzoides luteus perennis* Icon Roberti.

3. *Aster luteus fœtidus Crithmi Chrysanthemi. folio, florib; umbellatis. Iacobæa Crithm. litorei folijs* Catal. H. R. Bl. *Iacobæa fœtida Crithmi Chrysanth. facie Brunÿeri.* Cat. H. Ionq. *Iacob. Rosmar. fol. Quorund.*

4. *Atriplex maritima Mauritanica frutescens, Polygoni folijs argenteis racemosa. Atrip. marit. Mauritan. fol. Polÿgon. argent. semine amplo fusco vasculis rotundiorib; nostra* D. Raÿ Hist. append.



Tab. XVII.
f. 1. *Bellis montana incana & crenata, folijs & crenis obtusis. an Bellis montana folio obtuso crenato. C B Pin ? in Prodr.? Bellis sylvestris folio craſſo & villoso. Sch. Bot.? ubi ponitur pro nondùm descripto.*
2. *Bellis Americana procerior serotina ramosa flore ampliſſimo Cat. H. Ac. Lugd. an Bellis radice repente, folijs latiorib; serratis. Cat. H. R. Bles. fortè Tlally-yetl. Nov. Hispan. Hernand.? Bellis Indica maxima C. H. Ac. Pat. Turre.*
3. *Bellis montana folijs Coronopi lacinijs s. denticulis rarioribus & magis extantib; an Bellis Alpina folijs profundè diſsectis Sch. Bot.? Bellis leucanthemia (s. Anthemis) fruteſcens folijs profundè laciniatis Breyn. Prodr. 2. Bellis montana folijs Chrysanthemi D.ris Magnol ejusd Breyn. ibid. Bellis chrysanthemi segetu folio D.ris Hans Sloan. Ray Hist.*
4. *Bellis pumila crenata Agerati æmula, crenis bicornibus asperiusculis. Bellis maritima folijs Agerati C B P & in Pr.*
5. *Bellis montana Tanaceti folijs caule singulari annua. Chamæmelo affine Buphthalmum Italicum segetum altiſſimum I B.*
6. *Bellis Alpina Parthenij folijs elatior.*



Tab. XVIII.

f.1 *Biti Malabaricæ accedens Arbuscula Maderaspatana flore peculiari.*

2 *Blitum Africanū Calthæ. palustris folio caule nudo cubitali spicam peda=lem & amplius sustinente. Petasites Africanus Calthæ palustris folio* Cat. H Ac. Lugd. *Petasitidis folio Bliti fructu D.* Ray Hist append.

3 *Bugula cærulea Alpina Park. Consolida media cærulea Alpina* C B P. & I B. *item Consolida media Genevensis ejusd* I B. Histor. Universal.

TAB.XIX.




Fig. 1.

Tab XIX

f. 1. Carduus Andelusiacus spinoſiſsim; echino grandi aculeis rigidis armato noster D. Ray. Hist. append. *é Regno Andelusiæ, (ubi & ipse collegit) hanc elegantiſsimam Cardui speciem mittebat ad nos Ornatissimus Vir & nobis amiciſsim;* D. Ioh. Fishwick.



Tab. XX.

f. 1 *Christophoriana arbor aculeata Virginiensis. Angelica arborescens spinosa s. Arbor Indica Fraxini folijs cortice spinoso* Ray Hist. *Arbor spinosa Fraxini folijs Virginiana.* D. Edward. Morgān. *Angelica arbor vulgō. lit. a. folium hujus, naturali magnitudine dimidio minus. b. seminum Umbellas indicant.*



Tab.XXI.

f.1. Chrysanthemum Americanũ Doronici fol. & Persici coloris, umbone magno prominente, ex atro-purpureo, viridi, & au-
reo, fulgente, an Bellis Canadensis purpurea Ciafsi Fasc. Herbar. Mich. Nuov. p. 22

2. Chrysanthem. Canadens latifol. humilius, Moris. Præludi. Bot. Chrysanth. Canadens. humilius. Boccon de Pl. Sicul. Aster Virgi-
neus luteus alter minor. Park.

3. Chrysanth. African. Asteris facie, uno flore non folioso, capitulis duris.

4. Chrysanth. Bengalense augusti-foliũ pusillum. summo caule ramosum.

5. Chrysanth. segetum nostras folio glauco multisciſso maj; fl. minore.

6. Chrysanth. tenuifol. flore luteo subtus purpurascente. Buphthalmu. tenuifolium folio Millefolij fere I.B. Bup-
hth. caule & folio purpurascente C.B.P. Buphth. flore purpurasc. Park.

7. Chrysanth. Smyrnæum Cotulæ folio, flore amplo nudo seminib; hispidis, ad capitula in orbium spiras circumdatis.
an Chrysanth. Valentinum, Clus (i.e) Buphthalmum lanuginosum folijs Millefolij C.B.P. Elegans hæc planta cujus foli-
ia aliquandò lanugine obducta invenimus ex semine in Cabis s. Corbulis quibus Ficus & Uvæ passæ è Smyrnâ ad nos transpor-
tantur, disperso & indè collecto, enata; Angliæ primò & nostræ demum notitiæ acceſsit.



Tab XXII

F. 1. Chryſanth. Scrophulariæ folijs Americanum.

2. Chryſanth. Cannabinum Virginian. hirſutum, diſco nigro, petalis aureis radiato. Chryſanth. ſ. Flos ſolis laciniatus annuus umbone nigricante D. Bobart. an Eupatorium Cannabinum Americanum flore aureo Cat. Hort. Reg. Bles. lit. a.a. ſummum ramulum ſuis floribus ornatum denotant.

3. Chryſanthemum Peruvianum flore albo Cat. Hort. Lips. olim. edit.

4. Chryſanth. Chinenſe folijs plurifariam diviſis. Halicacabi peregrini æmulis; Chryſ. fol. multifidis Cicutæ nonnihil ſimilibus Virginianum Cat. H. Ac. Lugd. Chryſ. Cannabinum American. frutesc. Virginianum Sambuci laciniatæ folijs & facie Breyn. Prodr. 2. è Chinâ ad D. Petiver allata est hæc elegans planta, & ab illo nobis amiciſſimè communicata.



Tab XXIII

f. 1. *Campanula Cymbalariæ folio Park. Camp. Cymbalar. fol. vel folio hederaceo C.B.P. Campanul. folio hederac; species* Cantabrica Anguillaræ. I.B.

2. *Cicer Astragaloides (fortè) virginianum, hirsutie pubeſcens florib. amplis, subrubentibus. an Cicer montan. lanuginos. erectum* C.B.P. D. Banister Cat. Stirp. Virgin.


3. *Cistus American. Chamænerij folijs lucentib;* ex Hort. D. Morgan. *an Tzatzoqua Mexicens.* Hernand.

4. *Cistus Chamærhododendros folijs confertis, ferreà rubigine nitentib; margine pilosis.*

5. *Cistus Helianthemos argenteus folio latiore, flore saturatè luteo. Helianthem. Alpin. folio Piloſellæ minoris Fuchsij IB. ex sententia D. Raij et fortè Cistus helianth. folio Polij. montan.* ejusd. *item Cistus pusillus folio candido, flore luteo,* ejusd. *IB. ex mente* ipsius Ray. Hist.

6. *Cistus humilis Alpinus durior, Polij nostratis folio candicante. Chamæcistus montan; Polij folio noster* D. Ray. Synops. Stirp. Brit. *an Chamæcist, folijs Myrti Tarentin. canis & cinereis IB.*

7. *Cisti Helianthemi folijs, planta Maderaspatana, floribus ex alis. an Vitis Idæa Cisti helianthemi folijs Maderaspatana.*



Tab. XXIV.

f 1. *Clinopodium birginianum angustifoliū. fl. amplis luteis, punctis purpureis. Clinopod. Virgin. angustif. flore luteo* Cat. Hort. Ac. Lugd. *Origanum floribus amplis luteis purpuro-maculatis, cujus caulis sub quovis verticillo decem vel duodecem. foliolis rubentibus est circumcinctus.* D. Banist. Cat. Stirp. Virgin.

2. *Conferva reticulata crispa.* D. Doodij Ray Hist. app.

3. *Convolvulus angustiſsimo folio nostras cum auriculis. an Convolo. arvensis minim;* D. Dent Ray. Synops. stirp. Brit.

4. *Convolvulus maritim. s. Soldanella* è Maderaspatan; *folio in summitate sinuato. an Convolv. marit. Zeylanic; folio crasso cordiformi* Cat. H. Ac. Lugd. *Bintamburù Zeylan.*

5. *Convol. maritim; majore folio Chinensis. an Sarsa litoralis. s. Convol. maxim; Braſilies.* Pison:

6. *Convolvuli instar Volubilis è* Coromandel *umbilicatis folijs craſsis acuminatis, villosa. an Pada-Valli, s.* Pada Kelengi *sive Muschega-Pada* H M. P. 7? *forte ad Brijoniæ genus, potiori jure releganda.*




Tab. XXV.

f. 1. *Convolvulus American; sub Ialapiæ nomine receptus. an Convolvul; Colubrinus Piſon? Conpèba s. Convolvul. Braſilian; flore octapetalo monococcos* Ray. Histor?

2. *Convolvul; s. Volubilis Americ. Bryoniæ nigræ nervoſis fol. vasculis ſeminiferis, triquetris. Helxine fruticeſcens Bryoniæ nigræ folijs, capsulis triquetris amplis, pergamenis.* D. Banist. Cat. stirp. Virgin. *an Capreolata Bryoniæ nigræ folio Braſiliens. tricocca* Marcgrav.

3. *Convolvulo similis Bryoniæ albæ folijs villosis, ex India Orientali. an Nehoemeka* H. M. P 8. *Tab* 19? *Hæc autem pro synonymo Bryoniæ Zeylan. folijs profunde laciniatis* Cat. H. Ac. Lugd. à Cl. Comelino *ponitur.* Annot. in loc.

4. *Convolvulo similis villosa, folijs craſsis, subrotundis, è Maderaspatan.*



Tab. XXVI

f. 1. *Corallina latifolia & Opuntia marina* Cortus. *Fucus folio rotundo* C.B.P. *Sertolaria* Imperati, *Scutellaria s. Opuntia marina* I.B.

2 *Corallina fistulosa fragilis, internodijs prælongis, lævibus, albis, Farciminum modo catenatis, Corallina fistulosa fragilis* I.B.

3. *Cornus virginiana flosculis plurimis albidis ex involucro tetrapetalo rubro erumpentibus*, D. Banist. Cat. Stirp. Virg. apud D. Ray. Hist


4. *Cucumis Bryonoides Bisnagarica fructu parvo, florum calyce muricato.* an *Mucca Peri*. H.M.P. 8.

5. *Cuscuta ramis Arborum innascens* Caroliniana *filamentis lanugine tectis*, Musæi Courteniani.

6. *Cuscuta lendiginosa tenuiſsimis cirrhis* è Terrâ Marianâ. *Cuscuta Americana super arbores se diffundens*, Ray Hist. app.

7. *Cytisus Americanus flore luteo spicato; folijs suprà virentibus, glabris, subtùs lanugine argentatis.*

TAB. XXVII.



Tab. XXVII.

f. 1. Elichryſo affinis Peruviana fruteſc. Cat. H. Ac. Lugd. app. Agerato affinis Peruana frutescens Parad. Bat. Prod. Quinquina. s. Arbor amara & Febrifuga quibusd. falsō & faſtuoſe nuncupata.

2. Elichryſo affinis virginiana frutescens folijs Chenopodij glaucis. Senecio frutescens virginiana Atriplicis folio Raij Hist. & app.

3. Ephemerū Bengalense serpens folio subrotundo brevi phalangoides. an Ephemerum Africanū annuum flore dipetalo Cat. H. Ac. Lugd. Dipetalos virginiana folijs Gentianæ, aut Plantaginis Marcgr. Raij Hist.? fortē etiam Gentianella Indica. Bontij. p. 154.


4. Ephemerū Phalangoides Maderaspatens. minimum folijs perangustis perfoliatum, fortē Acaxaxān. s. Potamogeiton Mexiocan. z. Her=nand. Planta palustris & lenta, quæ statim comprimentib; cedat digitis, hūc etiam pertinet Tali-pullu. H. M. P. 9. T. 63. p. 123.

5. Euphrasia lutea latifolia palustris. Raij Hist. an Cristæ Galli affinis planta Romana, s. Crista Galli major Italica I. B. quærit & ipse Eruditiſſ. Rajus ubi supra.



Tab. XXVIII

f. 1. Euphrasia. s. Cratæogonum folijs brevibus obtusis Vestmorlandicum Ray Hist.
2. Euphrasia pratensis minor purpurea Park. *Euphr. purp. min.* C.B. Prodr. *Euphr. 3.a non scripta* Fab. Col. ecphr.
3. Ericæ facie Polygonoides summitas cum floribus.
4 Ericæ facie Polygonoides Africana pentapetalos, viticulis increberrima capillamenta squammulis conflata diffusis, Limonium ferulaceo folio, Grisley Virid. Lusit. *ut humaniſsime nos monuit D. Gulielm; Sherard. Collegij S.ti Johannis in Academ. Oxoniens. socius, & Phytognostes peritiſsimus, cujus munere summitatem accepi, ramulum autem à D. Iohanne Fishwick. ad maritimas Africæ oras à seipso collectum & ad nos transmissum, obtinui.*
5 Evonymus virginian; rotundifol. capsulis coccineis eleganter bullatis Banist. Cat. Stirp. Virg. *lit. a. a. semina ad natural. magnitud. demonstrant.*
6. Evonym. Jujubinis folijs Caroliniensis, fructu parvo ferè umbellato. b. b. semina ad æqualem dimensionem significant. à foliorum similitudine cum Rhamno Cathartico (ni fallor) hæc planta, Spina Cervina Barbadensibus nostratibus nominatur.



Tab. xxix.

f. 1. *Ficoides. s. Melocactos mamillaris glabra, sulcis carens, fructum suum undiq; fundens. àn Echino-melocactos minor lactescens absq; tomento, cylindris laxiorib;* Parad. Bat. Prodr.

2. *Ficoid. s. Melocactos minim. lanuginos; spinis mitioribus fructu sparsim egrediente. àn Echino-melocactos tuberosus, s. globularis min.* Cat. H. R. P.

3. *Ficoid. Americanū. s. Cereus erectus cristatus folijs triangularib; profundè canaliculatis. Cereus spinis crebrioribus horridus* Ray. Hist. *Jamacarū prima* Pison. Hist. Lusitan. *Cardòn. àn Planta pinnata arundinacea* Park. Theatr.


4. *Equisetum s. Hippuris lacustris, folijs mansu arenosis Gesnero* Ray. Hist. *Hippuris coralloides Ger. emac.*

5. *Frutex Cormandeliensis baccifer Mali. Granatæ folijs amplioribus. noster* Ray. Hist. 1801.

6. *Frutex Gangetic; Alaterni folio spinosus. Frutex aculeatus Orientalis Ilicis folio noster* Ray. Hist.

7. *Frutex Bisnagaricus spinosus, Coryli folijs densis, spinis brevioribus craſsis.*

TAB. XXX.



Tab. xxx. 1. Filix. ampliſsima lobis foliorum lacinialis Cambrica. Polypodium Cambrobritannicum pinnulis, ad margines lacinialis Raÿ. Hist.

2. Filicis. ē Chinâ genus molle, auriculâ ad pinnulæ basim supernē productâ, summo folio longiūs mucronato.

3. Filix. s Polypodium Indianum folijs profundē sinuosis Marrubij aquatic. æmulis. an Filix Indica Osmundæ facie Bod. ā Stāpel. in Theophrastū Sim. - Paul. Quadripart. Botan. 302.

4. Filicifolia, Lonchitis aspera maxima Indorum.



Tab xxxi

f. 1. *Frutex baccifer. è. Cormandel Rorismar. obtusis & veluti punctat. fol. plurimis, ex uno tuberculo provenientib, vid.* Raÿ Hist. p. 1801. *an bilis = Idææ spec. Indicæ Orientalis.*

2. *Frutex baccifer folijs Lini, vel Caſsiæ Poeticæ Maderaspatensis. noster.* Raÿ Hist.

3. *Genista tinctoria Maderasp. Rorismar. folijs ad caulem radiatis. an Legumen cujus siliquula à.* D. Terentio *ex Indiâ missa, & = titulo herbæ Anil inscripta fuit.* CBP. *Glasto affinis ejusd.* CBP. *Anil. s. Nil, Indorum color.* IB. *Anil herba folijs Mungiriqua similis* Garziæ. *Anil. s. Indigo, Gali, s. Nil, Herba Rorismarini facie,* Linschot. part. 4. Ind. Orient. *Genistæ Iluensi* Lugd (*h. e.*) *Genist. radiatæ, vel stellari* IB. (*i. e.*) *sparto triphyllo* CBP. *baldè similis, si non eadem. Huic etiam proxima est Cytisus, = acuminatis folijs,* CBP. *quoàd* D. Turnefortui *monente* D. Sherard (*i. e. nostrâ sententia*) *Cytisus Indicus flore luteo hirsulus Cat. Patav. à Turre. Cytisus folijs argenteis flore luteo vulgò. Nostræ caulis angularis est, proindè eam ad Genistarum genera magis propriè disponendā. arbi = tramur; Quam ut audio præparant prô cærulei coloris tincturâ in Regno* Bisnagar, *alijsq; in locis Indicæ Orientalis.*

4. *Geraniū pusillū supin. marit. Alth. aut Betonic folio nostras* Raij Hist. *Geran. minim.* procumbens *folijs Betonic.* Moris. Hist. 2.

5. *Gnaphal. Lusitan. comis argenteis. an Chrysocome Syriaca candidiſs. florib; Breijn. Pr. i. fortè etiam Gnaph. maj; angust. oblongo folio al = terum* CBP. *Filago Germanic. altera secundùm folia florida,* Lob. Icon.

6. *Gnaph. maj. lato oblongo fol.* CBP. *Gn. 2m Plateau.* Clus. Hist. *Gnaph. ad stæchadem. citrin. accedens* IB. *Elichryson silvestre latifol. capitulis cong: lobatis* CB. Phyt.

7. *Gnaph. impium. s. Filago dicta Cap. Bon. spei. Gnaphalio Plateau 3°. simile genus, sed diversum.*



Tab. xxxii.

f. 1. *Gramen Arundinaceum Halepense, Tragopogonis fol. paniculâ miliaceâ, huj; exemplar eximij Botanici D. Iac. Bobart Hort. Academiæ Oxon. Præfect. communicatione in Herbario noſtro vivo servatur.*

2. *Gram. paniculat. Gallo-provinciale Aquilegiæ semine, Schol. Botan. a D. Gulielmo Sherard accipiebam.*

3. *Gr. junceum aquat. paniculis cum fol. capillarib; simul e tis proliferum. an Gr. junc. capsulis triangul. cauliculi tenuib; folijs ad nodos, & paniculorum divaricationes prælongis, Ray Hist.*

4. *Gr. Alopecuroid, spicâ max. Ind. Orient. Gr. Alopecuroid Indic. max. Ray Hist. est panici genus.*

5. *Gr. parvum repens. δυσαχυόφορον. Iamaicense spicâ longiori compreſſâ.*

6. *Gr. Μυλοικόφορον ὀξύφυλλον. Carolinianum, s. Gr. altiſsi panic. maximâ speciosâ, e spicis majorib; compreſsiuſculis utrinq; pinnatis Blattam molendinariam, quodammodò referentibus, compositâ; folijs convolutis, mucrone, pungentib; an Gr. marit. max. Curaſsavic. paniculis divisis P.B.P. hujus ad exsculpend. nobile specimen nobis dedit Insignis & in omni Naturali scientiâ vir, magnâ judicij soliditate, si quis alius præcellens D. Gulielm; Courtene, olim condiscipulus, & semper mei amiciſsimus.*

7. *Gr. exile duriusculū marit. foliolis circumvolutis veluti junceis brevibus. Gr. pumilum Loliaceo simile, Ray Synop. Stirp. Brit.*

TAB. XXXIII.



Tab. XXXIII.

1. *Gramen spica Brizæ minus*, C B P. I B. Park.
2. *Gr. hordeaceum à maritimis pumilum. Gr. secalinum palustre, & maritim.* Ray Hist. *an Gr. Hordeo disticho simile* C B P.
3. *Gr. caninum marit. spicatum* C B P. *Gr. can. mar. spicat. Monspeliens.* Park. *Gr. can. marit. spicat. Casparo Bauhino* I B.
4. *Gr. marit. spica loliaceâ fol. pungentib; nostras. an Gr. sparteum spicat. fol. mucronatis, vel spica Secalinâ* C B P. *Spartum spicatum pungens Oceanicum* I B.
5. *Gr. Phalaroid. spica brevi reclinatâ ex utriculis prodeunte, an Gr. Phalaroid Lusitanic.* Ray Hist.
6. *Gramen Alopecuro; accedens ex culmi geniculis, spicas cum petiolis longiusculis promens. Gr. serotinum arvense spicâ laxâ pyramidali*, Ray Hist.
7. *Gr. mont. hirsut. folijs. spicâ leucophæâ diruptâ. Gr. pumilum hirsut. spicâ purpuro-argenteâ molli nostras* Ray Hist. *His duab; novissimè memoratis Graminum specieb; multis aliis nos ditavit ex propriâ collectione amicissimus vir D. Samuel Doody. Pharmaceutices & Rei Herbariæ callentissimus.*
8. *Gr. typhinum marit. minus* Ray Hist. *an Gr. typhin. Danicum minus* Park. *quærit & ipse Clariss. Rajus.*
9. *Gr. parvum præcox spicâ laxâ canescente* Ray Cat. Pl. Angl.
10. *Gr. paniculat. bromoid. minus, paniculis aristat. unam partem, spectantib;* Ray Hist.

TAB. XXXIV.



Tab. xxxiv.

f. 1. Gr. arundinaceum parvum procumb. paniculis non aristatis Ray Hist. Pl. univers.

2. Gr. capillaceum locustellis pennatis non aristatis. Ray Hist. Gr. junceum Dalechamp. pij. Hist. Lugd. Gr. foliolis junceis brevioribus radice nigra a & alba C.B. pin. & pro.

3. Gr. cyperoid. angustif. spicis parvis sessilib. in foliorum alis Ray Hist.

4. Gr. cyp. elegans spicâ compositâ. Ray Cat. Pl. Ang. ubi ad spicam (dicit) nullum apponitur folium, & in Hist. (spicâ compositâ asperiore) legitur. nostri tamen spica mollis est, & foliolum ei subjectum habet

5. Gr. cyp. polystachion flavicans spicis brevib. prope summitatem caulis. Ray Hist.

6. Gr. cyp. polystachion lanuginosum Ray Hist. an Gr. cyperoid. Norvegicum parvum lanosum. Park.

7. Gramini cyperoidi ex monte Ballon simile, spicâ total. e plurimis spicis composita Ray Hist. an Gr. cyp. elegans multiflorâ spicâ Park

8. Gramen cyper. ex monte Ballon simile humilius, in maritimis & arenosis nascens, Ray Hist.

9. Gr. cyperoides spicâ simplici compressâ distichâ D. Plukenet. Ray Synop. Stirp. Brit. & Hist.

10. Gr. cyp. minimum seminib. deorsum reflexis, pulicisformibus Ray Hist.

11. Gramini Luzulæ accedens glabrum in palustribus proveniens paniculatum, an Gr. cyp. palustre [illegible] Ray Hist.



Tab. XXXV.

1. Gr. junceum clavatum minim. s. Holosteum paluſtre repens, folijs, capitulis, & ſeminib; Pſyllij Raij. Synops. Stirp. Brit. & Hist. à Reverendo viro D. Matthæo Dodsworth, Evangelij prædicatore vigilantiſsimo, & Botanicorum numero nequaquàm postremo. nobis primùm ostenditur.
2. Gram. junceum. s. Holosteum minimum paluſtre capitulis quatuor longiſsim. staminib; donatis Raij. Syn. Stirp. Br. & Hist.
3. Guaiacum Jamaicense Lentisci subrotundis folijs lætè virentib; flore albo. Guaicũ Officinar. Parad. Bat. Prod. Guaiac. folijs Lentisci = C B P. Guaiaci ramulus Clus. ad Monardem. Guaiac. Terentij apud Hernandez.
4. Guaicũ Jamaic. folijs veluti muriâ conditis, ſpiſsiūs virentib; flore subcæruleo. an Guaiacum folijs Ceratoniæ, Aceris. s. Burſæ pastoris fructu, flore cæruleo Breyn. Prodr. 2.
5. Gratiolæ affinis è Coromandel folijs ſuperiorib; Rubiæ quadrifoliæ crenatis, imis Coriandri modo tenuiſsimè divisis.

TAB. XXXVI.



Tab. XXXVI.

1. *Halimus humilis erecta seminefolliculis membranaceis bivalvib. in latitudinem porrectis & utrinq. recurvis, longo pedunculo insidentib. clauso. Hal. angustif. semin. ib. singularib. vasculis Bursæ pastoricæ æmulis bicornib. inclusis.* Ray Hist. app. *an Halim. min. Germanic.* Park. *Halim. min.* CB. pin. *et Halim. aureani ejusd. prodr. hanc etiam in maritimis Belgicis nuperrime invenit Spectatissim. vir. et Rei Herbariæ amantissimus, D. Carol. du Bois cuj. ramuli summitas salis infeliciter exsculpta apud Joh. Bauhin. ad Portulacæ marinæ fruticosæ Iconem appingi videtur. itemq. apud Bodæum à Stapel. Annot. in Theophr. pag. 509.*
2. *Hedera monophylla Convolvuli folijs virginiana. Clematis hederacea virginiensis umbilicato folio flore papposo* Cat. HRP. *Hedera virginian. Clematis facie, radice flavescente.* Cat. HAL. *si huj. flores pappis coronantur ad Clematitis genus amandari debet multoties hanc plantam nos florentem vidim. at nusquam nobis Pappus occurrit.*
3. *Heliotrop. monosperm. Indic. procumbens, glaucophyllon florib. albis. an Totecy-Xochiuh Mexic. Hernand. ? Heliotrop. Americ. minus glabrum folio angusto glauco.* Br. Pr. 2.
4. *Hemionitis American. speciosa folio Securis Romanæ figuram æmulante. Hemionitis parva Antegoana folio Platani ferè in modum diviso* Ray Hist app. *ab honestissimo viro D. G. Horsnel ex Antego Insula in Patriam reduce nos accepimus.*
5. *Hemionit. Ind. Orient. Phagi s. Esculi folio aliquatenus accedens. an Hemionitis multifida Zeylan. Costâ sagittatâ s. Filix folijs integris Zeylanica pediculo alato.* Breyn Prod. 2.
6. *Hemionitis pumila folijs integris, trifidis, et quinq.fidis varia Cambrobritannica. Hemionit. pumila trifolia vel quinq. folia maritima.* D. Lloyd. Ray Synop. Stirp. Brit.
7. *Hemionitidi affinis Americana epiphyllanthos, folio simpliciter pinnato, Hippoglossi æmulo, radice reptatrice lignosâ, ad foliorum crenas florida.*



1. *Hesperis prodigioſa hortenſis Molluginis ad imaginem degenerans.*

2. *Hieracium folijs & floribus Dentis Leonis bulboſi ſemine curvo.* Moris. Prælud. *Dens Leon. folijs radialis* Bot. Monsp. *Dens Leon. minor folijs radiatis.* CB. prodr. & pin. *cui & Trinciatella Italorum* Camerar. Hort. Med.

3. *Hieracium s. Piloſellæ majoris ſpecies folijs variùs dentatis flore ſingulari noſtras.*

4. *Holoſteum s. Coronopus ſerpentina folijs betonicæ anguſtis, ſpicâ Rubiæ ſpicatæ gracili. an Holoſt. ſtrictiſsimo folio minus,* C B P. *Serpentina om̃ium minima.* Lob. Icon. *Holoſteum nobis hic allatum optimè convenit cum Deſcriptione Plantæ quam* Ioh. Bauhin. in Hiſt. *pro Coronopo ſerpentaria om̃ium minima propoſuit in quâ tamen foliola cauliculis adnexa non concedet.*

5. *Hyoſciamus puſillus aureus American. Antirrhini folijs glabris. forte Hyoſciami albi Ægyptij. Veslingiani: barielas minor ex Americâ. hujus unam aut alteram plantam à ſeminib. ex Americâ delatis curâ & vigilantiâ D. Georgij Loudon Regij nunc Hortulani, & de Rebus Botanicis optimè meriti, pronatam conſpexim; in Horto cultiſsimo noviſq; ac rarioribus undiq; conquiſitis ſtirpibus inſtructiſsimo, Honoratiſsimi Domini, & Reverendi admodum in Chriſto Patris Henrici Compton. Epiſcopi Londinenſis, omnium Botanophilorum Mecœnatis colendiſsimi.*

TAB. XXXVIII.



Tab. XXXVIII.

1. *Iacea latifol. caule alato capite magno turbinato, multiplici aculeo deflexo è squamularum cuspidib: orto. Iacea latifolia spinos. capitulis pulchris flore purpureo I B. an Iac. Cyanoid, altera alato caule. Cyanus Creticus spinos: Belgarum, Cat. H R P. Iacea folijs Seridis candicantib: purpur. C B P. Iacea purpurea valentina muricato capite Clus. cui & ille attribuit folia Seridis candicantia.*

2. *Iacea montan. alato caule purpurea ex singulis capitulor. squamis spinulis. plurimis in Hemicyclum dispositis. Iacea mont. purp. echinato capite Park. Iacea Cyanoid. echinato capite, C B P. Iac. mont. echin. capite Clus. forte etiam Iacea capitulis hirsut. Boelij Ger. emac. sub hoc enim titulo multis abhinc annis et à D. Edvard. Morgan. viro in Rebus Botanicis haud infimæ notæ accepimus.*

3. *Iacea spinosa Sonchi angusto folio, maritima, minor, ad squamas capituli, spinulis plurimis.*


4. *Iac. incana Cyani majoris folio in aculeum desinente, squammis cum ciliarib: nigris. an Iac. nigr. angustif, vel Lithospermi arvens. fol. C B P. quæ ea in prodr. item Iac. nigra angustif. alt. fol. longiorib: lanuginosis. ejusd. prodr. forte etiam Iac. min. fol. aculeatis, Cyani majoris nomine missa ejusd. Pin.*

5. *Iac. Tingitana Centauroid. echinato capite villoso, ex unaquaq. squama plurimis aculeis circulariter radiatis. Huic proxime accedit & ni fallor eadem est Iac. capite longis aculeis spinoso C B P. Quam iste vir magnus & in arte Botanica [illegible], à Iac. mont. echinato capite Clus. diversam esse, recte pronunciabat. Centaurij marini nomine ad Casparu. Bauhinum D. Doldius misit.*



Tab. XXXIX.

1. *Jac. laciniato Sonchi fol. s. latifolia purp. capitulo spinos. C BP. ex capitulor. squamis spinulæ plures pulchro ordine stellam dimidiatam referentes. atq; deorsum tendentes exeunt, quarum media cæteris latior & longior evadit.*
2. *Jac. min. Stoebe Gallicæ & Austriacæ accedens, squamis capitulor. crebrioribus, quarū singulæ unico saltem aculeo sunt armatæ.*
3. *Jac. min. exotica ad foliorum margines spinulis donata.*
4. *Jac. min. Attica capitulis plurimis ex apicibus squamularum spinâ rectâ singulari. ā doctiſsimi pariter ac humaniſs. necnon Reverendi admodum viri D. Georgij Wheeler. Eq. aur. liberalitate accepim.*
5. *Jacobæa lanosa folijs brevibus subrotundis Piloſellæ flore impense flavo. an Jacobæa lanata folijs brevibus subrotund D. Ban. Cat. Stirp. Virg.*
6. *Jacob. pumila Absinthij Umbelliferi folijs incanis, florib; velut in Umbellam positis. an Chrysanthemum Alpin. 1.^m Clus.*
7. *Jacob. pumila sinuatis folijs argentea, summo caule flore singulari. Ingenioso viro & Chirurgo Londinensi D. Paræo hujus communicationem debeo.*
8. *Iberis Americana latiorib; serratis folijs, ad caulem virticillatis.*



Tab. XL.

f. 1. *Juncus acutus maritim. caule triquetro rigido, mucrone pungente, an Juncus acutus maritimus caule triangulo. C B P. 11. & Prodr. 22.*

2. *Junc. acutus maritim. caule triquetro maximo molli. & procerior nostras.*

3. *Junc. acutus maritim. caule triquetro molli. spicâ glomeratâ. in Stylo seſsili.*

4. *Juncus acutus maritimus capitulis rotundis C B P. 11. Juncus acutus maritim. alter Park.*

5. *Juncus minor acutus maritimus prolifer. s. ex uno capitulo multa.*


6. *Juncus parvus palustris cum parvis capitulis Equiseti, Ray Hist. Junc. mont. parvus cum parvis capitulis luteis I B. Gramen sparteum capitulis Equiseti. Merett. Pin. Rer. Nat. Brit*

7. *Juncelli omn. minimi capitulis Equiset. Ray Hist. primus ejus Inventor fuit amiciſsimus vir Rei q. Herbariæ amantiſsimus D. Matth. Dodsworth, qui etjam olim hujus exemplar, optime exsiccatum. nobis benigne communicavit.*

8. *Junc. parvus calamo supra paniculam compactam longius producto Raij Hist. in Westmorlandiâ invenit ille Stirp. Britannicar. explorator. indefeſsus, D. Iacob. Newton. cujus munere accipiebam.*

9. *Juniperus Caroliniana Thuyæ ramulis fusis. & Compreſsis. odoratior. an Cedrus folio Cupreſsi major, fructu flavescente C B P. Thuyæ genus 4.^m Hist Lugd. 61.*

TAB. XLI.



Tab XLI.

f. 1. Lamium album Parietariæ folio virginianum. Lamium Parietariæ facie Moris. Prælud. Bot. 278. Lamiū Parietariæ folijs Ic. Roberti. sed hujus Icon minus placet. an Lamium album non fœtens folio oblongo minus Cat. HRP. 99. Lamium Parietariæ folio Bruynero Ionquet Hort. 69.


2. Lamium pusillum rubrum Parietariæ facie Americanum. an Lamium Novæ Angliæ Parietariæ folijs Raij Hist. 560.

3. Lam. rubr. minus folijs profundē incisis Raij Hist 560.

4. Lam. Cannabinum aculeatum flore specioso luteo, labijs purpureis. Cannab. spuria flor. specioso luteo, labro purpureo Raij Hist. 561. an Cannabis altera spuria Park. pag. 599. an Urtica aculeata folijs serratis altera CBP. 232. quærit & ipse Cl. Rajus.

5. Lappula Bengalens. tetraspermos Ribesij folio echinis orbicularib; ad folior exortus plurimis simul Sessilibus. an Alcea Indiæ Orientalis fructu lappaceo folio Ribes Breyn. Pr. Nexpayan Mexicensuim Hernand huc pertinere videtur.

6. Lenticula palustris Indica foliolis subrotundis binis capillamentis ad imum barbatis.



Tab. XLII.
f. 1. Leucoium. s. Lunaria bursculo sublongo intorto. Raÿ Hist. 789.
2. Lichen parvus erectus foliolis profundè laciniatis. an. Lichen minim, foliolis laciniatis. Raÿ Hist. 126. in Umbroſis humidis ad parvulum fluentum juxtà
Fontes medicatos apud Dolvicum, quatuor circitèr milliaria à Londino. diſſitum, in agro Surriensi, copioſiſsimum invenimus.
3. Lilio-narciſsus, s. Narciſsus Liliflorus Carolinianus, flore albo, singulari, cum rubedine diluto. ab honestiſs. viro & Hortulano admodùm industrio.
D. Gulielm Darby. recepimus ad quem huj, radices plurimæ ab amico suo è Carolinâ allatæ sunt, & in viridario suo jàm nùnc superbiant apud.
Hogsedeu, vicum Loudini. ad aquilonem suburbanum. lit. a. capsulam triquetram semimb; oppletam significat.
4. Limonium reticulatum supinum Boccon. de Pl. Sicul. pag. 82.
5. Limonium minimum comatum elegans. an Limon minus densâ caulium fœniculaceâ veluti comâ Læl. Triumfet. catal. apud Fratrem. p. 65. fortè etiàm Limon. Ferulæ
folio. Boelÿ. Park. 1235.
6. Liquid-ambari arbor. s. Styracifera Aceris folio fructu tribuloide (i e) pericarpio orbiculari ex quamplurimis apicibus coagmentato semen recondens. Ocosol,
Indorum Monard. apud Clus. 302 Xochicotzo. Quahuitl Mexicens. Hernand. Styrax Aceris folio Hon. Belli. CB. prodr. Styrax arbor virginiana Aceris fol.
Raÿ Hist. nec Acer nec Platanus propriè dici potest; est enim quædam Heteroclyta & sui generis Arbor. lit. a. fructum muricatum; cujus et transversam secti-
-onem. b. indicat c c c. semina.
7. Lithospermum angustifol. umbellatum C B P. 258 & in append. 521. Park. Paul. Boccon. de Pl. Sicul. pag. 77.
8. Lychnis Alpina muscosis folijs densiùs stipatis, floribus parvis. Calyce duriore. ab Ocymoide muscoso Park. plurimùm differt.



Tab. XLIII.

1 . *Lotus argentea Cretica. Lotus πολυκέρατος fruticosa Cretica argentea, siliquis longiſs. propendentib; rectis* Moris. Hist. 2. *(nostræ tamen siliquæ pendulæ non sunt sed sursum rigescunt.) an Lotus incanus major s. Trifol. Corniculatum siliquâ grandi, incanum maritim.* Ray Hist.

2 . *Lotus fruticosior Africana, foliis incanis, floribus binis, amplis, Coccineis. à D.* Ioanne Fishwick *accepimus.*

3 . *Lotus tetralobos minor Creticus. s. Lotus parva, Cretica, procumbens, incana, quaternis siliquis cruciatim dispositis. Candie Lotocruce.*

4 . *Lychnis Caryophyllæus Virginian; Gentianæ foliis glabris, quatuor ex singulis geniculis caulem amplexantibus flore amplo fimbriato. noster.* Ray Hist. app. 1895. *huc fortè pertinet Eloquiltic Mexicensibus. s. Herba geniculata* Hernand. 210.

5 . *Lysimachiæ Ephemeron dictæ, genus Maderaspatense, Limonii foliis subrotundis, caule craſso fungoso. lit. a. florē expansū ostendit.*

6 . *Lysimachiæ spicatæ purpureæ affinis Thymifolia, flosculis in cacumine plurimis, quasi in nodis junctis. Anthyllis fortè* Prosp. Alpin. *exot. hujus specimen Reverend. vir D. Geo. Wheeler. è Græciâ (quâ invenit) rediens nobis munere donavit.*

7 . *Tithymalus botryoid. Maderaspatens Hyperici foliis non crenatis, florib; ex alis uno versu provenientibus. inter Lysimachias in Tabulis nostris per errorem transpositus.*



Tab. XLIIII.

1. Lyſimachia non papposa Meliſſophylla Maderaspatens. forte Melochiæ genus siliquâ quinq; capsulari.
2. Malva Tingitana. flore Cæruleo parva.
3. Malv. rotundifolia. glabra ex Hispaniâ flore amplo rubello.
4. Malv. Gallo-provinciæ laciniata s. Alcea tenuiſsim. Pulsatillæ folijs. flor. ampl. rubente, Alcea tenuifol. humil. maritim. Gallo-provincialis fol. inferiorib; nonnihil ad Geranium accedentib; Sch. Bot.
5. Malv. Oriental. elatior longiori fol. fl. alb. minimo, capsulis conglomeratis. an Malv. frutesc. Melochiæ angusto fol. florib; alb. fasciculatim. congestis. Par. Bat. Prodr. inter addenda.
6. Mandarù Maderaspatense folijs firmiorib; parvis bisulcis, glabritie splendentib; ad Surculum densiùs stipatis.
7. Muscus polytrichoides elatior folijs angustis pellucidis, & ferè membranaceis noster Raÿ. Synops. Stirp. Brit.



Tab XLV.

1. *Marrubium aquaticum s. aquatile, folijs tenuiùs diſſectis* Moris. Præl. *forte Marrub.* [illegible] *hirsut. tenuiùs laciniatum* C.B. Pin. [illegible] *nostri tamen folia sunt omnino glabra.*

2. *Marrub. an potiùs Cardiaca foliorum apicib, in prælongam barbulam extenuatis, verticillis florum petiolis innitentibus. an Marrub. ex Aleppo verticillis longis pediculis insidentibus.* Cat. Hort. Edinburg.

3. *Matricariæ* Achaovan. *dictæ similis, Erysimi folijs, Absinthij sapore* Jamaicensis.


4. *Melilotus lutea Indiæ. Orientalis erecta, folliculis rotundis, parvis, spicis florum ex foliorū alis multiplicatis.*

5. *Melilot. Indic. humil. erecta florib, exiguis odorat. albis, pericarpijs majorib; spicatim densiùs stipatis. Suendadi-pullu* Hort. Malab. P. 9.

6. *Mentha hirsutior* Βραχυσταχυοφυλλ@ *exotica. à D.* Doody. *accepimus*

7. *Muscus polytrichoides humilior folijs latis subrotundis. Adianthum aureum humilius fol. latis subrot.* Ray Hist. *an Musc. Trichomanis facie Jungermanni folijs utrinq, rotund. splendentib,* Cat. Aldtorf.

8. *Melilot. lutea minima procumbens folijs minoribus. crenatis. an Melilot. Meſſanenſis. procumb. folliculis rugosis sublong. spicis florum brevioribus;* Ray Hist. Cat. Exterar.



Tab. XLVI.

1. *Mespilus aculeata Pyrifolia denticulata splendens, fructu insigni rutilo Virginiensis. an Mespil; virginiana colore rutilo C B P. hujus folia aliquandò variant, & senectute multùm laciniata evadunt, ut in Horto Nobiliſs. viri D. Caroli Howard. propè oppidum Darkin in agro Surriensi observavimus. hujus folium ad lit. a in Tab. exprimitur.*

2. *Mespilus Prunifolia Virginiana. non spinosa fructu nigricante. Rhamnus virginiana Prunifolia fructu nigro, oſsiculo compreſso Banist. Cat. Stirp. Virgin. an Mespilus. s. Sorbus torminalis virginiana folio latiſsi fructu nigro Sch. Botan. fortè etiam Mespilus spinosa. s. Oxyacantha virginiana nigra Cat. H.AL. si saltèm aliquandò inveniatur spinosa. u ubi magis domestica spinis careat. ut accidit in Anthedone Azarolo Cæsalp. Theophrasto monente. nostram autèm unquàm spinosam eſse, me haud persuadere poſsum. b. ramulum fructu onustum significat.*

3. *Mespilus Virginiana. Apij folio vulgari similis major grandioribus spinis.*

4. *Mespil; Apij folio Virginiana spinis horrida, fructu amplo coccineo. Mespilus Apij folio Indica Sch. Bot. Mespil; spinos. s. Oxyacantha maxima virginiana Cat. H.AL. Oxyacantha Oſsiculis binis fructu magno inclusis. Banist. Cat. Stirp. Virg. Oxyacantha Americ. Galli calcar dicta. R.S. Mus. Ray Hist. hujus Arbor, Spina Glaſsenburiensis, Spina Christi, & Spina Sancta per errorem dici solita est, lit. a. Surculum cum aculeo armatum b. b. oſsicula demonstrant.*



Tab. XLVII.

1. *Millefolium Tanaceti folijs flore albo* Moris. *Prælud. an Corymbifera Millefolij Umbellâ, folio alato & laciniato* Ray Hist.
2. *Muscus clavatus Ceranoides, segmentis latioribus. Compreſsis, eburneo nitens, noster* Ray. Syn. *Stirp.* Brit. *app.*
3. *Musc. clavatus Ceranoides Gagateus nigredine splendens, noster* Ray. Syn. St. Brit. *append.*
4. *Musc. montanus, gracilis, ramosus, bibulis longioribus glabris. an Muscus ramosus erectus minor* CB. pin. *& prod.*
5. *Musc. Alpin. ramosior, erectus, flagellis brevioribus, lanuginosus. an Muscus terrestris ramosus erectus major* CB. pin. *& prodr. Muscus montanus* Tab. Icon. *fortè etiam Muscus hirsutus capillaceus* Merett. Pinac.
6. *Muscus parvus stellaris* CBP. Park. *Adianthi capitulis. Muscus in ericetis proveniens* IB. Hist. Lob. Icon. *sed figura non placet.*
7. *Muscus terrestris erectus minor polyspermos* Ray Hist. & Synops. Method. Stirp. Brit.
8. *Musc. terrestris repens pediculis foliaceis binis clavis in altum se erigentibus. Muscus alius terrestris, Lycopodium* Dodonæi Hist. Lugd. *qui à Musco terrestri 2. ejusd. Histor. (ie) terrestri repente à Trago picto* IB. *plurimum differt licèt in Pinace suo Casp. Bauhin. ab illo non separat, sed planè utrumq. confundit.*
9. *Muscus Zeylanic. erectus, perpetuò virens, in arboris proceritatem excrescens. an Quamiaeatl. s. Spica arboris* Hernand. Hist. Mexic.
10. *Muscus Coralloides, multifido capillaceo folio, Palmites pelagica nigra. Musc. capillac. multifid. niger.* CBP. *addit. a. Palmites pelagica alba depingitur. Muscus capillac. multifido folio albido.* CBP. *Corallinæ affinis s. Muscus marinus tenui capillo* IB. *Muscus marinus vulgatiſsim.* Lob. Icon. p. 2.
11. *Muscus marinus denticulatus, procumbens, caule tenuiſsimo, denticulis bijugis* Ray. Histor.
12. *Musc. pennatus, ramulis & capillamentis falcatis* Ray Hist.
13. *Muscus marinus Neapolitanus* Park. *Coralloides lenta fæniculacea* I B. *Fucus fæniculaceus colore livido nobis* Raij Synop. app.

TAB. XLVIII.



Tab. XLVIII.

f. 1. Muscus aureus, capillaris, palustris, inter folia folliculis rotundis (ex sententia D. Doodij) quadripartitis. Graminifolia palustris repens. vasculis granorum Piperis aemulis. Ray. Hist. & Synops.

2. Muscus pelagic; pennat, rubens, ramulis numerosis mollib; latius se spargentibus. an Musc; marin; rubens, pennatus nostras. Ray Hist. item Musc; marin; purpur. parvus. folijs ob amoris. Millefolij ferè divisurâ. ejusd. Hist.

3. Musc; marin, denticulatus minor, ramulis in crebêrrima capillamenta sparsis. an Muscus marinus denticulat; minor. denticulis alternis Ray Hist.

4. Muscus marinus geniculatus, eburneo nitore candicans, erectus, cauliculis pennatis. Muscus marinus candidus Coralloides Hist. Lugd. Lob. Icon. p. 2. Corallina altera Tabern. Icon. sed figurae minus placet. Muscus Coralloid. squammulis loricatus. CBP.

5. Muscus marinus major argutè denticulatus Ray. Hist. Muscus Coralloides alter albus Lob. Icon. part. 2. Abies marina Belgica Clus Hist. Abieti similis maritima CBP.

6. Muscus marin. s Coralloid. non ramosus erectus, arenacei coloris, Astacorum corniculi adinstar, geniculatus. Muscus marinus Equiseti formis non ramosus Ray. Hist.

7. Myosotis Scorpioides, an potius Heliotropium minus erectum, folijs subtus incanis, è Maderaspatan.

8. Myrt; Brabanticae accedens Africana, baccis carens, Conifera. Arbor Conifera odorata folijs Salicis, rigidis, leviter serratis Ray. Hist. an Laur, serrata odora Promont. Bon. Spei. Bod à Stapel. in. Theophr. p. 333. ex America quoq; nobis allata est. & à Nostratib, Insulam Bermudensem incolentibus, Laurus odorata, vulgò nominatur. ut ab honestiss. viro Jacobo Harlow. didicimus.

9. Myrt; Brabanticae similis. Caroliniensis, baccifera, fructu racemoso, sessili, monopyrene, fructum fert veluti Saccharo candidiss. incrustatum, cujus ramulus cum fructu, ut per Microscopium apparuit, adpingitur. Hujus pulchri Sanè, perrari, & prorsus novi Arbusculi Americani generis, munificentiâ Illustris viri D. Gulielmi Courtene, compos factus sum.



Tab. XLIX.

f. 1. *Muscus polytrichoides angustifolius pellucidus ramosus noster* Raij. Synops. Stirp. Brit.

2. *Njerè Hort. Malab. similis è* ... *Maderaspatàn. Arbor exot. Ceratiæ fol. Corymbosa.*

3. *Nir-Schulli Hort. Malab. accedens è Cormandel. Gratiolæ affinis Indiæ Orientalis, Digitalis æmula. ubi tres exhibentur species, seminum figurâ discrepantes, ut literæ a. b. ccc. denotant.*

4. *Oenanthe aquatica, Pimpinellæ Saxifragæ divisurâ, nostras. Oenanthe Staphylini folio aliquatenus accedens* IB. *Oenanthe Pastinacæ Sylvestr. folio semine Atriplicis* CBP.

5. *Onobrychis Bisnagarica, Mimosæ folijs, siliquis ad unum solummodò latus dentatis, ex alis polyceratos.*



Tab. L.

f. 1. Onobrychis minor, flore parvo, purpureo, siliquâ echinatâ, majoribus aculeis. Raÿ Hist. Onobrych. minor, siliculis echinatis, cristatis, majorib; & craſsiorib, aculeis præditis donata Moris. Hist. 2. an Onobrych. fructu echinato minor. CBP. item Caput Gallinaceum minus ejusd. pin. & prodr. Onobrychis. s. Caput gallinaceum minus, fructu maximo, insigniter echinato. Lælÿ. Triumfelli. Cat. apud fratrem.

2. Onobrychis minor foliolis cordatis, siliquis magnis, asperis, compreſsis, beluti isthmo interceptis, floribus in globum congestis. an Onobrychis foliis viciæ, fructu echinato major caulescens, & ramosa Schol. Botan. an Onobrychis semine Clypeato aspero minor CB. Pin. & Prodr.

3. Onobrychis Gangetica monophyllos, siliculis singularibus, lævibus, falcatim, per internodia discriminatis.


4. Pai-paroea, s. Couradi. Hort. Malab. similis, sinon eadem. Frutex baccifer Malabaric; fructu plano rotundo piloso tetrapyreno. Raÿ Hist.

5. Perfoliata alpina angustifolia minor CBP. quæ 4.ª in Prodromo. Park. Theatr.

6. Perfoliata minor angustifolia, Bupleuri folio CBP. Perfoliatum angustifolium montanum Col. ecphr. 247. Perfoliata angustifolia Alpina minima Park. Auriculæ leporis affinis, Odontitis lutea Valerandi. & Dalechampÿ. IB. Hist. tom. 3. lib. 27. p. 201.



Tab. LI.
f. 1. *Palma Jamaicens. non spinosa humilis, folio multiſciſso, flabelli formi,* Ampana. Malabar. *haud absimili.*
2. *Phaseolus maritimus purgans, radice vivaci, folijs craſsis, subrotundis, Bisnagaric, an Phaseolus Brasilius* Florileg. Renovat. edit. p. Matth. Merianum. Katu-Atsjandi. H. Malab. p. 8.
3. *Phaseolus Orientalis Anagyridis folio, siliquâ falcatâ glabrâ.*
4. *Phaseol. minimus Maderaspatan. florib. miniatis Meliloti adinstar spicatis, huc fortè pertinet Ystactlalamatl Mexicens.* Hernand. *Hist.* 452.
5. *Paronychia myosotis virginiana, folijs subrotundis. Nasturtium myosotis insipidum* Banist. *Cat. Stirp. Virgin. à D. Bobert. amiciſsimè communicatum fuit, hujus optimè aſservatum exemplar.*



Tab. LII.

F. 1. *Ornithopodium majus e Maderaspatan. folijs lanugine argentatis.*

2. *Phaseolus parvus spicatus Maderaspatens. cordatis, & incanis folijs, siliquâ utriculatâ nigrâ.*

3. *Phaseol; minor Visnagaricus folijs argenteo colore villosis, siliquis torosis brevibus, spadiceâ hirsutie pubescent. fructu parvo Scaraboide nigro. an Phaseol; Zeylan. Salviæ folijs subrotund. mollib; & hirsutis Parad. Bat. Prodr. item Orob; Phaseolodes Zeylan. folijs Salviæ rotundis incanis sub[illegible] apud P.B.P.*

4. *Phaseolus Nevisensis. folijs multangulis, tuberosâ radice esculentâ, Phaseolus perennis Martinicanus radice tuberosâ esculentâ, anguloso crenato folio P.B.P. nostratib; the Turneptree vocatur.*

5. *Phaseolis accedens Frutex Paphnapatensis spinosus, fructu Ovali, nigris & cinereis punctis, elegantèr guttato P.B.P.*

6. *Pilosella minima, Gnaphalij montani lanosis folijs, flore aureo, nondum descripta.*

7. *Polygonum minus, procumbens, niveum facie Glaucis exiguæ, Polygonum minus candicans supinum Botan. Monspel. Polygala repens nivea C.B.P. Polygala repens Nuperorum Obs. & Ic. Lob.*



Tab. LIII.


f. 1. *Padri Malabaricæ similis, Arbor è Maderaspatàn. (h. e) Clematis arborea Indica Juglandis folio, flore luteo, spicato, minimo, siliquis longis, angustis, quadratis, atq; contortis, seminibus substantiâ lignosâ obductis* Breyn. Prodr. 2.

2. *Polygalæ affinis Africana, glabra, floris galeâ binis cristis fimbriatis, ornata, ex involucro magno dipetalo erumpente.*

3. *Polygonum maritimum longius radicatum nostras, Serpylli folio circinato, craſso, nitente,* Synops. Stirp. Brit. app. *fortè Polygon. minus lentifolium* C. B. Pr. prodr. *Polygon. minus Monspeliens.* Park. *huic proximè conveniret Polygon. Herniariæ folijs, & facie, per amplâ radice Astragaliti* Adv. Lob. *si hæc herbula non eſset tota incana, nostra autèm glabritie splendet.*

4. *Polygonum lignosum à maritimis Africanum, azurei coloris foliorum vice, squammulis pellucidis ornatum. Limonium lignosum Gallas ferens* Bocconi, *huc pertinet, & fortè idem est, à* D. Fishwick. *nobis transmiſsū.*

5. *Ptarmica virginiana Scabiosæ Austriacæ folijs indiſsectis. Ptarmica virginiana folio Helenij* Moris. Prælud. *Pseudo costus virginiana, seu Anonymos Corimbifera virginiana flore albo* Ray Hist. *hujus specimen jam ante triginta circiter annos in Horto* D. Walker. *apud Westmonasterium legimus, cujus filius hanc plantam cum alijs rariorib; è virginiâ transmisit.*



Tab. LIIII.


1. Pentaletsjæ Malabaricæ similis Arbuscula Maderaspatensis (i.e) Baccifera Indica baccis oblongis in Umbellæ formam dispositis Raÿ Hist.

2. Pulegium virginianū angustifol (Serpentaria dictum) flosculis in Cymis, an potius Clinopodium Pulegij angusto rigidoq; folio virginian. flosculis in Cymis. Pulegium virginianum Nonnullis, alijs Serpentaria aut Colubrina virginiana Raÿ Hist. Satureia floribus in summitate dispositis Cat. H. A L. Pulegio Cervino quodammodò accedens, capitata Chamæpityos Austriacæ cæruleæ folijs & facie Breyn. Prodr. 2.

3. Quercus virginiana Castaneæ folio, nostra Raÿ Hist. append.

4. Quercus Esculi divisurâ, folijs amplioribus aculeatis, an Quercus alba virginiana Park.

5. Quercus virginiana rubris venis muricata The Scarlet Oake, nostratib; dicta. in Horto. Comptoniano. hujus plurimas, adolescentes Arbores observavimus.



Tab. LV.
1. Ranunculus hirsutus annuus flore minimo Ray Hist. & Synops. Method. Stirp. Brit.
2. Ranunc. aquatic. albus circinatis tenuiſsimè divisis folijs, florib; ex alis, longis pediculis innixis Nobis Ray, Synops. Millefolium aquaticum cornutum quoad figuram I B. t. 3. item quoad figuram, ut & descriptionem C B. Prod. Millefolium aquaticum cornutum majus Park.
3. Rapunculus galeatus Salicis glabro folio Bisnagarius, floribus aurantijs.
4. Reseda Maſsiliensis folijs latioribus crispis. Reseda crispa Gallica Boccon. 77. Reseda latifolia flore flavo Moris Præclud. Botan.
5. Reseda minor Indiæ Orient. Ptarmicæ pratensis folio, crenis exasperata, s. Sesamoides parvum Bengalense serratum.
6. Rhamnus Lycij Myrsinites facie Gangeticus, folijs densis, ferè convolutis, Jasmini floribus, & spinis gemellis.
7. Rhamnus Orientalis spinis uncinatis, atro-purpureis, Oleæ s. Ligustri folio, cujus ad imum petiolus umbilico inarticulatur, Rhamn; Oriental. Ligustri folio spinis atro-purpureis noster Ray Hist. an Mahaleb genuinum Arabum?



Tab. LVI.

f. 1. *Rhoi Obſoniorum ſimilis, Americana, Gummi candidum ſundens, non ſerrata, foliorum rachi medio alata. Rhus Virginianum Lentiſci folijs* Ray Hiſt Baniſt. Cat. Stirp. Virg. Mſs. *hæc eſt ē Copalliferis Arbor. Errandi anſam nonnullis ſcriptorib; hæc forſe præbuit Arbor, quūm Lentiſcum noſtrum Europæam Virginiæ plagis indigenam eſse contendere velint* Vid. Hond. Geograph.

2. *Ricinus Indicus piloſus. trifidus. vel quinquifid; floſculis atro purpureis, in Umbellâ aggregatis. Huipochotl. Huaxacenſis. ſi Ricinus Novæ Hiſpaniæ Hernandez.* Hiſt. Mexic. *an Ricinus Americanus folio Staphiſagriæ.* C B. Pin. app.

3. *Euphraſia Alſines anguſtiori folio. Rubiæ modo Spicata, Golcondea, herbulam hanc exoticam ſub Euphraſiarum vexillo militari, ab eximio Botanico* D. Doody. *didicimus, ideòq, malè hoc loco collocatur. ad Euphraſias ablegandasit.*

4. *Saamouna Piſonis. s. Siliquefera Braſilienſis arbor, digitatis folijs, ſerratis, floribus Teucrij purpureis. Arbor pentaphillos Virginiana floribus ſpicatis monopetalis* Mus. Courtenian. Ray Hiſt. *hujus exemplar, cum multis alijs exoticis, ab insigni viro* D. Gulielmo Courtene, *dono accepimus.*

5. *Salix longiori folio hirſuta, roſea, noſtras.*

TAB. LVII.



Tab. LVII.

1. [illegible] ... natis folijs, longis pediculis insidentibus, lanuginosa. an Salvia angustifolia serrata C.B.P. Salvia Cretica angustifolia aurita Park. (sic) Salvia tenuifolia I B. Hist. t. 3.

2. Salvia Cretica pomifera Clus. Hist. Salvia baccifera C.B.P. Salvia gallifera Cretica I B. Hist. t. 3 Salvia major Cretica latifolia & angustifolia, aurita & non aurita, pomifera & non pomifera Park. Theatr. huic folia sunt viridia.

3. Salvia auriculata mucronatis folijs crassis, lanuginosa, appendicibus aucta.

4. Salvia trifoliata minor Indica.

5. Salvia Cisti folio e Promontorio. Bon. Spei. forte Salvia Syriaca Cisti famin. folijs acetabulis Moluccæ Breyn. hujus etiam Leonard; Rawolfius meminit in suo Hodæporico.

6. Salvia fruticosa Cisti folio haud incano, florib; purpureis. Verbascum verum flore rubro arborescens Cat. Hort. Groningens. Verbasc. sylv. Salvifolium exoticum folio rotundiore Lobelij I B. Hist. t. 3 Verbascum subrotundo Salviæ folio C.B.P. Verbasc. Salvifol. exoticum Cistoides Park. et sub Verbasci Cistoides nomine ex Horto Cl. Contareni. habuit Caspar; Bauhinus. hujus flores Lobelio. videre nusquam contigit: et Cisti æmulos appingit Parkinsonus. item pentapetalos esse, petalis subrot. colore flavo, staminulis rubentib; describit. sed hæc omnia per figmentum, nec minus erronee à Cl. Hermanno in Cat. H. Ac. Lugd. append. elegans hæc & minus cognita species, Verbasci latis, Salviæ folijs C.B. Synonymo proponitur. Ante triginta circiter annos in Horto D. Morgani luxuriantem observavimus.

7. Saxicula aizoides tridactylites Alpina minor flore albo majore, Sedo Alpino tertio similis, altera Fab. Col. ecphr. p. 1. Sedum Alpinum trifido folio C.B.P. Sedum Alpin. laciniatis Ajugæ folijs. Park. Sedis affinis trisulca Alpina flore albo I B. Hist. t. 3.



Tab. LVIII.
f. 1. Sambucus humilis, s. Ebulus laciniata folio C.B.P. Ebulus laciniata Pontæ. Ital. ā. flores b. fructum indicat.
2. Sanicula myosotis alpina, florib; albicantibus, ferè Umbellatis. Saniculæ Alpinæ aliquatenus affinis J.B. 1. 3. Cotyledon hirsuta Phyt. Brit. Ray Hist. et Synops. an Saniculæ montanæ alterius species 2ª. Clus. Hist.
3. Sanicula s. Cortusa Americana, spicata, floribus squallidè purpureis.
4. Scabiosa peregrina Thapsiæ majoris folio, squammatis capitulis. flore flavescente.
5. Scabiosa Bisnagarica, s. Globularia frutesc. rigidis folijs, ad radicem rotundioribus cordatis, ad caulem autem mucrone præditis.
6. Scabiosa Jamajcensis hyssopi folia s. Globularia capitulis ad genicula. folijs plurimis, stellatim ambientibus, verticillata. fortè, Tzicatz on. Tecomatl, s. Caput formicæ Hernand. Hist. Mexic.

TAB. LIX.



Tab. Lix.

f. 1. *Sanicula virginiensis alba folio oblongo mucronato. Saxifraga alba folio oblongo acuminato D. Banist. Cat. Mſs.*


2. *Schetti Hort. Malab. ē Maderaspatan. Jasminum Indicum Lauri folio inodorum, Umbellatum floribus Coccineis P.B.P. Jasmin. arboresc. Indic. flore tetrapetalo, Umbellato, phœniceo, folijs Laurinis. Breyn. Prod. 2. Ratambala Zeylanensium.*

3. *Scorpioides Bisnagarica folio singulari rigido siliquis articulatis erectis. Onobrychis Zeylanica folio singulari oblongo rotundo D. Hermano D. Sherard.*

4. *Scorzonera bulbosa Bistortæ minimæ folijs virginiana.*

5. *Scrophularia Scorodoniæ folijs Moris. Hist. 2. & Prælud. Bot. Ray Hist. & Synops. Jerseiæ nostræ Angliæ adjacentis Insulæ, indigenam eſſe à D. Sherard. nuperrimè Observata.*

6. *Securidaca Maderaspatens. siliquis falcatis, fulvis, & villosis, plurimis circà ramulos stellatim positis. Stella Orientalis fulgens. a. siliquam seorsum, b. semina denotant.*



Tab. LX.

f. 1. *Sena exigua Maderaspatana, s. Tetraphylla siliquifera glabra, florum pediculis inter foliorũ exortum dispositis. ȧn Absus Verlingÿ. Obs. in Alpin. Senna Oriental. Tetraphylla Absus dicta Cat. Hort. Ac. Lugd. Semen atro colore splendidum, parvis includit siliquis Cicerum æmulis, ut ex Icone videsis. a. semina rhomboide figurâ ostendit.*

2. *Sena tetraphylla, s. Absi congener hirsuta, è Maderaspatan flore flavo, siliquis punctatis scabris, folliculos sub terram condens. b. folliculum c. nucleum è folliculo exutum d. siliquam cum seminibus Pyri proximis ostendunt. ȧn Arachidna Indiæ utriusq. tetraphylla P. B P. Mandubi Pison.*

3. *Senecio pusillus Maderaspatanus folijs crenatis, craſsis, & hirsutis. Tlanpanxihuitl Nov. Hisp. Recch. huic haud prorsus diſsimilis.*

4. *Seseli pratense, folijs densius pilis pubescentibus.*

5. *Sinapistrum Indicum diphyllon, radiatis siliquis ad sinus foliorum ex adverso binis ad hujus Sinapistri genus accenseri debent. Cupa-Veela, & Aria Veela Hort. Malab. p. 9. ut nobis videtur.*



Tab. LXI.

1. *Siſyrichium cæruleum parvum gladiato caule Virginian. Gladiol; cæruleus hexapetalos caule etiàm gladiato Baniſt. Cat. Mſs.*
2. *Siſyrichium Bermudenſe florib; parvis ex cæruleo & aureo mixtis. Iris Phalangoides quorundam.*
3. *Sium minimum umbellatum folijs varijs. Sium minimum Raÿ Hist. Sium minimum ferulaceis folijs Moris. Præluđ.*
4. *Soldæ Malabaricæ similis Arbor Maderaspatana nucamentis donata.*
5. *Sonchus subrotundo folio nostras, leviſsimis spiculis circà foliorum oras exasperatus, an Sonchus asper subrotundo folio C.B.P. Park. Sonchus asper vulgi, flore Hieracij Monspelienſib; Raÿ Hist. Monspelij sponte naſcitur, & in Angliâ.*



Tab. LXII.

f. 1. Solanum incanum Chinense minus spinosum, floribus parvis, ferè umbellatis à D. Pettever accepi.

2. Solanum Indic. spinos. atro virens, & undiq. glabrum, folijs Brancæ Ursinæ divisuris. an Solan. pomiferum spinos. Indic. fructu echinato folijs Carduis. Acanthi spinosi Breyn. Prodr. 1. in Horto quodam Hollandiæ celebriori collegit D. London, & nobis transmisit.

3. Solan. annuum nigricans Virginianum spinosiſs. latè se spargens, flore cæruleo glabrum. Planta spinosiſs. Virginiana Borraginis flore Tradescantio Ray Hist. 674. & in app. 1876. item Solanum pomiferum frutesc. African. spinos. nigricans Borraginis flore, folijs minus profundè laciniatis, spinis multò longioribus, majorib; & crebrioribus horridum Ray Hist. 1799. an Solan. American. laciniatum spinosiſs. P.B.P.

4. Sonchus ἀφυλλόκαυλος angusto & oblongo folio nostras, per foliorum ambitum creberrimis spinulis asperatus.

5. Sonchus angustifolius maritimus C.B. Pin. & in Prodr.




Tab. LXIII.

f. 1. Solano an potius Mirabili Peruvianæ affinis tinctoria Betæfolia scandens Cochin-Chinensis flosculis puniceis, muscosis, spicatis, fructu intus Cochleato. Solanum scandens Malabaric. Betæfolia Commelin. Hort. Amst. Solanum peregrin. Betæfolia Ray Hist. Beta baccifera aizoides rotundi folia Zeylanica Breyn. Pr. Ir. 2. Basella Zanon. Basella Hort. Malab. P. 7. ubi sub Bryoniæ genere (minus aptè) recenseri bellet Commelin in Not. suprà loc. Bintal Zeylanensib; & Cochin-Chinensibus Brotho-Condolo nominatur. succus ex florib; non ex fructibus (ut vult Annotator) expreſsus commodiſsimè pro miniatura utitur. in Horto Comptoniano apud Fulhamenses cum floribus, & fructu collegimus.

2. Spiræa Theophrasti similis Frutex Indicus latiori folio, spicis florum è foliorum alis, hujus ramulum noster amicus Reverend. D. Dodsworth in horto cujusdam ingeniosi viri D. Wilkinson. Pharmacopæi Eboracensis collectum & optimè reſiccatum absq; titulo nobis Londino transmisit, & forte Evonymus nostra Jujubinis folijs Caroliniensis varietas haberi poſsit, an Frutex Virginianus floribus albis instar Spiræa compactis Cat. Illſs. Hort. Oxon. lit. a significat flosculos per Microscopium visos, in perianthijs occlusos & nondum explicatos.

3. Sphondylium hirsutum minus folijs tenuiter laciniatis seminelato, Sphondyl. mont. min. angustifol. tenuiter laciniat. nostrum Ray. Synops. an Sphondylium Alpinum parvum C.B. pin. & prodr.

4. Staphylodendron Æthiopic. Μονολαστοκαλλιωορφυοφυλλον. singulari hirsuto folio nitente, Staphylod. Afric. sempervirens folijs splendentib; Commel. Hort. Amst. Staphylod. Afric. folio lucido P.B.P.



Tab. LXiv.

1 . Stachys angustifolia lychnitis, non crenata, Stachys Cretica C. B. P. Stach. s. Pseudo Stachys Cretica Park.

2 . Stachys Lychnitis angustifolia, crenata, Maderaspatana, lit. a, imum folium cum ejus pediculo oblongo significat.

3 . Syringa Lauri-folia Jamaicensis floribus ex flavo-pallescentibus. huc fortè pertinet Totoncapatli Mexicensib; Syringa lutea Hernand. Hist. Mexic.


a. Tamarind; Americanus siliquâ ferè orbiculatâ monospermos Mus. Courten. Tamarind; Occidentalis siliquâ subrotundâ, Carandas fortè

4 . Bontio Ray Hist.

b . Tamarindus Bisnagaricus siliquâ productiore dispermos, seminib; veluti isthmo interceptis, cc. semina siliquis exuta denotant.

5 . Terebinth. minoris æmula, folijs angustioribus, & rotundioribus, Arbuscula Bisnagarica.

6 . Teucrij facie Bisnagarica tetracoccos rostrata, pilis scatens, folijs profundè venosis.



Tab LXV.

f. 1. *Teucrium lucidum parvo folio flore venuſtè purpureo. Chamædrys Alpina lucida* Cat. H. R. P. *Chamædrys Alpina latifolia elatior splendens* Sch. Bot. *Teucrium African. fruticans folio viridi splendido* D. Magnol. Mus. Courten.

2. *Teucrium Atticum molli lanugine incanum. an Teucrium Creticum* Clus. Hist. Park. *Teucrium Creticum incanum* C.B.P. *fortè etiam Scordium lanuginosum ejusd* C.B.P. *Scordium lanuginos Creticum* Camer. *munificentiâ* D. *Wheeler. accepimus.*

3. *Thalictrum pratense majus Monspeliensium foliis rugosis* Cat. H. R. P.

4. *Thalictrum minimum fœtidiſs.* Caspare Bauhino I B. Hist. Park.


5. *Thalictrum minus lucidum Libanotidis Coronariæ foliis, an Thalictr. foliis lucid. Rorismarini instar quorundam.*

6. *Thalictr. anguſtiſs. folio* Park *Thalictr. pratense anguſtiſs folio* C.B.P. *quod prim. in Prodr.*

7. *Thapsia latifolia Hispanica* Park. *Thaps.* x^a *Clusij. latifolia flore luteo, semine lato similis Seseli Peloponensi* Lobelio I B. Hist. l. 3.

8. *Tithymalus s. Chamæsyce altera virginiana foliis crenatis & maculâ fuscâ eleganter notatis, noster,* Raij Hist. Commelin. Hort. Amst. *triginta abhinc adminimum annis in Horto* D. Walker. *observavimus.*

TAB. LXVI.



Tab. LXVI.


1. *Thapsia glutinosa segmentis densioribus subhirsutis alterno situ positis, an Seseli Peloponense folio Cicutæ Adv. & Icon. Lob.*

2. *Thapsia Cæsalpini semine candido craſso I B. Hist. t. 3.*

3. *Thaps. latifol. villosa C. B. P. Seseli Peloponens. majus Lob. Ic. Thapsia quorund. hirsuta & aspera, Cicutæ folio, flore luteo, semine lato, alijs Seseli Peloponeſiacum I B. Hist.*

4. *Thapsia glutinosa Pimpinellæ Saxifragæ folijs venosis, ex Hispaniâ Thapsia 4.ª s. Tuero dicta Clus. Hist. Thapsia 4.ª Clusij. Tuero vocata folijs glutinosis, radice nigrâ foris I B. Hist. t. 3. Thapsia folijs Libanotidis fœtidiſsima C. B. P. item Cicutaria latifolia fœtidiſsima altera Phytopin.*

5. *Thapsia Carotæ facie I B. Hist. Thapsia Carotæ folio C. B. P. Thaps. vulgaris Carotæ effigie Adv. & Ic. Lob. lit. a. hujus umbellam seminibus onustam indicat.*



Tab. LXVII.

f. 1. *Thapsia maximis folijs glutinosa, segmentis densioribus et adverso sitis. Thapsia Salmanticensis. s. 5ª. Clusij. magna, flore luteo semine lato I B. Hist. t. 3. Thapsia maxima Hispanica* Park. *Thapsia maxima latiſſimo folio* C. B. P.

2. *Thapsia Libanotidis folio glutinosa glabra. Thapsia Thalictri folio* Bot. Monsp. *Thapsia s. Turbith Garganicum, semine latiſſimo* I B. Hist. t. 3ª. *lit. a. appingitur Umbella.*


3. *Thymelæa Africana glabra floribus ruberrimis nostra* Raij. Hist. app. *an Sanamunda 4ª. s. folijs glabris acutis* Breyn. Fascic.

4. *Tribulus terrestris Americanus Argemones flore flavo. Tribulus terrestris major Curaſſavic.* P. B. P. *Tribul. terrestris Americ. Chamæcisti flore, fructu spinoso maximo* Breyn. Prod. 2. *lit. a. fructum denotat, ab Insigni Botanico D. Tancred. Robinson. accepimus, qui in Hortis Batavis collegit, sed absque nomine.*

5. *Trifolium purpureum Ebenus Cretica dictum, Loto affinis folio et facie Pentaphylloides fruticosi nostratis. floribus in spicam longiorem dispositis. Cytisus Creticus* ασχονδοξυλον. Honor. Belli.



Tab. LXVIII.
1. *Trifolium siliquos Loto affine, siliquis Ornithopodij. Trifolium siliquis Ornithopodij nostras Ray Synops. & Hist.*
2. 2. *Trifolium pediculis foliorum longiſsimis Bisnagaricum, fortè Trifolij Bituminosi genus Indiæ Orientalis.*
3. *Tulipifera Caroliniana folijs productioribus magis angulosis Mus. Courten. fortè Macpalxochie-Quahuitl Mexicensibus Hernandez. Hist. lit. a. florem expansum indigitat.*
4. *Tulipifera virginiana Laurinis folijs aversâ partê rore cæruleo tinctis, Conibaccifera. Laurus Tulipifera baccis rubellis Cono erecto inclusis. Banist. Cat. Laurus Tulipifera folijs subtùs ex cinereo aut argenteo purpurantibus Ray Hist. lit. b. baccas Cono capsulato per tenue filamentum appensas ostendit.*



Tab LXIX.

1. *Trifolium pumilum Bisnagaritum argenteo nitore sericeum capitulis oblongis hispidis.*
2. *Trifolium Americanum elatius holosericeum summo folio bifido suaveolens. Meliloti genus (fortè) Indianum.*
3. *Vitis Idææ species Maderaspatana Niruri fortè Malabarensibus dicta Hort. Mal. P. 2. an Frutex Indicus baccifer Vitis Idææ secundæ Cluſij facie Breyn. Cent. 1.*
4. *Vitis Idæa Bengalensis Uvæ Ursi baccâ singulari, ad foliorum exortum barbulis donata.*
5. *Volubilis Gangetica sapore acri, & aromaticô, clarius autem Aristolochia Clematitis Gangetica folijs in aculeum abeuntibus, radice odoratiſsima. an Aristolochia Clematitis Indica odorata P. B. P. Addend. Careloe-Vengo Hort. Malab. Saſanda Zeylanensib.*
6. *Volubilis, s. Aristolochia Clematitis, Bisnagarica, spinis gemellis aculeata.*
7. *Wadouka Malabarica haud multùm dispar, Frutex aculeatus e Maderaspatan Hort. Mal. P. 4.*



Tab. LXX.
f. 1. *Verbena Scutellariæ, ſ. Caſsidæ folio, dispermos, Americana, an Verbena Indica Bontij. Hist. Ind. Or. fortè etiam Verbena Curaſſavica Scutellariæ folijs, flore purpurascente P. B. P.*

2. *Veronica Virginiana procerior, folijs ternis, quaternis, & etiam quinis, caulem amplexantibus, spicis florum candidiſſimis. an Veronica Americana erecta, frutescens, & ramosa folio Verbenæ P. B. P.*




Tab LXXI.

f. 1. *Vicia multiflora maxima perennis tetro odore, floribus albentibus, lineis cœruleis, Striatis, Vicia Sylvatica multiflora maxima* Phytol. Brit. Ray. Synops & Hist. *Vicia perennis multiflora spicata major, floribus albis, lineis cœruleis notatis*. Moris. Hist. 2.

2. *Vicia Lathyroides nostras, s. Lathyrus Viciæformis* Ray Hist. & Synops. *Lathyrus ex cœruleo & rubro mixtus* Merret. Pin.

TAB. LXXII.



1. Vicia multiflora major angustifolia glabra, floribus oblongis ex albo & cæruleo mixtis. an Vicia Onobrychidis flore C.B.P. fortè Vicia maritima multiflora alba Meſſanenſis Ray Hiſt. & Cat. Exter. fortè etiam Aracus minor Luſitanicus Park. Legumen pallidũ Ulyſſipponenſe Nonij. Brandonij. Ger. emac. app.

2. Vicia multiflora Caſſubica fruteſcens Lentis ſiliquâ Breyn. Prodr. 1. Cat. Hort. Ac. Lugd.

LEONARDI PLUKENETIJ

PHYTOGRAPHIA

Seu

Stirpium Εικωνες fideliter & exquisite ad vivum delineatæ ÆNEISq; TABULIS illustratæ

in Quibus

Novæ plures & Exoticæ Plantæ à nemine hactenus animadversæ nunc primum proponuntur. Necnon aliæ quædam apud Neotericos dubiæ atq; obscuræ (mutatis aliquandò Nominibus prout res ipsa postulat) perspicuâ brevitate dilucidantur.

PARS ALTERA

ET SIC MEMINISSE JUVABIT



I Collins f.

Ea quæ scimus, sunt pars minima eorum, quæ Ignoram,

LONDINI. MDCXCI.

SUMPTIBUS AUTORIS.

INCLYTO HEROI

atq;

ILLUSTRISSIMO DOMINO.

DOMINO

à BENTINGK.


COMITI de PORTLANDIA. &c. &c. &c.

φιλαβοτανῶν PATRONO longè Gratioſsimo.

LEONARDUS PLUKENETIUS

Hortorum amœnitates, ac adumbratam VEGETANTIS ORBIS Imaginem, Hisce TABULIS suis PHYTOGRAPHICIS in altera Parte contentis, exhibitam, summâ cum humilitate.

Dat. Dicat. Dedicat.



1. Absinthium Ponticum repens vel supinum C.B.P. Absinth: Ponticum supinum Herbariorum Obs. Lob. Absinth. repens Tab. Icon.
2. Absinth. Halepense tenuifolium graviodoris, comâ delicatiori. Apsinth. Santonicum Arabicum f. Bobart. fortè Schehu Arab um. Absinthij genus circa Bethlehem Rawolfy. Hist. Lugd. App. Hac pulcherrima Absinthij specie, cum plurimis alijs novis & Illustrioribus Plantis quas summâ diligentiâ àc indefeſſis peregrinationibus per totam ferè Europam, sibi conquisivit Ornatiſsimus vir, & hujus Botanices Scientiæ verè Ornamentum D. Gulielm; Sherard, nos ditavit.
3. Acacia spinosa foliolis perexiguis, & veluti crispatis, Maderaspatana, fortè Frutex folijs Acaciæ Mesopotamic; Fil. Col. Not. in Recch. Acaciæ similis Mesopotamica minutiſsimis folijs, siliquâ integrâ contortâ, crassâ, & obtusâ, s. Siliqua Nabathæa Breyn. Prodr. 2.
4. Acaciæ affinis virginiana spinosa, siliquâ membranaceâ planâ, florib; albis, papilionac. Anagyrid. modo in Uvam propendentibus. Acacia virginiana siliquis gl[illegible] Ray Hist. Arbor siliquos. virginiens spinosa, Locus Nostratibus dicta Park. Anagyris Americ. spinosa floribus albis odoratis P.B. [illegible] Laburnum [illegible] Canadens folio Coluteæ ejusd. P. B. F. Laburnum spinosum Mauritanicum folijs Glycyrrhizæ flore albo Breyn. Prodr. 1. Glycyr[illegible] siliquâ [illegible] affinis spinosa, arborescens, Mauritanica Laburni flore albo, ejusd. Br. Prodr. 2. tit. a. siliquam indigitat.
5. Adiantum exoticum Rutæmurariæ æmulum pinnulis oblongis, angustis, in summitate tripartitis, à D. Tabrco habuimus.
6. Adianth. maritimum segmentis rotundioribus, Sch. Bot. Adianth. mas Tab. Ic. C.B.P. ubi planè fatetur [illegible] assequi. Ierseiæ Angliæ nostræ adjacentis Insulæ alumna est, ut candidè nos monuit. D. Sherard.
7. Altera an Malva potiùs exotica, Pentaphylli folio profundè secta, purpurea, floribus sine pediculis.

TAB. LXXIV.



Tab. LXXIV.

1. Altea Indica fruteſcens, in lacinias variè diſsectis *folijs*, an Altea arboreſcens Iaponica folio Quercus, flore pleno carneo, in medio roſeo. Cla. Breyn. Prodr. 2. Sanſanqua Iaponenſibus.

2. Alsine Saxifraga Graminifolia, floſculis tetrapetalis herbidis & muscoſis, an Saxifraga Anglica annua Alsines folio D. Plot. Ray Hist. forte eadem Saxifraga graminea puſilla folijs brevioribus craſsiorib; & ſucculentioribus ejusd. Synops. Septentrionalibus Angliæ noſtræ à D. Lawson obſervâ. 10.

3. Alsine Polygonoides folijs tenuiſsimis per genicula binis ad ſummum caulium polyanthos. Alsine Nodosa multiflora Sch. Bot. à nunquam ſatis laudato viro D. Sherard habuimus.

4. Alsine paluſtris repens folijs lanceolatis floribus albis perexiguis. Alsine paluſtris exigua folijs lanceolatis Plantaginellæ aquaticæ instar, floſculis albis vix conſpicuis Mentz. pugil. Plantago aquat. minim. Clus. Hist. Park. Plantaginella paluſtris C. B P.

5. Alsine aquatica major repens, folijs acuminatis. Virginiana.

6. Althæa Indica Abutili ſubrotundo folio, flore luteo, ſpicato, fortè Malva Americ. Abutili folio, flore luteo ſpicato folijs incanis P. B. P.

7. Althæa Scammonij folio, floſculis albis Zeylanica P. B. P. Nilavonanghu & Wiſsadulu Zeylanenſib; dicta in Hort. Regio. Hamptonienſ. longè celeberrimo, conſpeximus, & in Horto Comptoniano collegimus.

8. Althæa Americana fruteſcens, Melochiæ folijs anguſtiorib; an Malva frutesc. Melochiæ anguſto folio, florib; albis faſciculatim congeſtis P. B. P. inter Addend. an Tsjeru-Uren. Hort. Malab. P. 9.



Tab. LXXV.

f. 1. Alsine montana capillaceo folio. C. B. P. Park. an Alpina Saſifraga anguſtifolia, minima montana Col. ecphr. quæ parùm differt ab Alsine tenui-folia muscosa ejusd C. B. P.

2. Alsine Caryophylloides anguſtifolia, multiflora, glabra, purpurascens, radice Astragaliti, an Caryophyllus sylvestris, repens, multiflorus C. B. P. nisi fortè etiam Caryophyllus Saxatilis foliis gramineis, umbellatis corymbis, ejusd C. B. P. (i.e.) Symphytum petræum s. Gypsophyton majus Thaly. Hercy.

3. Alsine Polygonoides tenuifolia flosculis ad longitudinem caulis veluti in spicam dispositis nostra. Ray Synops. Polygonum anguſtiſsimo gramineo folio, erectum. Bot. Monsp. in Maritimis circa Bostoniam agri Lincolniēs.

4. Alsine Polygonoides herbacea minor Lariceis foliis capillaceis ex uno pediculo plurimis. à D. Sherard. habui.

5. Alsine Alpina, glabra foliolis reflexis. an Saxifraga Bavarica Park. ejusd D. Sherard. humanitate accepi.

6. Alsine Spergulæ facie Bengalensis, foliis anguſtis ad geniculа binis, flosculis autem plurimis, ad caulem radiatis, semine minutiſsimo fulvo.

7. Alsine Americana Nummulariæ foliis Parad. Batav. Prodr. ab eodem D. Sherard. communicata.


8. Amaranthus Indicus verticillatus albus, Origani foliis lanugine incanis. an Amaranth: Alopecuroides Indicus herbaceus Atriplicis folio. Breyn. Prod. 2 fortè etiam Amaranthoides humile Curassavicum foliis Polygoni Par. Bat. Pr. in Hort. Reg. Hampton. observavimus

9. Amaranthoides humile Curassavicum foliis Cepææ lucidis, capitulis albis. P.B.P. Amaranthio affinis aizoides s. Amaranthoides minor Americana procumbens Sedi tertii foliis & facie, flore oblongo niveo. Breyn. Prod. 2. Trifolii spica Crithmum maritimum non spinosum Brasilienſe Ray. Hist. Perexil. do Mar. Lusitanis. s. Caaponga 1.a Brasiliensium Pison. Hist.



Tab. LXXVI.

1. *Angelica Caribbæarum elatior, Oluſatri folio, flore albo, seminib; striatis, Cumini odore & sapore.*
2. *Anchuſa repens Lithoſpermi facie, floribus cæruleis, secundùm folia prorumpentibus. Lithoſpermum virgatum Thaly. Hareyn. Lithoſp. maj. repens latifolium C.B.P. Lithoſp. majus Dodonæi fl. purpur. semine Anchuſæ I.B. Hiſt. t. 3. l. 33. p. 592. ubi Icon minus feliciter exsculpta per errorem ad pag. 692. transpoſita est.*
3. *Anchuſæ degeneris facie Indiæ Orientalis, herba quadricapſularis.*
4. *Anonis purpurea procumbens verna, s. præcox, fruticoſa, annua, viscoſa, siliquis craſsis, lentiformibus, rarius diſpoſitis. Moris. Hiſt. [illegible] forte Anonis Hispanica frutescens, folio Ciceris sylveſtris triphylli, Sch. Bot. Anonis annua ramoſa, foliis rotundis serratis [illegible]*
5. *Apocynum hirſutum scandens, Americanum flore amplo, purpureo. an Apocynum scandens Africanum hirſutum [illegible] Spectatiſsimi viri D. Foſteri Horto plurimarum Plantarum exoticarum instructiſsimo, Lambethæ ad Auſtrum sito florentem vidimus & habuimus.*
6. *Apocynum Curaſsavicum fibroſâ radice florib; aurantiis Chamænerij foliis anguſtioribus P. B. P. an Apocyn. erect. minimum anguſtif. Americ. flore umbellato, aurantio, petalis reflexis Breyn. Prod. 2. sed noſtri florum petala non reflexa sunt, sed potius inflectuntur, & ita diſpoſita ut floſculum concavum efforment.*



Tab LXXX.
f. 1. Balsamum Caprarium Antegoanum u Nevisense fœtidum. s. Arbuscula Americana Balloteolens, Scammoneæ folijs punctatis, ferrugineâ lanugine obductis, floribus parvis pentapetalis spicatis.
2. Braſsica spuria exilis non laciniata, caule magis folioso hirsutior, folijs subrotundis. Braſsica spuria minima, caule magis folioso hirsutior nostra. Ray. Synops. app.
3. Brunella Hyſsopifolia C.B.P. Brunella minor folio rigido, integro, ejusd. Phytop. Prunella angustifol. IB.
4. Bugula non crenata tomentosa, Suecica, seminibus albis. munere doctiſs. viri u Divini Verbi Prædicatoris apud Londinates Reverendiſs. D. G. Stonestreet. prorsus novum hoc Bugulæ genus accepimus.
5. Buxus Africana, rotundifolia serrata P.B.P. in Horto Regio Hamptoniens. collegimus.
6. Buxus Lauri Alexandrinæ folijs accedens Americana.
7. Cardiaca minor aquatica, Americana, flore argenteo. s. Leonuros Americana alba, folio sideritidis longiore, è seminibus natam, superiori anno, in Horto Comptoniano observavimus.



Tab. LXXVIII.

f. 1. Aristolochia polyrrhizos, auriculatis folijs, Virginiana, fortè Polyrrhizos Virginiana Park. Serpentaria altera Virginiana vulgò.

2. Asarum Virginianum Pistolochiæ folijs subrotundis Cyclaminum more maculatis. Asarum Cyclamini folio Virginiana. Banist. Catal.

3. Asparagus aculeatus triplice spina Prom. Bon. Spei, an Asparagus sylvestr. spinosa Africana Cat. Hort. Amst. colitur in Hort. Reg. Hamptoniensi.

4. Aster luteus Cisti hirsutis, ucrenatis folijs, summo caule ramoso, floribus amplis. an Herba Vulneraria. ad fluvium Pfrim. Hieronym Tragi. Conyzæ affinis Germanica C. B. P. Consolida Saracenica 3.ª Tragi. Hist. Lugd. Conyzis affinis, Herba Vulneraria, s. Solidago Saracenica 3.ª Trago hirsuta I. B. Hist. t. 2. hujus exemplar nobis amicissimè donavit D. Doody, qui & ipse inter Siccatas exoticas, & quamplurimas rariores Plantas, in Horto Potavino jamdudùm collectas, & in Chartis asservatas, quas sibi impetravit, absq; titulo invenit.

5. Aster Americanus Belvidere folius floribus ex cæruleo. albicantibus, spicis longioribus. an Aster Novæ Angliæ Tripolij floribus spicis longis dispositis P. B. P.

6. Aster American; multiflorus, flore albo Bellidis, disco luteo D.^{na} de Flines. Sch. Bot.



Tab. LXXIX.

1. Aster American. albus latifolius, caule ad summum brachiato, si color florum, & foliorum conjugata poſitio non obstarent, hanc Tlalo-
 celoxochitl Nov. Hisp. Recch. eandem plantam eſse suspicaremur.
2. Aster Americanus albus Mezerei Arabum exasperatis folijs, florum petalis reflexis.
3. Astragalus annuus folijs & siliquis hirsutis, plurimis in foliorum alis seſsilibus. Astrag. siliq. & folijs hirsutis floribus parvis Moris. Hist. 2. Fænu-
 græco sylvestri Tragi in quibusdam accedens Planta I B. Hist. t. 2. Astragalus marinus Bæticus Park. Vicia Sesamacea Apula Col. ecphr.
4. Astragalus hirsutus corniculis plurimis uno pediculo stelliformiter adaptis. Ornithopodio affinis hirsuta fructu stellato C.B. P. Stella leguminosa I B.
 Hist. t. 2. munere Ornatiſsimi Viri D. Patricij. Adair accepimus.
5. Astragalus Pyrenaicus incanus, folijs Viciæ, flore sulphureo. Sch. Bot.
6. Auricula Ursi Virginiana floribus albis Borraginis instar rostratis, Cyclaminum more reflexis. à Celeberrimo Botanico D. Banister. in Angliam
 nuperrime transmiſsa.



Tab LXXVII.

f. 1. *Apocynum American. erectum tuberosâ radice non incanum, folijs rigidioribus latis subrotundis, florib, alb. intùs purpureis, summo cauli corymbum magnum efformantibus. an Apocyn. Americ. arborescens, folijs rigidis, subrotundis, amplissimis. P. B. P. forte Apocynum erectum non ramosum, latiore folio, Umbellis florum albicantibus* **Banister. Cat. Stirp. Virg.**

2. *Arbor Americana Morifolia, vasculo seminali verrucoso conicasulo, ovali, Balsamum olente. Cedrus spuria Jamaicensib; nostratibus dicta.*

3. *Arbor Orientalis Bellidis spinosae solidioribus folijs, capsulis parvis quadripartitis, Kiluke Cingalensib; dicta hujus Speciminis exsiccatum* [illegible] *Robinson. debemus*

4. *Arbor Americana triphylla fructu Platani quodammodo aemulante. Lignum fibularium (i.e.)* **Buttonwood.** *Nostratib; dicta.*

5. *Arum triphyllum minus pene atro rubente Virginianum. Arisarum triphyllum minus pene atro rubente* **Banister.**

6. *Arum Moschatum Ophioglosſoid. s. pene nudo Jamaicense. an melius Ophioglosſum Moschatum Jamaicense Limonij folijs in extremo Sinuatis. an Ariſarum fluitans pene nudo Virginianum.* **Banist. Cat. Mſs.**

T. AB. LXXXI.



1. Caſsia lignea Jamaicenſis, cortice acri candicante. Canella alba Cluſij. Laurifolia Magellanica cortice acri C.B.P. Cortex Winteranus acris, s. Canella alba I.B. an Ligni aromatici Monardis cortex.
2. Carduus Tingitanus, flore magno, cæruleo, folio Attractylidis diviſurâ subtùs incano, spinis durioribus horrido.
3. Caryophyllus sylveſtris Alſines holoſteæ arvenſis glabræ folijs flore unico, Calyce barbato Armeriæ ſpecies flore summo caule singulari noſtra Raij. Synops. app. fortè Caryophyllus sylveſtr. humilis flore unico C.B.P. an Lychnis Meſſanenſis parvo flore rubello, 2. Calyce oblongo anguſto Raij. cat. Exterar.

Centaurium ciliare minus, Biſnagaricum Origani folijs amplioribus, floribus in Umbellis.

Chamædryfolia, Scandens claviculata & Corymbifera Jamaicenſis. hùc fortè pertinet Bryonoides. s. Temecatl-Yauctepecenſis Mexicenſibus Hernand.



Tab. LXXXII.
f. 1. Bellis montana minor Tanaceti folijs Moris. Præludd. Tanacetum montan. inodorū, minori flore C.B.P. Tanacetum album I.B. Hist. l. 3.
Tanacetum inodorum secund. Clus. Hist.
2. Centaurium Ciliare minus, Circææ folijs firmioribus, spicatis floribus e Maderaspatàn.
3. Ceratia diphyllos Antegoana, Ricini majoris fructu osseo siliqua grandi incluso. Arbor siliquosa ex Virginia lobo fusco scabro. C.B.P. itèm Arbor siliquosa ex quâ, Gummi Anime elicitur, ejusd. C.B.P. Jetaiba arbor Gummi Anime fundens, Pison. Aloriæ quodammodò accedens, Arbor Anime Gummi fundens, Americana, folijs magnis, acuminatis, in pediculo binis, Lobo magno crassissimo, eduli. Breyn. Prodr. 2. Animifera arbor Brasiliana P.B.P. hujus siliqua est Lobus ille ex Wigandecaow, de quo Clusius. in exot. Locus Nostratib; bulgò, aa. Lobum. bb. bb. fructum indicant.
4. Ceratiæ quodamodo affinis Bengalensis, folijs bigemellis, subrotundis, siliquis admodum intortis, & in orbes circumflexis, ex minio nigricantibus fructu rubro, maculâ nigrâ insignito. an Avaramo-Temo Brasiliensibus Pisoni? a. siliquam b. fructum indigitant. in Horto Comptoniano enutritam bidimus.

APPENDIX

ad Rariorum Plantarum Icones

LEONARDI PLUKENETIJ.

Proptèr Literarij Sculptoris incuriam, aùt saltèm nostram in hoc opere properantiam contigit, Iconem Tab. 82. Fig. 5. adscriptam, absq; titulo exhiberi; hujus ergò Synonyma hìc subnectere lubet, ut suo loco reponantur. Viz.

5. Cerasa Hottentottorum; Lycium Africanum fructu Cerasi rubro. Parad. Batav. Prodr. 349. Rhamnus Africana Cerasi fructu ejusd. P. B. P. 369



Tab. LXXXIII.
f. 1. Chryſanthemum minus Alpinum elegans, flore magno albicante foliis craſsis, Saxifragiæ chelidonides accedentib; hæc elegans planta Chryſan-themo Corymbifero Africano Triumfetti, quòad folia, optimè convenit, à D. Parry, ad exsculpendam accepimus.
2. [illegible] Dor[illegible] ⟨…⟩ foliis impenſè ſcabris Maderaspatanum, florum petalis quinis tetragonis, & calyce amplo viridi fiſtuloſis.
3. Chryſanth. anguloſis Platani foliis Virginianum. Doronicum maxim. American. latiſsim. anguloſis fol. radice tranſparenti, Cat. H. Ac. Lugd. [illegible] latifol. Braſilianum C.B. prodr. forte Nouitepiat quadrilatera Hernandez.
4. Chryſanth. Virginian. villoſum disco luteo petalis quinis ornato. Chryſanthem. pentapetalon villoſo caule Banist. Cat. Mſs.
5. Chryſanth. hirſutum Virginian. auriculato, Dulcamaræ folio octopetalon. Chryſanth. folio oblongo auriculato Banist. Cat. Mſs.
6. Ciſtus humilis. Chamæciſtus Ericæ folio luteus & elatior C. B. P. Helianthemum tenuifol. glabrum flore luteo I B. Hist. t. 2. Chamæciſtus Ericæ folio Park. Cori ſimillimus, Frutex in maritimis Andr. Cæſalp.



T. LXXXIV.

1. Chrysanth. Alpin. Bellidis folio caule singulari. Chrysanth. parvum, s. Bellis lutea parva latifolia I B. Hist. t. 3. Chrys. Alpestre Bellidis folio Cat. H. Pat. à Turre.
2. Chrysanth. Alpinum Bellidis folio ramosum.
3. Chrysanth. Americ. bidens alatum flore parvo aurantiaco. Chrys. [illegible] caule Curaſſavicum P.B.P. Chrys. cannabinum American. alatum, flore aphyllo, globoso, aurantio, folijs Baccharidis. Breyn. Prodrom. 2.
4. Cistus Helianthemos Ericæ brevioribus folijs & humilior, C. B. P.
5. Cistus Alpina humilis, folijs Thymi minutiſſimis.
6. Cist. humilis Maſsiolotica Camphorata tenuiſſimis folijs glabris Chamæcist. Maſsilien. Corruda vel Coridis luteæ folio Schol. Bot. hanc eandem eſſe plantam, cujus o̅ia folia tenuiſſima Camphoratæ similia & glabra, quam Celeberrim; noster Rajus circa Maſsiliam invenit, ab ornatiſſimo Botanico D. Sherard. meritò cenſetur.
7. Clematis Alpina Geranifolia C.B.P. & Prodr. Clematis cruciata Alpina Ponæ. Descript. Montis Baldi.
8. Clinopodium minus exoticum Thymi folio majore. Clinopod. Creticum Pr. Alpin. Thymum exoticum flosculis nunquàm expansis D. Bobart.
9. Conferva geniculata minima nostras. Oculatiſsimus D. Sherard. hanc eſſe Umbelliferam aliquandò suspicabatur.



1. Clinopodium minus exoticum Thymifolio minore. Clinopodium Thymi folio & facie Schol. Botan. Has 5 plantas noviſsime recenſitas, à D. Sherard accepimus.
2. Clinopodium Amaraci folio, flore albo Americanum Dictamnus ibi vocatum.
3. Convolvulus Sagittariæ foliis, flore purpureo Wheeleri. ab Inventore habui.
4. Convolvulus Scammonea dictus macrorhizos. an Scammonea macrorhizos Pr. Alp. exot. Scammonea macrorhizos. Cretica Park. hanc enutrivit jampridem in Horto suo D. Edvard. Morgan.
5. Cucumis parva repens Virginiana fructu minimo Banist. Cat. MSS. e fructum d.d. semina denotant.
6. Cupreſsus Virginiana foliis Acaciæ cornigeræ paribus & deciduis. Cupreſsus Virginiana foliis Abietis mollib.; atq deciduis Breyn. Pr. 2. Cupreſs. Americana Park. Tlatzan s. Cupreſsus Americana fusa Evan. Hab. Paludanis cujus fructus seu formam spectes seu squammarum amplitudinem ab hujus nuce haud multum abludit, ut rite notat Cl. Rajus: ob loci tamen Natalis distantiam eandem non ausus est affirmare. lit. a. a. a. hujus nucem integram & diversimode diſsectam. b b. nucleos ostendunt.



Tab LXXXVI.
f. 1. Cytiſus folijs viridib; anguſtis quaſi complicatis Monſpeliens. C.B.P.
2. Cytiſus procumbens Americanus, fl. luteo ramoſiſſimus, qui Anil ſuppeditat, apud Barbadenſium colonos. Chamæ-Indigo sylv trifoliata Barbadenſib; an Cytiſus humilis procumbens P.B.P.
3. Doronicis affinis longifolia Ray Hiſt. Tuſſilago Alpina folio longo I.B. Hiſt. l. 3. Tuſſilago Alpina folio oblongo C.B.P. Doronicum Pyrænaic. Perſicæ folijs glabrum Schol. Botan. ubi pro non deſcript. ponitur.
4. Elatines folia piloſiſſima papilionaceo flore Maderaspatana.
5. Eliochryso affinis Orientalis foliolis ad genicula binis, flore pentapetaloide argenteo apicibus aureis paleacco.
6. Eliochryso affinis Oriental. ramoſior foliolis caulium nodos radiatim ambientib; Comâ paleaceâ, flore albo lituris aureis striato.
7. Eruca sylveſtris minor lutea Burſæ paſtoris folio C.B.P. Eruca pumila Burſæ paſtoris folio Boccon. Eruca Monenſis laciniata lutea Raij Hiſt.
8. Eruca Virginiana Bellidis majoris folio Moris. Hiſt.



Tab. LXXXVII.
f. 1. Eupatoria conyzoides Verbasci folia, s. Baccharis Americana suaveolens. Eudexylon (ie) Sweetwood. Barbadensibus dicta.
2. Eupatoria conyzoid. odorata folio crenato, molli subincano. Serratula Noveboracensis, folio leviter crenato, molli subincano P. B. P. fortè, Serratula Indica major latifolia mollis Breyn. Prod. 2. Iacea v. Serratulæ affinis, capitulis Baccharidis folijs Trachelij Zeylanica. ejusd. Prod. 1. Cattu-Schiragam Hort. Malab. P. 2. forſe etiam Conyza Syriaca Rawolfij. Hist. Lugd. app.
3. Eupatorium Americanum, Meliſsæ folijs magis acuminatis. an Eupatorium Novæ Angliæ, Stachidis s. Betonicæ folijs crenatis floribus albis P. B. P. fortè etiam Eupatorium Americanum Nepetæ folio latiore floribus albis brevioribus; Breyn. Prod. 2.
4. Eupatoria conyzoides maxima, Canadensis folijs caulem amplexantibus. Conyza major, alato caule folijs Primulæ veris longè amplioribus, graviter odoratis. Lælij Triumfetti. apud Fratrem. an Virga aurea latiſſimo folio, Canadensis glabra Schol. Botan.
5. Eupatoria Conyzoid. integro Iacobææ folio glabro v. duriusculo, Indiæ Orientalis. fortè Iaceæ v. Serratulæ affinis Breynij. Cat. H. Ac. Lugd. app. hanc enim Cl. Hermannj, à Cattu-Schiragam. Hort. Malab. non separat. cum re verâ sunt Plantæ inter se admodum diversæ, ut ex Iconibus nostris liquidò patebit. Eruditiſſimo D[ri]. Sherardi hujus notitia debetur.
6. Eupatorium Virginian. Salviæ folijs longiſs. acuminatis perfoliatum. Huic folia longa mucronata bina opposita v. ad basin ità continua invicem, ut ea caulis transadigatur, sinum quendam, seu cavitatem pelvi aquæ continendæ similem, efformant.



Tab. LXXXVIII.

f. 1. Eupatorium humile Africanum Senecionis facie foliis Lamii P.B.P. Senecio Africanus Lamii folio Acad. Reg. Paris. Senecio Americanus Lamii facie Schol. Botan. fortè Virga aurea humilis Alpina Moris. Præclud. fortè eadem Virga aurea folio Veronicæ Mentzelii. Fascic.

2. Eupatoria hirsuta Hyſſopifoliorum æmula Virginiana, an Tlalchinol-Xochitl: s. Venerea Medicina 2ª. Hernandez Hist. Mexic. p. 138. & 415.

3. Eupatoria Valerianoides, flore niveo, Teucrij foliis, cum pediculis Americana.

4. Eupatoria Valerianoides, Triſſaginis folio, absq; pediculis, Virginiana, Cacalia folijs rotundioribus, ad caulem ſeſſilibus Baniſter. Cat. Mſs. an Tlacoxochitl Nov. Hispaniæ Recch. p. 418.

5. Evonymus Canellæ albæ folijs è Maderaspatan. D^ris Frederici Slare favore, ad exsculpendam accepimus.

6. Evonymo adfinis Arbor Orientalis nucifera, flore roseo. Styracis Evonymo media affinis, The Sinensium, sive Tsja Iaponensibus flore simplici. Breyn. Prod. 2. Thee. frutex Bontij, hujus flores munere D. Petiver accepi.

TAB. LXXXIX.



Tab. LXXXIX.

1 . Ebenus Jamaicensis Arbuscula Buxi folijs spinosa flore luteo papilionaceo siliquifera.

2 . Filix saxatilis, non ramosa, minima. Ray. Cat. Exter. ar. ubi dubium movet àn sit Dryopteris Dalechampij IB.

3 . Filix saxatilis, omnium minima elegantiſsima. Cat. Hort. Reg. Paris.

4 . Filix Alpina Myrrhidis facie Cambrobritanica àn Filicula fontana Adianti facie latifolia dentata Schol. Botan.

5 . Filicula pumila Lonchitidis Maranthæ species Cambrobritannica. àn Lonchitis aspera Ilnensis Hist. Lugd.

6 . Filix parva Cambrobritannica pinnulis latis, auriculatis, brevibus, aculeata. has tres noviſsimè enumeratas Filices ab Inventore D. Lloyd. accepit insignis Botanicus D. Sherard. à cujus liberalitate & ipse habui.

7 . Filix minor Africana Lonchitidis folio, pinnulis auriculatis planis. Filix Africana minor Lonchitidis facie P. B. P. in Hort. Regio. Hamptonens. longè celeberrimo. ...

8 . Filix Virginiana pinnulis oblongis, angustis, auriculatis, tenuiſsimè crenatis, longè ab invicem distantibus, non spinosa.

9 . Filix folio ... Polypodium tenuifolium minus Virginianum.

10 . Fagi folijs alterno positu alatis, Arbuscula Bisnagarica.



Tab. XC.
1. Foenum græcum Phaseoloides, Virginianum flore amplo cæruleo, Securidaca trifolia flore patulo cæruleo, radice Glycyrrhizæ sapore Banister Cat. Mſs.
2. Fumaria Tingitana, radice fibrosa perennis, flore ex albo flavescente siliquis curtis. an Fumaria semper virens & florens ex Hortis Batavis Cat. H.R.P.
3. Fumaria siliquosa, radice grumosâ, flore bicorporeo, ad labia conjuncto, Virginiana. Fumaria siliquosa grumosâ radice flore gemello monstroso. Banister.
Cat. Mſs. an Fumaria Canadensis radice tuberosâ squammatâ Acad. Reg. Paris.
4. Fungis congener, Acetabulum petræum, s. Fungus minimus petræus, orbiculatâ crustulâ compositus. D. Lloyd. Raij Synops.
5. Galegæ degener, folio singulari floribus parvis herbidis muscosis. Galega unifolia flore herbaceo. Cat. Hort. Patav. Georg. à Turre.
6. Gentiana Maderaspatensis, folijs Æsclepiadis, caule ramoso.

TAB. XCI



Tab. XCI.

f. 1. Genistella Montis ventosi spinosa I.B. Hist. t. 2. Genistella Monspeliaca spinosa C.B. prodr.

2. Gramen cyperoides exiguum seminibus bullatis, Raij Observat. 444. ex mente D. Sherard. qui nobis ad exsculpend. dedit.

3. Gram. Cyperoid. Americanum spicis speciosis, plurimis, compreſsis, summo caule absq; pediculis agnatis. an Gramen maritimum Cyperoid. Curass-avicum panicula punicante P. B. P. Gram. Cyperoid. minus, panicula sparsa spadicea. forte Jaç-ape Brasiliensibus Pisonis.

4. Gram. Cyperoid American. spicis majorib; oblongo rotundis Sparghanij in modum echinatis, ad summu caulem pediculis longis innitentibus.

5. Gram. dactylon Orientale majus frumentaceum semine Napi. Coracan Cingalensibus D. Knox. Itinerar. p. xi.

6. Gram. parvum Gangeticum spica gemella habitiori. an Gram δυσαχυοφορον. Col. ecphr. 338. hujus spicæ Amaraci capitula squammata quo-dammodo exprimunt.

7. Gram. Cyperoid. foliis Caryophyllais, spica granis rarioribus, & tumidioribus conflata Ray Synops.

8. Gr. Cyperoid. tenuifolium spicis ad summum caulem ſeſsilibus, globulorum æmulis. Gr. Cyp. foliis mollib; tenuibus spicis brevibus, coacervatis tribus quatu-orve in summitate caulis, Ray Hist. forte Gr. Cyp. minimum Ranunculi capitulo rotundo D. Bobart. ejusd. Ray Synops. Stirp. Britan.



1. *Gram. dactylon Siculum, multiplici paniculâ, spicis ab eodem exortu geminis* Raÿ Hist. *an Festuca junceo foliospicâ geminâ* C. B. P.
2. *Gram. amoris alterum, paniculis strigosioribus, magisq; sparsis* Raÿ. Cat. Exter. Gr. *in Historia autem omissa est.*
3. *Gram. American. spicâ echinatâ majoribus locustis* Schol. Botan. *fortè etiam Gram. aculeatum Curassavicum* P. B. P. *seminibus à D. Sherard. communicatis in Horto D. Doody, exoticarum refertissimo enatum primò observavimus.*
4. *Gram. Alopecuroides Indicum minus spicâ Sericeâ candidâ laxiori.*
5. *Gr. Indicum Alopecuroid. holosericeum majus, spicâ longâ pappescente. an Gram. Alopecuroides Curassavic. spicâ longissimâ Sericeâ candidâ.* P. B. P.
6. *Gramen Miliaceum Americanum minus, paniculâ parvâ.*
7. *Gr. Miliaceum American. maximum, paniculâ minore.*
8. *Gr. Miliaceum Americanum medium, paniculâ magis sparsâ & speciosâ.*
9. *Gram. junceum elatius, pericarpijs ovatis Americanum.*

TAB. XCIII.



Tab. XCIII.

1. Hedera Clematitis Atragenes singulari folio splendente Virginiana.

2. Helleborine Virginiana, Ophiogloſſi folio. D. Banister. hujus Exemplar pulchrè exsiccatum nec non picturam propriâ manu ad vivum apprimè delineatam Eruditiſſimus Inventor non ita pridem amicis suis in Angliam transmisit.

3. Hieracium folijs in tenues lacinias profundè sectis, flore luteo. Chondrylla lutea I B. t. 2. Chondrilla Coronopi aut Cyani facie, tenuifolia lutea vinearum Adv. Sonchus lævis in plurimas lacinias divisus C.B. Pin. & Prodr.

4. Hypericum ferè orbiculato folio floribus amplis, pallidè luteis, petalis florum in ambitu crenatis. Hypericum Nummulariæ folio C. B. prod.

5. Hypericum Ericoides minimum, folijs cinereis, ex Hispania. an Hypericum Francorum, non scriptum, tenuifolium, Belluc. Ind. Hort. Pisan. Invenit in Hispaniâ D^r. Turnefort.

6. Hypericum Alpinum, magno flore, nigris punctis, insignito Sch. Bot. forte Ascyron magno flore C. B. Prodr. Has tres proximè antecedentes, novas, aut saltèm, minùs cognitas Hypericorum species, munere præstantiſſimi viri D. Sherard accepimus.


7. Jacea tenuifolia purpurea, capitulo Calcitrapæ in modum aculeato. Capitulis spinosis Jacea Adv. Jacea cum spinosis capitulis, purpurea, tenuifolia I B. t. 3. lib. 25. an Stoebe squammis asperis C. B. P.

TAB. XCIV.



Tab XCV.

1. *Laureola latifolia floribus albicantibus, odoratis, Americana. sub nomine Jasmini Americ. Aurantiæ folio collegimus in Hort. Reg. Hamptoniens.*
2. *Imperatoria Ranunculoides, Africana, cuneaphyllos, Laserpitij lobatis folijs rigidis, margine spinosis. Ranunculus per elegans D. Franqueville, folijs aculeatis. Lob. Illustrat. 135. Sphondylij s. Panacis rigido, hirtoq; folio, Planta Africana caustica. P. B. P. Nostræ tamen folia sunt penitùs glabra, & lævore splendentia. ideò q; tota planta Laserpitio propius accedit, quàm Sphondylio, Umbellifera aurens. Cap. Bon. Spei. bulgò. in Hort. Reg. Hamplon. Observavimus.*
3. *Juncus Orientalis, paniculâ speciosâ è Maderaspatàn. Humaniſsimi Viri & Mercatoris Londinensis celeberrimi D. Hileard. favore accepimus.*
4. *Kali ſuraſuvirum procumbens, folijs subrotundis P. B. P. 344.*
5. *Kaka-Toddali (fortè) Malabarica, ex Oris Cormandel. H. M. part. 5. Frutex baccifer. Indicus, spinosus, trifolius, floribus spicatis, fructu plano, rotundo, tricoc— Raij Hist.*
6. *Limonium (forte) peregrinum folio, solidiori textura in lacinias bariè diſsecto. à D. Edv. Morgan. jàm olim exsiccatum accepi.*
7. *Juncus elegantiſsimus capitulis pectinatis Prom. Bon. Spei. D. Sherard amicè nobis communicavit.*



Tab. 95.
1. Jacea marina Bætica Park. an Jacea purpur. maritim. capitulo spinoso Neapolitana Raij Cat. Exter.
2. Jacea peregrina Napifolia hirsutis capitulis alata, è seminibus à D. Sherard, cum ab Exteris in Angliam rediret, secum allatis, & ab ipso communicatis, in Hortis quibusdam Curiosorum, apud Nostrates nata est, & nuper vivide succrevit in Hort. Acad. Oxon. sub auspiciis Dni Bobart. qui hujus specimen nitidè exsiccatum nobis amicissimè transmisit.
3. Jacea frutescens Pini folio C. B. P. Stoebe capitata Rosmarino folio Ponæ s. Chamæpitys fruticosa Cretica Belli. J. B. l. 3. Stoebe fruticosa angustifolia Cretica Park. an Chamæpeuce Pr. Alpin. exot. [illegible] Illustrioris hujus Plantæ nobile specimen à Reverendiss. D. Wheeler. ad sculpend. impetravimus.
4. Jasminum bacciferum Americ. [illegible] al. rectius Evonymo adfinis Occidentalis, [illegible] Rusci foliis nucifera, Cortice ad genicula fungoso. Guaiacum American. alterum fructu Evonymi Breyn. Prod. 2. Guaiacum foliis Lentisci Horto Fageliano ejusd. Breyn. Prodr. 2. Packhout Belgarum sub Jasmini titulo in Hort. Reg. Hamptoniens. primum nobis innotuit. a. fructum [illegible], quatuor obtusis angulis constantem, ostendit.



Tab. XCVI.
1. Laserpitium exoticum, lobis longiſsimis, integris Ammeos quorundam diviſuris, à D. Sherard habui.
2. Liguſticum humilius, Scoticum à Maritimis: s. Apium maritimum dulce, Scoticum Ap. ... Scoticum & Apium marinum quibusd. Newtono Ray Hiſt. Imperatoria affinis Umbellifera maritima, Scotica Sibbald. Prodr. & Cat. Hort. Edinburg. an Liguſticum quorund. foliis Angelicæ I. B. l. 3. quod in Alpib. Liguriæ vulgo Imperatoria vocatur, ut in hujus Deſcript. notat Caeſalpinus. an Libanotis Apii folio ſemine aspero C. B. P. Rosmarinus foliis Selino ſimilibus quæ Libanotis legitima Theophr. Belli. epist. 1. ad Clus. ... vulgo, quod vertiginem inducere credatur, ni fallor (inquit Bellus) Siler Cretic. à quibusd. perperam vocatur. Siler marit. Scoticum Imperatoriæ facie Breyn. Prodr. 2.
3. Linaria lutea flore minimo C. B. P.
4. Linar. triphylla major, floribus parvis pallescentibus, rictu aureo, calcari ſub cæruleo, donatis. an Linaria latifolia triphylla major. C. B. P. Linaria Cretica latifolia Clus. Hiſt.
5. Loto affinis Corylifolio Acad. Reg. Paris. Anthyllis Ulmifolia quorundam.
6. Lycium Italicum Bod. à Stap. in Theophr. Lycium Buxifolio C. B. P. Lycium Buxifoliis rotundioribus, Syriacum, vel Perſicum Breyn. Prod. 2. Osrum Persarum, Rhamni ſpecies Adolph. Vorſt. cat. Hort. Acad. Lugd.
7. Laurifolia fructu parvo, typhoide non papposo, gemello, ſiliquas æmulante, Arbuſcula Maderaspatana.




Tab. XCVII.

1. Lycium minus, cordatis Buxi folijs Maderaspatanum. fortè Lycium Hispanic. folijs Buxi C. B. P. Tamaio s. Lycion berum Fragos. an Lycium Buxi folijs angustioribus, Syriacum. Breyn. Prodr. 2. Lycium Dioscoridis. Hadhad Arabibus, & Zaroa Incolis Montis Libani. Rawolfij. Itinerar.
2. Lycium Maderaspatanum, Indici Alpino putati æmulum, bijugis, & grandioribus aculeis horridum.
3. Lycium Bisnagaricum, acuminatis, minus durioribus folijs, & aculeis ex opposito binis. Tsjerou-Karæ Hort. Malab. simile, si non idem.
4. Lycium putatum Indiæ Orient. Capparis rotundiorib. folijs, & aculeis ex adverso gemellis.
5. Lycium Beloxylon, binis aculeis in ramulorum fastigijs, Americanum. ex hujus ligno sagittas, è fructubus Atramentum conficiunt Indigenæ. Dartwood & Inke-berry à Nostratibus nuncupatur, à D. Sherard. specimen ad exsculpendum datum est.
6. Lycium majus Americanum, Jasmini flore, folijs subrotundis lucidis. Jasminum spinosum American folio lucido subrotundo. P. B. P.
7. Lycium Myrti folijs subrotundis, Americanum, lactescens, limbis foliorum argentatis.
8. Lycium (fortè) non spinosum, crassis & incanis folijs P. B. P. rectius autem, Cerasus Sebestenæ domesticæ folijs, aliquatenus accedens. Prom. Bon. Spei. Capsi Carsiboom vulgò Belgarum.
9. Lychnidis, aut potius Alsines cognata dispermos; s. Chamæjasme tetrapetaloides inodora, quadrato caule Virginiano.




Pseudo-melanthij folijs pilosis, flore albo, pentapetaloide, fistuloso
Tab. XCVIII. 1. Lychnidea umbellifera Blattariæ accedens Virginiana major, repens hirsutis Camphoratæ folijs, floribus fistulosis in Umbellam positis.
2. Lychnidea Blattariæ accedens Virginiana minor, repens, Camphoratæ congeneris glabris folijs, flore ad summitatem ramulorum singulari.
3. Lychnidea Blattariæ accedens Virginiana Camphoratæ, Anonidis vernæ frutescentis folio singulari glabro, Gratiolæ affinis frutescens Americana folijs Ageratii,
4. Lysimachiæ purpureæ affinis Americana procumbens, Anonidis vernæ frutescentis folio singulari glabro, Gratiolæ affinis frutescens Americana folijs Ageratii, s. Veronicæ erectæ majoris Breyn. Prodr. 2. hanc plantam Capræ apud Belgas Curassavienses pro pabulo avide petunt inde Capraria Curassavica, Cabritta vulgo P. B. P. quam D. Wheeler. sponte natam in Græcia observavit, ubi Cusermobt a Turcis nuncupatur. Florem habet nivei coloris pentapetaloidem, capsulam, cylindrica figura bipartito divisam seminibus parvis turgidam.
5. Lysimachiæ purp. affin. fruticosior Anonidis singulari hirsuto folio Maderaspatensis.
6. Malus Granata Zeylanens aculeata. Granata Malus Zeylanica spinosa P. B. P. an Kalu-naregam H. M. part. 4. in Horto Reg. Hampton. collegimus.
7. Melilotus Indiæ Orient. minima dispermos folliculis in summitate aduncis. an Melilotus minimo, Syriaco Nephel, s. Nephal Ibnbaithar, & Malasesæ Breyn. Prodr. 2.
8. Muscus polytrichoides pellucidus fere, folijs denticulatis, ad margines veluti crispis noster. Ray Synops. Stirp. Britan. append. an Polytrichum aureum medium ejusd. Ray. Histor.
9. Muscus denticulatus minor C. B. P. Park. Muscus terrestris Lusitanicus I. B. t. 3.

TAB. XCIX.



f. 1. Marrubium aquatic. fol. integris longis perangustis Maderaspatanum. àn Marrubium palustre Canadense tenuius glabrum Sch. Bot.
2. Melampyrum cristatum I. B. t. 3. àn Melampyr. luteum angustifol. C. B. P. Park. quærit & ipse Cl. Rajus.
3. Melampyro affinis tetraphylla Gangetica, floribus inter folia sparsis, àn Adel-Odagam H. M. part. 9. hujus semen, mellei coloris lucidum, singulare, nudum, grani triticei æmulum insidet super basi foliorum cristatorum duplici serie binas membranulas rigidiores, alteram alteri longiorem, circum ambientium constructa
4 Mercurialis tricoccos hermophroditica. s. ad foliorum juncturas, ex foliolis cristatis, julifera simul & fructum ferens. Banist. Cat. Stirp. Virg. à Mercurial. Zeyl. tricocco, cum acetabulis Cat. H. Ac. Lugd. append. plurimum differt, ut ex utriusq; picturâ cuivis patet.
5. Mespilus Virginiana spinis longioribus rectis, folijs quodammodò auriculatis.
6. Millefol. palustre, galericulato minus. Reverend. Vir & amicus noster singularis D. Dodsworth. in agro Eboracensi sponte natum, invenit, & jampridèm nobis benignè communicavit.



Tab. C.
f. 1. *Meſpilus Virginiana Groſſulariæ foliis.*
2. *Muſcus rupeſtris, repens, Virginianus, clavis folio[illegible] erectis, quadratis* Baniſter. Cat. Mſs.
3. *Muſcus filicinus elegans* s. *Bovonregis* Prom. Bon. Sp. *Pullurjoory Hottentottorum* à D. Sherard. acceptmus.
4. *Myrrhis annua ſemine roſtrato, ſtriato, aſpero* & *oblongo. nodoſa* Moriſon. Umb. *Myrrhis ſylveſtr. Cretic. nodoſa ſeminibus aſperis* Raÿ. Hist.
Seſeli Cretenſe nodoſum, Park. *Chærophyllon alterum geniculis tumentibus*. Cat. H. R. P.
5. *Myrrhis perennis lutea Daucoides* Moris. Umb. & Præludi.
6. *Myrtus Brabanticæ affinis Americana foliorum laciniis Aſplenii* · *modo diviſis, julifera ſimul* & *fructum ferens.* forte *Canambaya Braſilienſib*; Marcgrav. forte etiam *Cardiaca Mulleriana Indica* Bod. à Stap. in Theophr. 320. *hujus ſemina ſingularia capſulis bivalvib*; *extrà globum echinatum emergentibus, continentur.*
7. *Eadem, cum ramulo conis, s. nucamentis, onuſto.*



Tab. CI. f. 1. Muscus palustris in Ericetis nascens floridus, noster. Ray Synops. app. at nimius incautè floridum pronunciavim; capitula quidem hujus pedicellis innixa, versus ramulorum apices, operculis eorum jam delapsis, flosculos tam pulchrè æmulantur, ut primo intuitu nobis imposuere; ex quo demum agnosco, nihil aliud eſse quam Muscus palustris terrestri similis Ray Histor. Pl.

2. Nardus Americana procerior foliis caryis huic proximè cognata est Teripeti bel Tripolitzil Nov. Hisp. Ant. Recch. p. 412.

3. Nasturtium petræum Cambrobritannicum Iohnson. Merc. Bot. part. alt. Passim in excelsis rupibus Arvoniæ & Mervinjæ v. g. Moelyn rhudh juxta Phestiniog y Clogwin du y yr Ardhu, Clogwin y Garnedh propè Lhandberys invenit Plantarum Britannicarum ſagaciſsimus Investigator D. Lloyd.

4. Nastart. Bursæ pastoris folio Virginianum flore albo, siliquâ compreſsâ in Hort. ber è Urbano D. Doody primò Observavimus.

5. Nasturt. African. floribus albis spicatis, & foliis ternis Christophorianæ facie P. B. P. in Hort. Reg. Hamptoniens. collegimus.

6. Nil. s. Anil sylvestre Cynanchicæ foliis Bisnagaricum. an Manneli Hort. Malab. P. 9. quam Genistellæ tinctoriæ speciem facit Commelinus in Not. supr. loc.

7. Ninzin, s. Zingin, & Ginseng Radix genuina Indiæ Orientalis. apud Miſcell. Curios. Ephem. Germ. decur. 2. Ann. 52. p. 73. sub hujus titulo plurimas Icones bidesis, inter quas Ginseng Cleyeri Japoniensis Terræ alumna huic nostræ quam maximè accedit. Quùm Ninzin Bontii ab hac planta plurimum differt hujus radicem munere Amiciſsimi Viri D. Gedley accepim; frondium effigiem ope & favore Cl. Viri Dris Tancredi Robinson.



Tab. CII.

1. Onobrychis Maderaspatana diphyllos siliculis asperis. hujus notitiam humaniſs. æquè ac Clariſs. Viri D[ris] Frederici Slare favori debemus.
2. Onobrychis. s. Hedysarum Clypeatum Alpin. perennis siliquâ glabrâ, fl. albo Sch. Bot. Onobrych [illegible] lævis C. B. P. & in Prod. à D. Sherard. habuimus.
3. Ornithogalo affinis Virginian. flore purpureo pentapetaloide Banist. Cat. Mſs.
4. Oxys purpurea Virginiana, radice Lilij more nucleata, capitulis postquàm defloruerit bulbillis, ut in Allio corvino conflatis. Trifolium acetoſiſsimum, radice parvâ rotundâ Lilij more imbricatâ Banist. Cat. Mſs. a. capitulum bulbillis suis onustum in digitat.
5. Pedicularis. s. Crista galli affinis Virginiana Ajugæ multifido folio, apicibus coccineo floribus pallidis in spicam congestis. Euphrasia Virginiana comis coccineis flore albido theca foliaceâ incluso Banister. Cat. Mſs.
6. Phaseol. tuberos. Cap. Bon. Spei sub Batatas Capensis trifoliatæ titulo accepimus.
7. Potomogeito similis Graminifolia ramosa, & ad genicula polyceratos. Potomogeito affinis Graminifolia aquatica Ray. Histor. Plantar.

TAB. CIII.



Tab. CIII.
f. 1. Palma Hajri Park. Theatr. Palmæ facie Hajri I B. t. 1. Palma American. spinosa C. B. P. Palma Braſilienſis ... Pison ... Palmiſte epineux ... P. 80. forte Macow Arbor Barbadenſium Ligonis. hujus Arboris lignum marmori nigro ſimile, ferri modo in aquâ fundum petit, exinde Ebeni ſpeciem eſſe quidam autumant. plurimas haſce ex Inſulâ Jamaicenſi allatas in Horto Comptoniano aliquandò conſpeximus.

2. Palma American. folijs Polygonati brevioribus, levitèr ſerratis, & nonnihil ſpinoſis, trunco craſſo Breyn. Prod. 2. Palma Americana non ſpinoſa, craſſis rigidisq, folijs caudice ſcabro in caput protuberante P. B. P. in Horto. Reg. Hampton. vidim, & collegim.

3. Periclymeno recto accedens Arbuſcula Virginiana ſiliquoſa.

4. Pimpinella Sanguiſorba rupeſtris minima, ſpinoſa radice magna. hujus folia Pimpinellæ foliolis haud majora, à Cl. D.re Turnefortio in Hiſpan. collecta fuit, & à D. Sherard amiciſſimè nobis communicata eſt.

5. Plantago Coronopus dicta, maritima, brevi, latoq, & dentato folio piloſa. Coronopus Maſſilienſis hirſutior latifolius Sch. Bot. Coronopus folijs acutis in margine dentatis Ray Hist. Pl. Plantagini affinis Bibinella, Siciliæ herbula I B. t. 3. Coronopus maritimus Prochytæ Inſulæ Col. ecphr. 258. non autem eſt Coronopus maritima noſtras, nec ei multum ſimilis ut Rerum oium Naturalium, Vir peritiſſim, & Botanices Scientiæ Summus Arbiter & Præſidium ſingulare, D. Ioh. Rajus rectè pronunciat. Cat. Exterar. quamvis Casp. Bauhin, eandem faciat. Plantago Apula bulboſa Park. Plantago Apula laciniata bulboſa Fab. Columnæ. Plantago piloſa bulboſa C. B. P. huic noſtræ perſimilis eſt & fortè eadem.

6. Polygonum Germanicum caule, folioſo, floſculis in ſummitate. an Polygonum anguſtiſs. & acuto vel gramineo folio montanum Sch. Bot. fortè Polygono anguſtiſſimo folio affinis C. B. P. ſ. Hæmorrhoidalis quæ ad Caryophylleorum ſylveſtrium claſſem referri debere Cluſius putavit. Hist. app. alterâ. ad. lib. 6. fortè etiam Polygonum Polonicum cocciferum I B. t. 3.



Tab. CIV.


f. 1. *Paſsiflora Veſicaria hederacea foliis lanuginoſis, odore tetro, filamentis florum ex albo & purpureo variegatis. Hedera Murucuiæ species Veſicaria lanuginoſa, odoris gravis* Marcgr. 73. *Flos Paſsionis Curaſsavicus, Hederæ hirsuto folio, flore purpureo variegato* P. B. P.

2. *Periclymenum herbaceum rectum Virginianum.* Dr TinKarsweed. *ibi vulgò vocatum hujus generis eſse videtur illa Periclymeni species scandens, & corticibus Arborum radices emittens, Itti-Canni* Hort. Malab. *dicta.* part. 7.

3. *Phaseolo affinis Arbor Indica Coral dicta polyphyllos, non spinosa, foliis mollibus subhirsutis.*

4. *Piperi longo similis Pistolochiæ foliis absq; pediculis Maderaspatana. Iaborandi 4.^a Pisonis huic multum convenire videtur* Hist Brasil. p. 216.

TAB. CV.



Tab. CV.

f. 1. Phaseolus unifolius Occidentalis Asari benoso folio dispermos Orobus Americanus Asari folio singulari P. B. P. in Hort. Regio. Hampton. enutritum observavimus.


2. Phaseolus unifolius Orientalis summo folio sinuato monospermos. an Phaseolus minimus perennis Americanus flore luteo Meliloti; folijs Asari lanuginosis solitarijs Breyn. Prodr. 2.

3. Phyllitis parva Saxatilis Virginiana per summitates foliorum radicosa Banist. Cat. Stirp. Virg. Herba de rpit.. hujus folium Phyllitidis ramosæ Alpini folium particulare figurâ æmulatur et huic forsan ista proximè cognata est, alterius ramificationis defectum alteri per admirabilem Propogandi modum sibi ferè peculiarem suppeditante beneficiâ Naturâ.

4. Portulaca Curassavica lanuginosa Kali folio erectior, & elatior flore rubente P. B. P. Portulaca Americ. erecta lanuginosa folijs Psyllij, florib; in caulium summo rubro obsoletis majorib; Breyn. Prodr. 2.


5. Portulaca lanuginosa procumbens Vermiculatæ folijs Americana. Portulaca Americana procumbens Sedi teretifolij folijs, & facie floribus in ramorum summo pulchrè purpurascente Br. Prodr. 2. Beldroega fortè Lusitanis s. Caaponga Brasiliana 3.a Pisonis 244.

6. Portulacæ affinis Americana, tricapsularis erecta flore albo, pediculis angustis. Portulac. Americ. & Curassavic. latifol. erect. florib; albis P. B. P. ex hujus capsulâ tripartitò divisâ semina per maturitatem impetu dissiliunt. has tres novissimè enumeratas plantas in Horto Regio. Hampton. oculis nostris summâ Voluptate lustravimus atq; collegimus.



Tab. CVI.
1. Phœnico-Scorpiuros s. Heliotropium Palmites spinosum. Polygonati anguſtifolijs Maderaspat. huic fortè pertinet Atitara Braſilienſibus Marcgr. lib. 2. p. 64.
2. Ejusd. summitas floribus ornata, quæ nodosas & incurvatos, Scorpionum caudas pulchrè repræſentat, ut in Heliotropio. favore Cl. D. Frederici Slare habuimus.
3. Ranunculus Nemorum Fragariæ folijs Virginianus. Banister. Cat. Mſs.
4. Ranunculus Nemorosus Aquilegiæ folijs, Virginian. Asphodeli radice. Ranunculus Thalictri folijs grumosâ radice Banister. Cat. Stirp. Virg. nupèr edit.
5. Ranunculo adſinis Umbelliferis accedens, Chelidonij minoris folio. Zeylanica minor. Asarina minor Zeylanica P. B. P.
6. Ranunculo adſinis Umbelliferis accedens Chelidonij minoris folio, Curaſſavica major Asarina major Curaſſavica P. B. P.
7. Pentaphyllum Alpinum minus folijs tenuioribus altius serratis, cauliculo purpuraſcente. an Pentaphyll. repens minus aureo flore Clus. Hist. Cui folia magis villosa attribuit, nostra equidem nè vix hirsuta apparent. hujus exemplar amiciſſimus Vir & apud Londinenses Pharmacopæus peritiſſimus D. Philippus Schrickenfauchs nobis conceſſit.





Tab. CXII.
f. 1. *Pyrolæ affinis Virginiana, repens, fruticosa, folijs rigidis Scabritie asperatis, flore pentapetaloide fistuloso. Pyrola repens folijs scabris, flore pentapetaloide fistuloso.* Banister.
2. *Reseda Linariæ folio Pyrenaica glauco folio* Sch. Bot. *an Reseda Linariæ folio* C. B. P. *item Reseda alba minor ejusd.* C. B. P.
3. *Rhamnus Maderaspatanus Evonymi pallentib; folijs, spinis brevibus duplicatis.*
4. *Rhoi similis Tragôodes, leptiphyllos. Americana, spinosa, rachi medio appendicibus aucto. an Coriaria Arbor spinosa Acaciæ folijs & facie* P. B. P. *inter* Addend. *fortè Quauhtecopalli Pitzahuac, Copallifera leptiphylla alia* Hernand. *p.* 49. *Fingrego, & Sabina arbor (i.e.) Savin Tree Barbadensib; nostratibus dicta.*
5. *Ricinus parvus urens, folijs Quercinis Virginianus* Banist. Cat. Stirp. Virg. *an Quercinis folijs Arbuscula spinosa lactescens Portoricenſis* P. B. P.
5. *Ricini fructu parvo, fruticosa, Curaſsavica, folio Phylli,* P. B. P.





Tab. CVIII.

f. 1. *Rhamnus Maderaspatanus Hyperici frutescentis ſolio, spinis brevibus duplicatis.*

2. *Rhamnus an potius Lycium Fingrego Jamaicensibus dictum, forte Katu-Karu-Walli H. M. spinarum autem positio huic parum congruit.*

3. *Ricinus Maderaspatanus quinquifidis durioribus ſolijs in margine spinosis, humanitate et favore D^{ris} Fred. Slare Colimus.*


4. *Rubus ſolijs eleganter diſsectis D. Edgon. in Hort. Reg. Paris. collegit D. Sherard et nobis commemiravit.*

5. *Sanicula Alpin. anguſtiſs. ſolio, flore carneo. Sedum Alpin. alterum Franciſc Gregory. Regiensis Cappucini F. 3I Columna ecphr. p. 2. Sedum Alpinum anguſtiſsimo ſolio, flore carneo C. B. P.*

6. *Sanicula Alpina anguſtiſsimis brevioribus ſoliolis per intervalla confertis. Sedum Alpin. primum Column. ecphr. p. 2. Sedum Alp. exiguis ſolijs C. B. P. an Sedum Alpinum minimum carneo flore, Sch. Bot.*

7. *Scabiosæ capitulo, Chrysanthemi Myconi ſolijs, alato caule Maderaspatensis.*

TAB. CIX.



1. Scabioſa Conyzoid. Americana capit. [illegible] floribus albidis parvis P. B. P.
2. Schetti album, [illegible] Indicum [illegible] fol. inodorum, umbellatum floribus albicantibus P. B. P. Bem-Schetti. Hort. Malab. P. 2.
3. Serratula Noveboracenſis maxima foliis [illegible] leviter serratis P. B. P. inter Addend. Serratula Virginian. min. anguſtif. mollis Breyn. Prod. 2. forte Atzoyatl Cozticyni- Roderibyo. Nov. Hisp. [illegible] pag. 423. cungener et Tlalli-yetl Nov. Hisp. ejusd. pag. 423.
4. Seſamum alterum foliis trifidis Orient. [illegible] ſemine obſcuro. an Car-Elu Hort. Mal. P. 9. Bidzjam [illegible] s. Bidzjam nigrum Malaccenſibus, Seſamum Indium folio amplo [illegible] [illegible] ſemine nigricante Comelin. Annot. in Hort. Malab.

TAB. CX.



Tab. CX.

1. *Scutellaria Teucrÿ facie purpurea minor, flore ampliſsimo. Teucrium Astragaloides Caſsida minor* Cat. H. R. P. 173.

2. *Scutellaria major, Nepetæ folÿs Virginiana. an Scutellaria aquatic. major Americ* Cat. H. Ac. Lugd. *forte Tochonxochitl. Nov. Hisp.* Ant. Recch. 431.

3. *Smilax Viticulis aspera folÿs longis, angustis, mucronatis lævib; auriculis ad basim rotundioribus.*

4. *Smilax Viticulis asperis Virginiana, folÿs angustis, lævibus nullis auriculis prædita huic radix geniculata craſsa & intorta, indè suspicamur Chinæ Mexicanæ speciem eſse, & forte Olcacatzan Hernand.* p. 212. *& Jvapecanga altera Pison. forte etiàm Radix Chinæ* Acost. Hist. Lugd. app. 10.


5. *Smilax Virginiana spinis innocuis armata, latis Canellæ folÿs radice arundinaceâ craſsâ & carnosâ. forte China spuria nodosa* C. B. P. *Pseudo-China radix ex Virginia Clusÿ. exot. China Michuacanensibus Phaco dicta, Hernand.* 213. *Pocayo Nov. Hisp.* Ant. Recch. 398. *Jvapecanga Brasiliensib;* Pison. 258. *an Kari-Vilandi* H. M. P. 7. *Pockhout Belgis Orientalib; ubibidem habetur. apud nostrates Virginiam habitantes, ex hujus Stipitib; parantur Scipiones, ut nobis affirmarit Ampliſsimus & Senatoriâ Dignitate perhonorandus Vir* D. Byrd. *Utraq; viz hæc simul & proximè præcedens Jvapecangarum species, fructum acinosum ac racematim dependentem in summis caulibus copiosè profert.*

6. *Smilax aspera Bermudensis grandiorib; folÿs cordiformibus radice surculosâ. forte Quauhmecapatli. s. Zarzæ species cujus radicem in Hispaniam transferri solebat, ut à Francisco Ximene narrat* Marcgravius. p. 12. *Quauhmecapatli altera, Zarza 4a.* Hernand. 290. *forte etiam Smilax aspera Zacynthi Alpino* I. B. t. 2.



Tab. CXI.

f. 1. *Smilax folijs latis in margine spinosis Caroliniana, Stipite leni, quadrato. hanc Generoſiſſimus Dominus Courtène nobis benigniſſimè conceſsit.*
2. *Smilax viticulis asperis Virginiana folio hederaceo leni, Zarza nobiliſſima nobis. Mecapatli. s. Zarza-parilla Fr. Hernand. 288. in Hort. instructiſſimo D. Fosteri invenimus*
3. *Smilax Caroliniana, Stipite quadrato, leni, folijs angustis. asperis, auriculis ad basim angulosis, ab illustri viro D. Gulielm. Courtène accepimus.*
4. *Solanum Americanum, Strychnodendro accedens, fructu medio (antè maturitatem) quasi fiſſo. an Solan. frutesc. Braſilian. folio Capsici, baccis rubris P. B. P.*
5. *Solan. Curaſsavic. vesicarium, Solano Antiquorum simile, folijs Origani subincanis P. B. P. fortè Solan. vesicarium Surinamense lanuginosum polycarpon Br. Prod. 2.*
6. *Solanum triphyllum flore tripetalo. atro-purpureo, in foliorum sinu, absq; pediculo Seſſili. Banist. Catal. Stirp. Virgin. Hujus autem florem nobis bilutus sex foliolis, sive. petalis constare, quorum tria subjecta tota viridia sunt, v brevia. tria verò superiora, longiora, atro-purpuraſcunt, quem: ad-modum in Solano triphyllo Canadensi Cornuto. Cui hæc est quam proximè cognata.*



Tab. CXII.

1. Senecio American. altiſſim. Blattariæ vel Hieracij folio Sch. Bolan. Senecio Americ. maxim. Dipſaci s. Virgæ Paſtoris folio P. B. P. an Senecio Cichorii folio Virginiano, flore ſulphureo odore Paſtinacæ Cat. Mſs. H. Oxon.

2. Solan. Barbadenſe racemoſum minus tinctorium Circææ folijs mollib. & incanis. forte Heliotropium Curaſſavicum Scammonij folijs mollib. ſubhirſutis P. B. P. Heliotropium Americanum majus folijs Populi nigræ lanuginoſis flore albo minimo. Breyn. Prodr. 2. Oxonium invenit D. Sherard & nobis munere donavit.

3. Spongia flaviatilis anfractuoſa perfragilis ramoſiſſima noſtras. in Iſi fluvio prope fiſtuloſa. C. B. P. dedit nobis D. Doody.

4. Spongia marina fiſtuloſa, maxima muricata. an Spongia ramoſa Gelſeminum s. Jaſminum luteum odoratum Ray Hiſt. Gelſemin. s. Jaſmin

5. Syringa Volubilis Virginiana Myrti majoris folio, alato ſemine, florib. odoratis, luteis. Virginian. ſcandens & ſemper virens Park. Theatr. Pſeudo-Apocynum Myrti-folium Virginian. Baniſt. Cat. Stirp. Virg.

6. Tithymalus Curaſſavic. Salicis & Atriplicis. folijs varijs, caulib. viridantib. P. B. P. Tithymalus Indicus Salicis & Atriplicis folijs Breyn. Prodr. 2.



Tab. CXIII.

1. *Tithymal. erectis, Caroleſolijs aliquatenus accedens* [illegible]
2. *Tithym. Indic. annuus dulcis, floribus albis, cauliculis viridantibus* P. B. P.
3. *Thymelæa Africana Linariæ folio, florib. albis in extremo caulium odoratiſsimis.* [illegible]
4. *Trifolium stellatum glabrum Ger. emac. Trifol. capitulis Dipsaci quorundam* Ray. Synops.
5. *Trifol. supinum cum glomerulis ad caulium nodos orbiculatis florib. purpurantib.* Ray. [illegible]
   J B. t. 2. *meritò autem quæratur (inquit eruditiſs. noster Rajus) cur rectum dicat, cum in Descriptione caules supinum* [illegible]
6. *Trifolium cochleatum modiolis spinosis* Ray Synops. Stirp. Britan.
7. *Valerianella Curaſsavica semine aspero viscoso* P. B. P. *in Hort. Reg. Hamptoniens. legimus.*
8. *Trifolium siliquosum Loto affine Maderaspatan. siliquis longis, ex adverso binis propendentibus.*



Tab. CXIV.
1. Verbasci congener. è Maderaspatan, mucronatis foliis, aversâ parte lanuginosis, flore parvo purpureo.
2. Veronicæ adfinis Indica tenuifolia flosculis gemellis, barbatis, summo cauliculo circumbellatis. a. vb. capsulam seminalem per Microscopium bis am
exhibet. è Maderaspatan ad Ornatiſsimum virum D. Kileard allata est, qui nobis humaniſsimè communicavit.
3. Veronica saxatilis parva caulibus nudis Raij. Obs. pag. 442. munere D. Sherard accepimus.
4. Viburnum Americanum non spinosum Meliſsæ foliis floribus coccineis P. B. P. Cumara flore rubro Marcgr. p. 5. forte etiam Camara flore luteo ex ripa Fluvii S.ti
Francisci, ejusd. an Camara luba Pisonis. Tbaiquirh s. Matzium torridum, & calidum Hernand. 115. nostri enim flores primum lutei, deinde aurantii,
tandem miniati, & ultimo tanquam coccinei sunt coloris, & in Hort. Reg. Hamptoniens. cum floribus & fructu conspeximus.
5. Viburn. Americ. odoratum folio parvo orbiculato, floribus & baccis foliolis interceptis. P. B. P. 384.
6. Vicia Lathyroides s. Lathyrus Viciaoides, vexillo rubro, labiis ab. petalis rostrum ambientibus cæruleis Moris. Hist. 2. Lathyrus s. Cicercula Meſsanensis Raij. Hist.
7. Viola Virginiana tricolor, foliis multifidis, cauliculo aphyllo. Banist. Cat. Virgin. an Viola Alpina folio in plures partes diſsecta C. B. P. Viola montana laciniato
folio Clus. Hist. Viola montana folio multifido I. B. Hist.
8. Virga aurea flore albo spicato. Breyn. Prod. 2. Virga aurea Noveboracensis, floribus albis, folio Bellidis ramosa Canadensis Cornuti P. B. P.



Tab. CXV.
f. 1. Alni ſolia Americana serrata florib, pentapetalis albis in spicam dispositis.
2. Ejusdem Spica florum, cum in majorem perfectionem devenerit.
3. Apocynum Virginianum Asclepiadis ſolio, erectum, floribus pallidè cæruleis, radice craſsâ. fortè Moyotlicaycacatli Nov. Hispan. Ant. Recch. 388
4. Chrysanthemum ex Insulis Charibeis Leucoij incanis, & sericeis ſolijs argenteis craſsis.
5. Evonymus Virginianus, Pyracanthæ ſolijs, semper virens, capsulâ verrucarium instàr asperatâ rubente.
6. Fruticulus Americanus, cordatis ſolijs pentapetaloides, radice lignosâ.
7. Nymphææ congeneri Anapodophyllon dictæ accedens polyphylla. s. Dracontij similis herba Americana pusilla.



Tab. CXVI.

1. [illegible] magnum Hispanicum Park. [illegible] C. B. [illegible] Prodr. Hierac. Pyrenaicum [illegible] hirsutum, Sch. Bot. ubi pro nondum descripto ponitur.

2. [illegible] affinis hirsuta flore [illegible] C. B. [illegible] flore [illegible] Lotus affinis hirsuta [illegible] Hist. 2.

3. Methonica Malabarorum, [illegible] Zeyl. Cat. H. Ac. Lugd. Bat. [illegible] Hort. Malab. [illegible] vulgò.

4. Thymus capitatus [illegible] foliis minimis [illegible] Thymus capitulis minoribus [illegible] H. R. P. [illegible]

5. Thymum majus longifolium [illegible] pilosum. fortè Thymbra [illegible] hirsuta [illegible] idem quod apud Collectaneas Rariorum quas Cl. Tournef. [illegible] D. Sherard è Lusitaniâ [illegible] aliquando [illegible] proximis.

6. Virga aurea Americana Tarraconis [illegible] fortè [illegible] Mexicensib. s. herba [illegible] Hernand. an Olozochitl quod Hernand. Hist. Mexic. de hujus sit genere determinare non audeo.

7. Fungus Virginianus ex Stercore Equino capillaceus, canus, capitulo [illegible] Banister. Cat. Stirp. Virg. Mſs.



Tab. CXVII.
f. 1. *Ficoides s. Meſembrianthemum Africanum fruteſcens, floribus albis parvis umbellatis. an Meſembrianthemum Afric. fruteſcens minus triangularibus folijs viridib, cornuum taurinorum in modum reflexis, fructu turbinato, parvo, pentagono, ligneſcente* Breyn. Prodr. 2.
2. *Ros ſolis Luſitanicus maximus folijs Aſphodeli minoris D^ris. Tourneforti. Chamæleontoides Griſleij. in* Epist. Dedicat. ad Viridar. Luſit. munere D. Courtene accepimus.
3. *Serpentaria repens florib; Stamineis, ſpicatis, Bryoniæ nigræ folio, ampliore pingui, Virginienſis. huc etiam pertinet Mecaxochitl; Mexicenſib; Hernandi* 44. *fortè etiam Xaxahoactli Nov. Hiſp. Recch.* 438.
4. *Ejusd. ſpica floſculorum, cum ad juſtam explicationem aſsurgant.*
5. *Tulipifera Virginiana tripartito Aceris folio, mediâ laciniâ velut abſciſsâ* Ray. Hist. *Tulipifera arbor Virginiana* Cat. H. Ac. Lugd. *Populus, aut potius Alnus Tulipifera conis erectis.* Banist. Cat. Stirp. Virginichs.
6. *Viſcum arboreum flore albo ſpecioſo Americanum folijs formâ ſiliquarum Nerij. Nerij ſiliquæ effigie,* Kaye Bakal B. Hist. *Fructus Nerij ſiliquæ figurâ* C.B.P. *per errorem.*

ALTERA

APPENDIX.

ad Rariorum Plantarum Icones Quâ

Stirpes quasdam exoticas proponere nos placuit, quarum Exemplaria ex India Orientali humaniſsimus Vir, ac Chi=rurgus peritiſsimus D. Richard, Sambach *misit amico suo* D. Iacobo Pettever *Pharmacopœo, & apud Londinates Botanico meritiſsimo: à quo demum ad delineandas æreisq; typis exprymendas accepimus: Iſtis itaq; duobis cordatis viris grates agere de his debent qui studium Botanicum colunt*



Tab. C XVIII
f. 1. *Alsine, Spergulæ facie Maderaspatens. folijs latioribus semine minutiſsimo nigro. an Tzompili Huizpatli Nov. Hisp. Recchij.*
2. *Amaranthus spicâ longô candidiſsimâ, Spicæ folijs Maderaspatana.*
3. *Antirrhino affinis, pusilla planta, folijs scabris Maderaspatana.*
4. *Cardiaca s. Leonuros Hyſsopi hirsutis folijs Maderasp. floribus dilutè rubris, unico tantùm verticillo in ramulorum Cymis.*
5. *Chrysanthemum Maderaspatanum, Menthæ arvens. folio & facie florib; bigemellis, ad foliorum alas, pediculis curtis.*
6. *Tithymalus botryoides, cordatis folijs, Indiæ Orientalis.*



Tab. CXIX.
f. 1. Gramen geniculatum, ... foliumcrispum spicâ purpuro-sericeâ Maderaspatanum.
2. Gram. dactylon Maderaspatense, cum pluribus spicarum paribus ad summum caulis, veluti in verticillos positis. folia magnâ sui parte, culmum cau vaginâ complectuntur, reliquam, surriguntbreviorem, rigidam, marginibus crispatam.
3. Gram. Cyperoid. Maderaspatanum, Juncelli Gesneri capitulis sparsis.
4. Lysimachia affinis Saturejæ folio Maderaspatens. capsulis in summitate ferè umbellatis.
5. Melampyro cognata Maderaspatana spinis horrida, an Coletta-Veetla, Hort. Malab. P. 9. Eryngium Zeylanicum. febrifugum florib. luteis Herbar. Vivi. Herm. Cingalensibus Kathu Karohiti. fortè etiam huc pertinet Bahel-Schulli Hort. Malab. p. 2. Genistæ spinosæ speciem facit, Commel. in Notis.
6. Phaseolus arborescens indianus, monospermos, siliquis, lenti-formibus, Maderaspatanus.
7. Sinapistrum Indicum diphyllon, siliquis ad alas ex uno pediculo binis. Cupa-Veela fortè Hort. Malab. P. 9.



T. CXX.
1. *Mimoſa pumila Maderasp. pinnis tenuiſſimis, ad foliorum exortus innocuis spinulis obarmata.*
2. *Polygonum Solinoides Maderaspatens. Thymi capitati folijs incanum.*
3. *Portulacæ affinis Polygonoides, Bliti folio & facie Maderaspatensis.*
4. *Rhamnus cordatis folijs subtus cæſijs Maderaspatan.*
5. *Ricinus Althææ folio mollius incano Maderaspatens.*
6. *Ricinus urens Cannabinis folijs triphyllos ē Maderaspatan. an Urtica Indica pentaphyllæa Caſsi Mich. Nutij. Catal.*
7. *Trifolium Maderaspatan. cauliculis pilosis scandens, Paſsifloræ modo trilobatum. an Com. s. Coentic Mexicensib; Hernand. 252. Apios Americana triphyllos siliquis Orobi.*
8. *Viola surrecta Maderaspatensis Lini facie, rotundioribus imis folijs.*

LEONARDI PLUKENETII

PHYTOGRAPHIA;

Seu

Plantæ quamplurimæ novæ, & literis hucusq; Incognitæ, ex varijs, & remotiſsimis Provincijs, ipsisq; Indijs allatæ, Nomine & Iconibus,

TABULIS ÆNEIS,

magna cum Industria, et insigni sanè in Succeſsores beneficio, Illustratæ.

PARS TERTIA.

VICES DEDIT ÆMULA VIRTUS.



I Collins fec:

Nihil vacat, nihil inane. Terra germinat, quod tibi putas inutile, alijs, immò tibi ipsi frequènter, alio usu est utile. D Ambros.

LONDINI MDCXCII.

SUMPTIBUS AUTHORIS.

Invictiſſimo, Potentiſſimoq;

GULIELMO iij.°

DEI GRATIA

MAGNÆ BRITANNIÆ &C. &C. &C.

MONARCHÆ semper AUGUSTO.

Leonardus Plukenetius Perpetuos Triumphos, Immortalemq; Gloriam. P.

Tuis sub auſpicijs, Auguſtiſsime Rex *proſperrimum Rerum Statum, & aurea plane Sæcula nobis pollicemur; eoq; certiùs, quo* Te *veluti fulgentiſſimo naſcente Sole, Christiani Orbis cœlum, Sacrilegæ quidem impietatis, ac innumerarum calamitatum Stygiâ caligine obtectum, undequaq; clareſcere intuemur. Excuſſo etenim quo premi cœpimus Servitutis jugo, in aſſuetis cervicibus intolerando, avitam libertatem jam reddidiſti,* Teq; *brevi, tanquam invictum* Herculem *horrenda & infesta Fidei noſtræ Oppugnatorum Monſtra, debellaturum fore haud vanè speramus, Cum Proſperitas* Tua *divinâ annuente Providentiâ, indies magis, magisq; floreſcat: Strenuis enim laboribus* Te *consecuturum conſtat, ne qua vetuſtas obruere, aut Oblivio delere* Tui Nominis *amplitudinem poſſit: haud namq; censeri licet Gloriam illam unquam intermorituram, quæ non lubricæ Fortunæ partus, sed conſtantis* Virtutis *eſt filia, ut in* Te *verè proprieq; cadat illud*

— *famam extendere factis*
Hoc Virtutis opus. —

Imperium equidem fortunam expertum eſt, virtus suprà fortunam ponitur; imò fortuna tandem etiam virtutem adoravit, et dum virtuti quod debuit, reddidit, reddidit et Imperio. Vidit Europa, Majestatem Tuam, *maximis exercitibus, non per Legatos, sed* Ipsam *summâ cum prudentiâ Imperantem, & Gloriam sudoribus suis merentem, quam alieno labore, alij sibi parant Principes; Pericula quæ Cæteri, minoribus subeunda relinquunt Ducibus, Ipsemet* Strenuiſsime Rex, *subire non dubitaſti, nec sub alienâ latens forti=tudine, metum celâſti, ac ignaviam, sed contra,* Tuorum *(si quis in tanti Imperatoris militibus eſſe potuiſſet) timorem, invicto animi robore expuliſſes* Tuis *validiſſimis armis, Gentes bellicoſiſſimas, celerrimè magnis atq; cruentis cladibus affectas, & nunquam hostem, æquè ferro, ac prudentiâ non superatum, advertimus, quasi nulla Terrarum pars, Trophæis Anglorum vacare conspecta sit; Tanti refert, à subjectis populis, belli, gloriæq; ſtudio flagrantem Regem, præ oculis habitum perpetuò fuiſſe.* Tu *ſiquidem Parentum* Tuorum, *Avorum, Atavorum gloriam, quantumvis splendidam, ac Imperatoriâ Dignitate ornatam, longo superans intervallo, tot inter* Tuæ *Illuſtriſſimæ Familiæ sidera, clariſſimum veluti solis lumen, eminere diſpiceris, Heroum hæres præclariſſimus, imò Heros ipse omnium Maximus;* Tuæ *Hollandicæ, ut et Britannicæ noſtræ, totiusq; Europæ sublevandæ, novus Atlas, cœlitùs datus, & feliciter designatus.*

Par eſt O Rex, & silentij hic ubi rerum magnitudo dicendi parvitatem, infinitis partibus excedit, meminiſſe, & simùl in præſentia, solùm commemorare Clementiam, *Hæc enim Maximos quoq; etiam Principes, maximè decet, utpote quâ illi maximè ad Divinæ Naturæ similitudinem, ipso quoq; Romanæ eloquentiæ Principe judice, accedant. Hæc verò virtus eximia, à* Tuæ *Celsitudinis sole, lumen ducens, inter reliquas virtutes* Tuas, *splendidiſſimè lucet.*

— *Velut inter ignes*
Luna minores. —

Solem dico eum, quo præfulges, præcellentium omnium Virtutum concurſum, unde Tibi *longè meliùs, quam Catoni Romano, ea laus ad=juncta eſt, singulas singulorum hominum virtutes, in* Te *unum exornandum conspiraſſe. Innata* Tibi *eſt hæc regia Clementiæ virtus,* Teq; *cœlo aſſerens, ut alterum Titum, amorem, & delicias generis humani per orbem celebrat. hâc arte* Auguſtum *imitatus, non tantùm* Tuorum, *mutatâ licet feliciter ex usu Reipublicæ, Imperij formâ, sed et Vicinorum, cunctorumq; Exterorum benevolentiam, & ſtudium,* Tibi *conciliaſti, omniumq; linguas, & ſtilos, Terrâ Mariq; feciſti* Tibi *vectigales. Deniq;* in Te, Regum Optime, *Prudentiam, Fortitudinem, Clementiam, ac reliquas omnes dotes, quibus tum ad bellum fortiter gerendum, tum ad fructus Victoriæ uti decet colligendos, opus eſt. & nos miramur, & ultima mirabitur poſteritas: Hæc sunt enim verè, quæ Principem evehunt, quæ conspicuum, & clarum reddunt, quæ Regnis aptum & Imperijs. Quæ, quamvis magna, præclaraq; sint, non in his tamen sunt oĩa, cùm adhùc de* Te, *plura, atq; majora suppetant, quandoquidem* Tibi, *haud indecorum putâſti, ad immortalem bellicæ* Tuæ *virtutis gloriam, id quoq; laudis, quasi pro coronide pacatæ indolis accedere, nimirum inter armorum sonitus, tubarumq; clangores, æquè literas, ac arma tractantibus, multa, & non vulgaria Studia, quam libentiſſimè præſtitiſſe.*

[illegible] quam maximâ submiſſione. Te *supplex rogo, ut ad Regium Solium* Amplitudinis Tuæ, *me provolutum admittere, ne dedigneris, ut hoc, quidquid eſt Operis, quod à noſtrâ tenuitate, profectum eſt, serenâ fronte excipias, & clementer ign[illegible]. R[illegible] eſt quidem minim[illegible]*

& Majeſtati Tuæ, *forte indigna. Ast etiam olim rebus minimis, rus incolentes, Offensas Deorum placaſſe, notum satis. Argumentum tamen Operis,* Tibi *minime indecens, non quidem Reipublicæ, sed singulorum, qui partes ejus sunt, salutem spectans; de Herbarum, Stirpium, ac Plantarum cognitione agitur; Quarum adeo multiplex sit varietas, & ferè inexplicabilis, tot odores, sapores, colores, quibus sensibus nostris blandiantur; tot figurarum elegantiæ quibus intuentes oblectent, ut Natura ipsa nos invitare videatur, ad eas contemplendas; Quod, Opusculo hoc Botanico, locupletiſſimis Stirpium exoticarum Iconibus instructo, facillime faciamus. Præstantiſſimum, atq; adeo* Te *dignum est argumentum,* Rex Sapientiſſime: *Stirpium enim Contemplationi deditos, ob ingentem voluptatem, pariter & insignem quam secum trahit utilitatem, olim fuiſſe Reges, & Principes, hodieq; eſſe extrâ dubium est, ut veterum æque celebratum monumentis, ac quotidiana, nullâ succedentium sæculorum interruptione temerata, patet Historia. Illud autem primò me adduxit, ut Hujus tertiam, maximam, et extremam Phytographiæ Partem, de quâ, quod Sapiens olim in genere,* Rei finem meliorem eſſe Principio ejus *dicere ausim, omni cum debitâ submiſſione,* Splendidiſſimo Nomini Tuo *dedicarem, quòd in Ipsâ exhibetur Materia, cujus studio, complures olim Imperatores, ac Reges sunt magnoperè delectati. Legimus, Regem omnium quotquot fuêre Sapientiſſimum,* Salamonem, *de Stirpibus scripsiſſe; Testantur* Iubæ *Mauritaniæ,* Attali *Pergamenorum,* Mithridatis *Ponti,* Evacis *Arabiæ Regum, de eâdem Re Commentarij; ut mittam* Agamemnona, Maſiniſſam, Archelaum, Herculem, *aliosq; plurimos Viros, Majestate insignes; Rei herbariæ peritiſſimos. Ideoq; eò libentiùs id faciendum mihi proposui, quò certior sum,* Majeſtatem Tuam, *quoties à gravioribus Regnorum* Tuorum *Curis vacat, ex Plantarum lustratione, plurimum capere voluptatis: Hortorum amœnitates adeò* Serenitati Tuæ *eſſe solet in delicijs, ut ausim dicere, Artem Botanicam, suo quodam jure, singulariter ad* Sereniſſimum Regem *pertinere; Argumento sunt,* Tuæ *Aulæ sumptuosiſſimæ apud Hamptonienses Viridaria, verè Regia, ad prodigium usq; insignia, & voluptatis, amœnitatisq; gratiâ parata. in Quibus* Temet *si receperis, nec credideris, Illa, vel Indiâ felicitate superari; Ijs enim instruendis Stirpibus novis & exoticis, huc, non dico ex Galliâ, aut Hispaniâ, sed è Græciâ, Syriâ, Arabiâ, Persiâ, Ægypto, Barbariâ, imò Ultimis tam Orientis, quam Occidentis Populis, Indiâ, & Americâ, diversi generis Herbæ quotidiè advehuntur, magno quidem sumptu, at majore cum gloriâ, Aulæ, & Urbis* Tuæ, *imò Orbis Universi salute.*

Et hæc quidem, exemplo Romanorum Principum, haud minus sibi gratulantium, ob raras peregrinis ex oris advectas Plantas, quam ob catenatam diversorum Regum ante Currus Triumphales seriem, Antiquorum etiam Regum ac Magnatum Coronæ, ac Diademata, ex Arboribus fuêre contexta, quibus se magis quam auro, quam gemmis, vel aliâ quâcunq; re pretiosiori, honoratos existimarunt. Triumphantium quoq; decus, Victoriarum gestamen, & in Sacris, ac Publicis Certaminibus, præmium, uti his Victores insignirentur, quod non Græciæ tantum, sed et cujusq; alterius Regionis Illustres, ac Reges ipsi non detrectarunt; Gratum proindè atq; jucundum, Tibi *futurum spero hoc nostrum opusculum, quod totum Coronarium est, eo quòd Stirpes quamplurimas, novas, & indictas, eximiæ pulchritudinis, & elegantiæ, in Illo comprehensas, ex omni ferè Terrarum Sinu, decerpsiſſe curavimus, ubi* Tibi semper *concors Virtus,* Tuos *præcinit Triumphos, Coronam Triumphalem, ex Floribus undiq; rariſſimis, Imperatore Triumphanti haud indignam nectamus:*

Has ob causas Potentiſſime Rex, *Augusto Nomini* Tuo, *hæc depicta Botanices Pars offertur;* Quo *cum exordiens, per totum versabitur Orbem,* & Majeſtatem Tuam *inter Reges, et Principes cuicunq; Reipublicæ Mecœnates, numerari valebit:* Deus Opt. Max. Auguſtiſſime Rex. Majeſtatem Tuam, *cum exoptatiſſima* Tuâ *conjuge* Mariâ 2.[a] Sereniſſimâ *nostrâ* Reginâ, *bonis artibus, præcipuè Botanicis, Nobis, Patriæ, totiq; Orbi Christiano, diu servet incolumem, præclaraq; opera fœlicibus jam incaptâ auspicijs, benè fortunet,* Tuiq; Nominis *memoriam, gestarum, gerendarumq; rerum magnitudine, Sacram eſſe dignetur* ÆTERNITATI, *id aveo, id comprecor.*

Sacratiſſimæ R.M.V. *humillimus, et*
Obsequentiſſimus subditus, & Servus.

Leonardus Plukenetius.


AD. STUDIOSOS. BOTANICOS.

Haud *equidem paucas hâc vice* Vobis *exhibemus* Tabellas *(benigni lectores) quæ* γνῶσιν βοτανικὴν *Titulis* & Iconibus. *novâ supellectile, plenioribusq; Thesauris ditârunt. Hoc enim Studium, ut ab ineunte juventâ mihi cordi fuit, itâ ad hunc usq; diem, proût Thema perjucundum nobis insenescit. quod quidem* τῆς ὑγείας ἕνεκα *planè divinum est: Itâ enim Veteres tam Hebræi, quàm Ethnici existimârunt; Isti, qui ut* Deum tèr Opt. Max. πάντων ἐάων δωτῆρα *meritò Statuunt, itâ etiam eidem Salutarem hancce Scientiam acceptam ferunt; Hi, qui Stirpium herbarumq; cognitionem ad ipsos* Deos *retulêrunt, vel istarum Inventores, divinis honoribus dignos censuerunt, imò ipsis herbis quarum Deos Inventores opinati sunt, mutuata ab ipsis nomina indiderunt. Elucet enim in his omnibus Creatoris Majestas, Non Thus neq; aliam victimam Antiqui, sed folia velùt primam pubescentis Naturæ lanuginem, manibus decerptam Dijs adurebant, quo signo, Deum Creatorem testabantur, à quo Herbæ, & quæcunq; in Terrâ ortæ sunt. Nec Stirpis ullius cognitionem, aùt nomen contemnendum puto, dùm in his tam parvis, quanta vis? quàm inextricabilis perfectio? mirabilis enim in minimis est Natura, & dives Hanc itaq; nostram Phytographiæ tertiam Partem Octingentas circitèr reales, hùc usq; incognitas, & non omninò (aùt alibi satis infeliciter) depictas, vel annotatas Plantas continentem, ab amicis nostris* Botano=philis *totiès expetitam, excipite, suscipite inquàm benigno & Sereno vultu, quoniam & varietate, & Novitate* Vos *delectare mihi in animo fuit. Servantur autem nobiscum adhùc plura, quæ si hæc placebunt,* Vobis *communicare etiam brevi censemus. Nec id ægrè ferendum spero, quòd in Novis, & inauditis Plantis, voces aliquandò inusitatas Usurpare cogimur: quòd eò lubentiùs à me factum intelligatis, quoniam admonente* Tullio, *Aut Rerum novarum, nova facienda, aut ex alijs transferenda Nomina; Inquirendum potiùs nàm legitima videatur Vocum sumptio; Notæ autem ipsæ, seu singulares animadversiones in Plantas, earum Tesseræ, et Symbola genuina eis à Naturâ data, Conjugij ipsius Nominis, & Plantæ præcipua erunt Instrumenta, eòq; potiora quò magis peculiaribus, & magis evidentibus signis, Collecta sunt. Neq; enim præcipui Naturæ Characteres obliterari facilè æquè possunt, ac nostri, & juxtà arbitrium vulgares inditorum Nominum, qui facillimè ponuntur, reponuntur, innovantur, alteruntur, dùm isti, Rebus ipsis inhærentes, eternùm duraturi manent. Harum igitur nostræ Appellationes si quibusdam minùs arrideant, permittant quæso tales à* Pluquenetio *Usurpare tantispèr, donec magis apta Nomina invenerint. Omnes deniq; hujus* Facultatis *cultores, & asseclas officiosissimè rogamus, ut ubi in his planè Novis, & Incognitis, quarum partes magis essentiales, hucùsq; nos latent, Nomina adscribendis, & ad proprias Classes relegandis; Nos lapsos animadverterint, amicè & candidè moneant. moniti, Ipsis gratias agemus, errores nostros libentissimè agnoscemus, & emendabimus; imò si quid erroris non moniti, in dictis nostris animadverterimus, ultrò fatebimur; imitaturi* Divinum nostrum Senem. *qui (ut Celsi verbis utar) à Suturis se deceptum esse memoriæ prodidit, more scilicèt Magnorum Virorum, & fiduciam Magnarum Rerum habentium, nàm levia ingenia, quià nihil habent, nihil sibi detrahunt, Magno Ingenio, multaq; nihilo minùs habituro, Convenit etiam Simplex veri erroris Confessio, præcipuèq; in eo ministerio, quod Utilitatis causâ Posteris traditur; ne qui decipiantur eâdem ratione, quâ quis antè deceptus est.*

Valete

Atq; hilari vultu frondenti tempora ramo
Cingite

ex Ædib. nostr. ad Palatium antiquum apud Westmonast.
Anno à nato Mundi Salvatore
MDCXCII.



TAB. CXXI. *fig. 1. Abies minor pectinatis foliis* Virginana, *conis parvis, subrotundis. an Avevett & Ahoehoetl. s. Tympanum aqueum, Abies Mexicana minor* Hernand. *Hist. pag. 92.*

2. *Abrotanum elatius subincanum, foliis creberrimis secundum caulem in metæ formam fastigiatis. an Abrotan. mas. trifido Viridi folio,* Lusitanicum. Parad. Batav. Prodr. 303.

3. *Acacia* Maderaspatana *Spinosa ramosior, cortice cinereo, ramulis plerumque ex uno pediculo binis, aculeis brevioribus craſſis.*

4. *Acacia* Maderaspatana *foliolis parvis, aculeis e regione binis prægrandibus horrida, cortice cinereo.*

5. *Acacia* Maderaspatana *minutiſſimis foliis, aculeis ferocibus alternis frondosa, cortice itidem, cinereo.*

6. *Acacia tenuifolia* Maderaspatã. *spinis brevibus, recurvis, albicantibus Cortice fusco. Hujus pinnulæ nimis latæ, & obtusæ pinguntur, cætera Studioſiſſime Cælata. eleganter ejus ramulum in medio Tab. illæ seorsim pictum vides. an Mimosa arborea Javanens. spinos. tenuiſſ. pinnis. &c. Breyn. Pr. 2.*



TAB. CXXII f. 1. *Acacia Americana grandibus aculeis ad ramulorum exortum cornua bovina referentibus, ſiliquâ roſtratâ.*
Acacia Americana cornigera, ſiliquis in ſpinam abeuntibus. **Parad. Bat. Prodr.** 303. *Hoitmomaxalli. S. Arbor Cornigera* **Hernand.** *p. 86. Quer... Luſitanis. in Horto Regio Hamptonienſi collegimus.*

2. *Acacia* **Maderaſpatana** *ſpinoſa pinnis veluti tumulatis acutioribus Myrti æmulis, nervo pinnularum ad unum latus vergente, ſiliquâ latâ. an Intsia Malabarorum H. Mal. Part. 6. Pag. 7?*

3. *Acacia* **Zeylanica** *minùs ſpinoſa, pinnularum coſtis, & caule, ruſeſcente hirſutie, Villoſa, in Hort. Regio noſtra Hampton. anno retroacto, hujus ramulum collegimus.*

4. *Acacia forte cognatus e Maderaſpatan Frutex Vitis Idææ Bengalenſis, folijs, & ramulis alternis ad foliorum ... Spinis, exiguis aſperatus. Hanc, & antepenultimam, cum elegantiſſimis Acaciarum ſpeciebus, præce... Tabula enumeratis, necnon quamplurimis alys Stirpibus novis, & exoticis quas nitide exſicc... & inter chartas repoſitas, a Fratre ſuo ...ariſſimo ex* **Orientali** *India ſibi advectas hab... Ornatiſſimus & perhumanus Vir D. Carolus du* **Bois Londinenſis** *Mercator celeberrimus ... Cultor eximius, nobis ad exſculpendum benigne conceſſit.*



Tab.CXXIII.

fig.1 *Acacia Africana, spinis candicantibus horrida, subrotundis folijs, odoratiſſima.*

2. *Acacia Africana, Abruæ folijs, aculeata, spinis longiſſimis horrida. fortè Acacia Americana spinoſiſſ. floribus luteis, globosis, fructu tenui, toroso, dulci,* Breyn. Prodr. 2.

3. *Acacia Javanica non spinosa, folijs maximis, splendentibus.* H. Beaum. *Cadarvang - Indigenis dicta.*

4. *Acer maximum folijs trifidis, & quinquifidis, Virginianum. Negundo perperam dicta arbor. Virginiana* Hort. Beaum. P...

5. *Ejusd. Arboris folium quinquifidum, cum seminibus alatis maturitatem adeptis.*

6. *Adianthum Africanum, Rutæ murariæ æmulum, segmentis longioribus acutis, ab amiciſſimo Viro D. Patricio Adair. nobis comm...*

TAB. CXXIV



Fig. 1. *Adianthum fruticos.* Bermudenſe, *ſummis ramulis erectis, et in metæ formam faſtigiatis. a Peritiſsimo Botanico,* D. Iacobo Petever *habuimus.*

2. *Adianthum fruticos.* American, *ſummis ramulis reflexis et in Orbem expanſis. Adianth.* Amer. Cornuti *de* Pl: Canad. *Adianth. fruticos.* Braſilian. C B Prodr. 150. *varijs in Hortis circà* Londinum.

3. *Adianth. Calomelanos* American. *S. Ad. nigr. fol. prona parte candidiſsimis. an Adianth. nigr.* Americ. *pulvere candidiſs. aſperſum* Breyn. Cent. *fortè! Conambai-Miri S. Ad.* Braſiliani *Species* 2ª Piſon. *p.* 234. *ex Inſulis* Iamaicenſ. *et* Barbadenſ. *nobis advecta.*

4. *Ad.* Narbonenſe *folijs longioribus, et acutioribus, pulverulentis, pediculo nigro.* Sch. Bot. Pariſ. *munere* D. Sherard *accepimus.*

5. *Ad. maritim. Segmentis anguſtioribus* Charibæarum. *hujus exemplar, nobis Vir humaniſsimus* D. Georgius London *primò conceſsit.*

TAB. CXXV



1. *Adianth. S. Trichomanes* Bermudenſe *maxim. ſerratis folijs auriculatum. ex dono* D. Petever *accepimus*.
2. *Ad.* Barbadenſe *auriculatum, ramoſum, ſegmentis craſsioribus, minutiſsimè denticulatum.*
3. *Alcea pentacoccos, Ranunculi auricomi folio, et facie* Maderas patenſis. *hujus ramulo superiùs laudatus Vir,* D. du Bois, *munere nos ditavit.*
4. *Alsine Veronicæ affinis, Triſsaginis folio, et facie,* Maderas patana.
5. *Alsine Indica polyanthos tenuifolia è* Maderas patan. *hanc, ut et proximè præcedentem, à spectatiſsimo viro et celeberrimo Botanico,* D. Carolo du Bois *accepi*.



b. CXXVI.
1. *Alaternus* Hysicanensis: s. *Africana, Lauri serratæ odoratæ Stapelianæ folijs* Cat. Hort. Beaumontian. *pag.* 3.
2. *Alatern; Arbuti folijs lucidis,* Promontorÿ Bonæ *Spei*.
3. *Alatern; sempervirens Africana, folijs lucidis spinosa. è dicterijs* Cl. D. Herman.
Alcea fruticosa Pentaphylloides æmula, floribus amœniſsimè rubellis, calyce producto, è Maderaspatàn.
Alceæ affinis Indica Abutilon dicta, flore flavo, folijs mollibus profundè venosis, siliculis lanuginosis. an Althæa Abutilon dicta Indica, flore luteo minori, Hort. Lugd. *Ano da* Zeylanensium.



Tab. CXXVII.

Fig. 1. Alcea moschata villoſiſsima folijs in profundiores lacinias inciſis, ab honesto viro Iacobo Reede. ex Inſula Barbados allata est.


2. Alcea Maderaspatana, hastatis, folijs glabris, pericarpio tantum villosa. e Collectaneis du Boisianis habuimus.

3. Alcea cibaria. s. Corchorus Americana Carpini folijs, sex tuplici capsulâ longiore ornatâ. an Corchorus Americanus minor, Carpini folio, siliquâ anguſtiſs. ex lateribus ramulorum proveniente. Breyn. Prodr. 2. 36.

4. Alcea oli[illegible]ia. s. Corchorus Americana, angusto, barbato folio, capsulâ strictiori.



Tab. cxxviii.
fig. 1. *Alni facie Americana folijs non ſerratis. fortè Alni folio & facie Curaſſavica* P. B. P. 305.
2. *Alno affinis Americ. Liguſtri folio, fructu ſpicato, rubro.* Breyn. Prodr. 2. *Manghala arbor Curaſſavica folijs Salignis* P. B. P. *Frutex innominatus instàr Salicis pumilæ folijs Salignis* Marcgr. p. 70. *Utramq; primùm in Comptoniano; deindè in Horto Regio Hamptoniens. obſervavimus.*
3. *Alsine* Maderaspatana *Gallij folijs, floſculis communi pediculo ternis. ab Alsine procumbente Gallij facie* Africana Cl. Hermanni. *plurimùm differt.*
4. *Alsine Caryophylloides* Africana, *radice magnâ Astragalite. ex* Codice Comptoniano.



Tab. CXXIX

fig. 1 Aloe Africana *vulgari ſimilis floribus rubris, & paucioribus, è dicterijs* Cl. D. Herman.

2 Aloe Africana *folijs erectis, ſuperficie ſpinoſis*.

3 Aloe caulescens folijs reflexis, margine ſpinoſis Africana.

4. Aloe ſpinoſa, arboreſcens, ramoſa, Promontorij Bonæ Spei. *Harum omnium picturas, curioſiſsimè delineatas, & ipſo* Promontorio *vivis coloribus illuſtratas, Nobiliſsimi atq; Reverendiſs. [illegible]ámodùm* Henrici Episcopi Londinensis *gratiâ, ad exsculpendū impetr[illegible].*



Tab. CXXX.
fig. 1. Alsine Indica Glaucis maritimæ folio, floſculis ex alis longo pedunculo innixis. ab Alsines fluviatilis Tabernæmontani *folijs, haud multùm abludit.*
2. *Alsine veronicæ affinis, Gratiolæ folijs* Maderaspatana.
3. *Alsineholostea glabra, s. Gramen Leucanthemum Ind. Orient. Anagallidis aquatic. quartæ* Lob. *folijs anguſtioribus.*
4. *Alsineholostea glabra, sivè Gram. Leucanth. Indicæ Orientalis folio brevi.*
5. *Alsine Indica quadrifolia & quinquefolia floſculis longiori pediculo insidentibus.*
6. *Alsine holostea villosa folijs caulem ambientibus multiflora è* Maderaspatan. *Omnes has novas Alsinarum species à nunquam satis laudato viro* D. Carolo du Bois *sæpius in his nostris Exoticorum tabellis nominando accipiebam.*
Huic ulterius Schangam pullu H.M. *P. 10. propiùs accedere videtur.*

TAB. CXXXI.



Tab. CXXXI.

fig. 1. *Althæa arboreſcens Americana ampliſſimis Verbaſci folijs craſſis & incanis, an Althæa Americana fl. luteo spicato lanuginoſa major ex Inſulâ Curacao* Breyn Prodr. 2.

2. *Althæa* Maderaſpatana *ſubrotundo folio molli, & hirſuto, multipilis ſivē ſeminibus ad apicem crinitis nobis communiavit Spectatiſſ. Vir D. Carolus du Bois.*

3. *Althæa Braſiliana fruteſcens incarnato flore Fagopyri ſemine* P B P. *Alth. Braſilian* Piſonis.

4. *Althæa Americana incana fruteſcens flore coccineo* Paradis Batav. Prodr. *in Horto Aulæ Regis noſtri loci celeberrimi Hamptonienſi, cum proxime præcedenti ſæpius Obſervavimus.*



Tab. CXXXIII.

Fig. 1. *Amaranthioides humile* Maderasp. *capitulis candicantibus, folio molli.*

2. *Amaranthioid. Indicum, globosum, ad caulium nodos floridum, folijs Solitarijs, summo apice barbatis.*

3. *Amaranthioid. Indicum, verticillatum, Parietariæ hirsutis folijs, spinosum.*

4. *Anchusa angustifolia verticillis longis, aculeis armata, è* Maderaspatàn. *Hæ quatuor postremæ, ex Plantis siccis liberalitate humaniſs. Viri D. Caroli du Bois, nobis Communicatæ.*

5. *Anagyris Africana, angustis siliquis, flore cæruleo.*

6. *Anagyris flore luteo, angustis siliquis, Africana; è Curioſiſsimo Codice Comptoniano Reverendiſs. Dom. Henrici Londinenſis Episcopi favore, in nostras Tabellas transtulimus.*



Tab. CXXXIV. Fig: 3.

fig. 1 *Angelica montana max. floſculis candicantib; ad caulium nodos umbellifera, fortè Archangelica* I B. Dod. Clus. *an Liguſticum quorundam folijs Angelicæ ejusd* I B. Schol. Botan. *Angelica Alpina ad ſingulos nodos florida* Flor. Batav. *huc etiam referendam puto Angelicam Sileſiacam max. s. Archangelicam* Shwenckfeldy. Cat. Pl. Siles.

2. *Anona Indica latifol. fructu ſquamato aſpero ſeminibus ex flavo nigricantibus turgida, Araticu = ape Braſilienſium* Piſonis. *Anona American. sylveſtr. folijs & fructu maximis* P B P. *fortè etiam Fructus* 1. Garth. s. *Aratacou* Clus. exot. Soortsack. Belgarum. *Noſtratibus colonis* Sowersop *nuncupata fortè Guana=bana* Nierembergÿ. p. 331.

3. *Anona Indica fructu ex viridi & luteo cortice ſquamato aſpero nucleis nigricantibus parvis. Pyro ſimilis fructus alter in novâ Hiſpaniâ* C B P. *Guanabanus* Oviedi. *fructu ſquamato* I B. *Anona Curaſſavica fructu dulci* P B P. Honig. appel. Belgarum. *Sappa quibusd.* Sugar apple & Sweetsop *Noſtratibus bulgò*.

4. *Anona Indic. anguſtif. fructu cærul. cortice ſquamato glabro. Anona maram* Hort. Malab. *Ahate de Panucho vel Ate Pannicenſis* Terentÿ Not. in Rec. [illegible] Hiſpanis *Mangier blanco Custard-apple Noſtratib; dicta* Sup[illegible] *purpur. Sinarum* Mich. Boym Flor. Sinens.



Tab. CXXXV.


fig. 1. *Anon. Americ. juxta Fluviorum ripas innaſcens pyriformi fructu Sardinas muriâ conditas olente, ſemine ampliori pallido: fortè Anona Americ. folio ſplendente ex Verâ Cruce* PBP. *Noſtratib; Anchovie* & *River Pear vocata; fortè Araticu pana Piſon. item Pyro ſimilis fructus in Novâ Hiſpan. nucleo magno* CBP.

2. *Anona Indica fructu conoide viridisquamis veluti aculeato. Atamaram* Hort. Malab. *Araticu ponhe* Marcgr. & Piſon. *fortè etiam Yata Sinenſib;* Boymy Fl. Sin. *Noſtratib; Colonis the Prickley apple vulgò nuncupatur.*

3. *Anona (fortè) Ind. Orient. fol. obl. ex adverſo binis plurimis conſpicuis venis in parallelos ſecundùm latitudinem venuſtè diſcurrentibus. ejusd Arboris folium (ut nobis exiſtimamus) ex America delatum adpingi nos curavimus: fortè Mangaiba Braſilienſium* Piſon. & *ſatis propriè nominari poſsit, Anona utriusq; Indiæ lævis, fructu Ovali aureo, parte Soli obverſâ rubris punctis inſignito.*

4. *Anonis non ſpinoſa Cretica flore purpureo Hort. Patav.*

5. *Anonis lutea mitis ox ytriphylla, ad florum pediculos capreolata, foliis læviſsimè ſerratis ex Horto Patavino.*



Tab. CXXXVI.

Fig. 1. Antholithos Convolvulaceus American, Barbadenſibus Colonis Wilde Slip-bloſsome nuncupatur. fortè Convolvuli Species Americana florib; è Calyce cito deciduis.

2. Anonymos Linariæ folio Orientalis, Gallij luteiflore, Herba capſularis verticillata. à D. du Bois habui.

3. Anonymos baccifera verticillata folio molli & incano ex Americâ. hujus baccæ ſunt latè rubentes & quaſi murice tinctæ.

4. Anonymos Americ. folijs Parietariæ ſcabris, floribus albis ad foliorum ortum vix conſpicuis. Fænugræci flore Parietariæ folio Planta Americana P. B. P. àn Kali genus Americanum.




Tab. CXXXVII.
fig. 1. *Antirrhinum Saxatile ſol. Serpylli* C B P. *quod in* Prodromo *deſcribitur*.
2. *Apocynum ſcandens Scammoneæ Monſpeliacæ ſolÿs Curaſſavicum ex* Hort. Reg. Hamploniens.
3. *Apocyn. incanum Scandens* Maderaſpatanum *Violæ martiæ ſolÿs, floribus purpureis*.
4. *Apocyn. ſcandens Americ. Convolvuli minoris folio caule hirsuto. Apocyn. Americ. Nummulariæ ſolÿs quibusdam*.
5. *Apoc. Portoricenſe fruticeſc. ſol. craſsis. hastæ cuſpidi ſimilibus* Hort. Beaumont. *Tithymalus Portoricens. ſol. craſs. hastæ cuſpidi ſimili* P B P. *in* H R H. *collegimus*.
6. *Apoc. tuberos. anguſtif. erectum flore ex luteo virescente folliculis pubescentibus Africanum* ē Cod. Comptoniano.
7. *Apioscorodon s. Arbor Americana triphylla Alliÿ odore poma ferens. Arbor Americ. trifoliata pomifera seminibus reniformibus* Hort. Beaumont.
Therebinthus Dercœrucis latiſsimo folio, Arach vulgò PBP. *Arach Synmaron (i.e) Aurantium ſylveſtre Indigenis audit. an Nyro ala* H H. *part. 3. & Tapia* Macegr.


TAB.CXXXVIII.



Tab. CXXXVIII.
fig. 1. *Aphyllon aquatic. Virginienſe petræum* D. Baniſter.
2. *Apocyn. rectum elatius, Salicis anguſto fol. immaculatis floſculis in umbellam, folliculis piloſis. an Apoc. Hyſicanenſe erect. Salicis folÿs anguſtiorib;* Hort. Beaumont.
3. *Apocyn. erect. Salicis latiori folio Umbellatum, florib; aurantÿs. an Apoc. Hyſicanens. erect. Salicis folÿs latiorib;* Hort. Beaum. *Apoc. Curaſſavic. fibroſâ radice florib; Aurantÿs, Chamæneriÿ folÿs latiorib;* P.B.P. *Hujus, ut et præcedentis ramulū floribus ornatum* Cl. Vir. et olim *Condiſcipulus noſter* D. Uvedal. LL.D. *ex ejus Horto oīum ſtirpium exoticarum varietate, & copiâ inſtructiſſimo collectum, nobis amiciſſime communicavit.*
4. *Apocyni ſcandens radice tuberoſâ Promontoriÿ Bon. Spei. è Cod. Comptoniano.*



Tab. Cxxxix.
fig.1. Apocyn. Afric. tuberoſum latiore folio erectum folliculis hirſutis flore pallidè punicante. è Codice Comptonian:
2. Apocyn. Curaſsavic. triphyllum ſloſculis albis PBP. in Hort. Reg. Hampton.
3. Arbor Virginiana Piſaminis folio baccata Benzoinum redolens. fortè Balſamum ex Peru IB. tom. 1. an Benjoinum cujus Arbor folio Citri ejusd. IB Benzoinifera, aut Arbor Benevifera Garciæ. Horti Comptoniani est singulare Ornamentum.
4. Ejusd. ramulus sub Verni temporis exortum ſloſculis hexapetalis muscoſis ex luteo viresċentib; plurimis ſimul ad foliorum ortū onustus; quos succedu. baccæ mo nopyrenes
5. Arbuscula Indica ſiliquoſa Coryli folijs parvis, ſerratis, ſummâ parte ſinuatis. an Uxana P. Amman. Charact. Pl. Karin Tagera HM. part. 6.
6. Arbor Americ. baccifera Myrtifolia viminalibus virgis, s. Flagellifera major. Barbadensibus Rodwood dicta.
7. Eadem longius mucronatis, s. cuspidatis & punctatis folijs, s. Flagellifera minor.



Tab. CXL.

fig. 1 Arbor Bisnagarica Myrti amplioribus fol. per ſiccitatem nigris Cubebæ ſapore. an Myrtedanum Hippocratis; fortè Comacum Antiquorum. Cumuc Iavanenſibus modernis, quo nomine & Cubebæ ab ijs inſigniuntur.

2. Arbor Orientalis baccifera Laurifolijs craſſis & venoſis, p ſiccitatem atro nitentibus quaſi Vernice tinctis polypyrene. an Perin Paniel Hort. Malab. P. 5

3. Arbor Americ. pinnatis Fraxini folijs fructu reniformi Phaſeolum exprimente Spaniſh Aſhe (i e) Ornus Hiſpanica Barbadenſibus noſtratibus dicta; eſt Balſamifera fortè, an Hoitziloxitl Mexicenſibus Hernand. p. 51.

4. Arbor Americana baccata, cujus baccæ Crapulariæ (i e) Tipple Berrys Barbadenſib; audiunt; eò (fortè) quòd in potu aliquandiu infuſæ crapulam inducunt.

TAB. CXLI.



Tab. CXLI.

fig. 1. Arbuscula viscosa Elæagnifoliis latè virentibus Americana tricoccos; aliàs Ricini fructu Arbuscula Bermudens. foliis longioribus viscosis Nostratibus Colonis Broom nuncupata; an Saponaria tricocca minor Americana.

2. Arbor siliquifera Faginis fol. Americ. fl. comosis. an Arbor Sinus S.ti Augustini Fagi species quæ fructum Fabis similem fert. Ionst. Dendrolog. p. 209 fortè etiam Frutex innominatus ligno saligno, foliis ad Myrti folia accedentib.; sed longè majoribus Marcgr. p. 82. Spanish Oake (i.e.) Quercus Hispanica Barbadensibus dicta.

3. Arbor Americ. Lentiscifoliis fervida. an Holoquo-huitl, s. Arbor Chilli Mexicensium, Hernand. p. 50 Fustick wood Nevisensibus perperàm dicta.

4. Arbuscula Arbuti alatis foliis Africana, fortè Iambolciris Park. p. 1636. hujus exemplar apud Promontorium Bon. Sp. collectum singulari amicitiâ nobis communicavit Ornatiss. nec non Clariss. Vir D. Patricius Adair. Medicinæ & Chirurgiæ facultatibus exercitatissimus. an Carandas Garciæ CBP. 460. Auzuba Oviedi. &c.



Tab. CXLII.

fig. 1 Arbor Conchifolia Ind. Orient. comantib; floribus, et ferè Corymbosis. an Arbor Laurifolia Chinensis Martiny.
2 Arbor Indica Mali aurantiæ folijs obtusioribus è Maderaspatan. an Akarà Patsjolli Hort. Malab. P. 5.
3. Arbor Americ. Oleomelliflua cuspidatis folijs crenatis, & dilutè virentib; polypyrene. Wilde Honey-Tree (ie) Agriomelidendros Barbadensib; dicta; eò (fortè) quòd in hujus Arboris ramos, sylvestres Apes pro mellificijs suis, favos construunt. an Miatzontecamimiaoatl Nov. Hisp Recch. p 333.
4. Arbor American. Mancinello dicta, fructu Pomi venenato, nucleis septenis & pluribus in Oſsiculo muricato, totidem loculis dispertito inclusis. Mantionel Ligonis nostri in Hist. Barbad. p. 68. an Arbor venenata fructum ferens pilæ magnitudine visu speciosum sed venenatum Thevet. Hist. Lugd. 1834. fortè. Juglandis ferè facie, Fructus exoticus sulcatus tuberosus IB. T. 1. l. 3. p. 399. fortè etiam Fructus peregrin; orbicularis novem nervis distinctus minor cum Oſsiculo anguloso ejusd IB. Fructus Orbicularis minor novem venis, ut et semen distinctus CBP. Fructus Orbicularis peregrinus 2.us nervis distinctus Clus exot. lib. 2. cap. 10.



Tab. CXLIII.
fig. 1 Arbuscula Maderaspatens. Ligustri facie Visci arborei colore & consistentiâ; an Coddam-pulli Hort. Malab. *P.1.*

2. Arbor Bisnagarica Tiliæ folijs Canschi Malabaricæ aliquatenus accedens.

3. Arbuscula Vetadagū Malabaricæ similis ē Maderaspatan.

4. Arbor Maderasp. Galactoxyli Americani foliorum æmula. fortē Tsjola Malabarensium Hort. Malab. *P.3.*

5. Arbor Iavanica Persicæ folijs Herm. Cat. Mſs. ē Maderaspatan. fortē Curutu-pala Hort. Malab. P.1. an Arbor Indica Mali Persici folio Hort. Beaumont. p.10.



Tab. CXLIV.

fig 1 *Arbor Sirinamenſis Lauri denſiorib; fol. quinis ab uno exortu prodeuntib; hujus ramulum humaniſſim; vir D. Geo. London nobis amicè communicavit, qui à Reverendiſſ. viro D.^no^ de Marees Hagæ Comitis in Hollandia, rerum Botanicarum æſtimatore inſigni, cum alijs quamplurimis reſiccatis plantis Sirinamenſibus adhuc incognitis accipiebat.*

2. *Arbor Ingæ Braſiliana folijs Africana tricoccos; fructu Mehenbethene Cortusi Clusio accedente ex Codice Comptoniano.*

3. *Arbor venenata Lyſimachiæ luteæ in modum trifoliata, an Tangaraca 1.^a Piſon. pag. 301.*

4. *Arbuſcula Barbadenſis Ciſti folijs, ferrugineis, hirſutis, circà caulem ad intervalla confertis.*

TAB. CXLV.



Tab. CXLV.

fig. 1 *Arbor Americana alatis folijs succo lacteo venenata (fortè) Ahoay-miri* Piſon p. 308.

2. *Arbor lactescens aculeata folijs Quernis Americana. Bdellifera (fortè) s. Arbor Bdellium ferens in Americâ. Arbuscula Portoricensis lactescens folijs Quercinis, spinis geminis ad singulorum foliorum ortum exasperata* Hort. Beaumont. *Quercinis folijs Arbuscula spinosa lactescens Portoricensis* PBP.

3. *Arbor aculeata Barbados Insulæ ramulis incurvis, scenam topiariam efformans Lachrymifera. fortè Arbor Stactoflua, s. Myrrhæ liquidam fundens Americana. Nostratibus Colonis Weeping Bower nuncupata.*

4. *Arbuscula Barbadensis amplexi caulis triphylla,* Mail-elou *Malabarica folijs tenerioribus et petiolis alatis.*



Tab. CXLVI.

fig.1 Arbor Americana convolvulacea Broad-leaſe(ie) Platyphyllos Barbadenſib. dicta; folijs ſerratis.

2. Arbuſculum Americanum amplexicaule Ceraſi folio corymboſum.

3. Arbuſcula volubilis Americana ſubrotundis Caſsiæ fiſtulæ folijs latè virentibus. Barbados Inſulâ in ſepibus frequens. an Colubrinum lignum 3^m. Garciæ folijs Lentiſci IB. an Lauri facie Curaſsavica volubilis fructu Mori radice croceâ &c. Hort. Beaum. Rubi vel Mori fructu Americana Arbor folijs Laurinis Morillie vulgò PBP. hujus ramulum ex Inſulâ Barbadenſi modò cum alijs compluribus exſiccatis Plantis ab honesto viro Iacobo Reede in Angliam primò allatum Obſervavimus.



Tab. CXLVII.

fig. 1. *Arbor Maderaspatensium Pavettes. Malle-amothe Malabarorum v Vasaveli quorund: haud abludens folijs autem alternis. an Arbor Malabarensium fructu Lentisci* C. B. P. & *Ioh:* Nieuhof. Itiner. *fol. 167.*

2. *Arbor Indica Tsjocalli Malabarensium haud absimilis e Maderaspatan folijs autem non crenatis.*

3. *Arbor Indica Mali Medicæ amplioribus folijs Maderaspatana; forte Ponna. s. Ponnamaram Hort Malab. P. 4. cujus Lachryma resinosa, an sit species Guttæ Gambi quæritur a Comelino in Not.*

4. *Arbor Americana teneriori folio floribus circa ramulos veluti corymbosis ex Insula Iamaicensi.*

5. *Arbor Iamaicensis densiori Tiliæ folio triphyllos, floribus Coactis s. spiſsius dispositis.*

6. *Arbor Americana triphylla numerosis staminulis purpureis apicibus præditis, floris umbilicum occupantibus. huc forte spectat Nyrvala* Hort Malab. *P. 5.*



Tab. CXLVIII.

Fig. 1. *Arbor ſpinoſa rigidioribus Fraxinellæ fol. in aculeum abeuntibus Maderaſpatana.*

2. *Arbor Indica Lauro-ceraſi folijs è Maderaſpatàn. fortè Kopang arbor Novánglicana antiarthritica* PBP.

3 *Arbuſcula Ind. Orient. hexaphylla floſculis exiguis in ſpicam poſitis ſolio teneriori.*

4. *Arbuſcula Ind. Orient. hexaphylla folijs firmioribus, ſpicatis floribus, calyce amplo.*

5. *Ariſtólochia Piſtolochia, s. Serpentaria Virginiana caule nodoſo* D. Baniſter *Cat. Mſs.*

6. *Arum humile Ariſarum dictum Virginienſe triphyllon. àn Arum triphyllum humilius et minus* Parad. Bat. Pr.



Tab. CXLIX.

Fig. 1. *Arum polyphyllum Dracunculus & Serpentaria dictum, Sirinamense caule atro-rubente glabro & eleganter variegato.* Hort. Beaum. *an Arum polyphyl. Dracontium et Serpentaria dictum folio ramoso Poeoniæ instar caule levi.* Parad. Bat. Prod.

2. *Arum minus Sagittariæ folijs ex Insulâ Barbados. an Arū minus Zeylanicum Sagittariæ folio* PBP. *forte etiam Arum montanum* Prosp. Alpin. *exot. p. 335.*

3. *Asperulæ forte congener Planta peregrina; Hujus picturam* Illustriſsimi Comitis Portlandiæ *favore, ex Codice suo plurimis rariorum & exoticarum Plantarum Iconibus vivis coloribus elegantiſsimè manupictis instructo accepimus.*

4. *Aster Conyzoides Ind. Orient. ramosior cauliculis sparsis.*

5. *Aster Sirinamensis subrotundis folijs integris lanugine obductis; sub nomine Tea ad humaniſsimū virū D^nū.* Georgiū London *primò miſsus est.*

6. *Auricula Ursi montana angustis & leviter crenatis folijs, floribus purpureis. in Horto Patavino collecta.*



Tab. CL.

fig. 1 *Bellis ramosa Umbellifera Cornuti. Bellis major ramosa Umbellifera Americana* Park. *semina fert longa, minimè papposa, utcunq; Cl.* Moriſonus *flores in pappos abire scribat in* Prælud.

2. *Bellis Myrtifolia humilis, cauliculo ad florem folioso.* Promont. Bon. Spei. ex Codice Comptoniano.

3. *Betonica Virginiana elatior Scrophulariæ folio flore ochroleuco* Hort. Oxoniens. *Betonic. max. Scrophulariæ fol. flore è luteo pallescente* Sch. Bot.

4. *Betonica Alpina latifolia major villosa flore luteo* Hort. Reg. Par.

5. *Betonica arbor Maderaspatensis villosa folijs profundè venosis.* à D.no du Bois *habui.*

6. *Eadem à seminibus ex Insulâ Barbados allatis, in Horto Reg. Hampt. enata, anno præterito lapso.*



Tab. CLI.

fig. 1 *Betula arbor Americana, ſeminibus Lithoſpermi frumentacei æmulis. Birch-Tree Barbadenſibus dicta.*

2. *Biſtorta media folio minus rugoſo* IB. *Biſtorta major radice magis intortâ* CBP. *Biſtorta magis intortâ radice* Park.

3. *Blitum erectum Barbadenſe megaſporon. an Cararū Braſilienſium* Piſon. *p.* 241. *Wylde-Spinach Noſtratibus nuncupata.*

4. *Bryonia Americana fructu aureo Ceraſi parvi magnitudine, tetrapyrene venenato, Barbadenſibus noſtratib; Poyson-Wyth vocata. in Hort. Reg. Hamptonienſ.*

5. *Bryonia Africana folijs Lupuli ſcabris. in* Horto. Comptoniano *ex ſeminibus à* Cl. Hermanno *tranſmiſſis, enatam, conſpeximus.*



Tab. CLII.

fig. 1. Bryonia Sideritidis folio multiplici, dispermos, flore cæruleo. Prom. Bon. Spei.

2. Bryonoides trifoliatum Indicum foliis succulentis, craſsis, & crenatis. an Bryonia Curaſsavic. folio dentato craſso et succoso caule PBP. append. forte Trifoliata Portoricensis Planta capreolata foliis craſsiusculis serratis, Hort. Beaumont. p. 41. in Hort. Reg. Hampt. succrescit.

3. Bucanephyllon elatius Virginianum. s. Limonio congeneris altera species elatior, foliis triplo longioribus.

4. Calaburu alba PBP. forte Sebesteniæ similis Americana ejusd PBP.

5. Campanula Alpina Sphærocephalos CBP. Trachelio majori petræo Ponæ simile, si non idem I B. t. 2. Trachelium majus petræum Ponæ Descript. Mont. Baldi

6. Campanula Sphærocephalos pervenusta foliorum ad oras insigniter denticulata forte Campanula Alp. Sphærocepb. cerulea, magno flore Schol. Botan. 76. hâc elegantiſs. Campanularum specie Dr. Doody nos ditavit.



Tab. CLIII.

fig. 1. *Cacalia Africana* Promont. Bon. Spei. *ab amiciſsimo viro D^r.* Doody *communicata.*

2. *Calamintha montana longiori folio, glabra, floribus pallide violaceis. Mentastrum glabrū. florib. violaceis* Hort. Bleſs. *an Mentha sylvestr. longioribus, nigrioribus, & minus incanis folijs.* C B P.

3. *Campanula hirsuta folio angusto tenuiter serrato, florib. parvis spicatis. forte Trachelium altiſsim. hirsutum, asperius, folijs angustis, florib. parvis* I B.

4. *Campanula minor hirsuta, Drabæ folio. an Campanula Drabæ minoris folio* C B P.

5. *Campanula hirsuta Bellidis folio. forte Trachelium parvum folio Bellidis subrotundo Raij.* Cat. Stirp. Exter.

6. *Campanula Alpina asperior, folijs Echij, flore magno villoso. Rapunculus (forte) montanus folijs Anchusæ* Moris. Hist. P. *part. 2. Rapunculus montan. s. Trachelium montan.* IB. *tom. 2. forte etiam Campanula minor folijs Succisæ flore magno* Raij. Hist. 735.

7. *Carappa arbor ex Curaſavia* PBP. *inter exsiccatas in Americâ collectas inscriptione Sideroxyli aliquando conspeximus.* Hort. Reg. Hamp. *alumna.*



Tab. CLIV.

fig. 1. Carduo-Cirsium alpinum Carlinæ vulgaris folio, & caule alato, spinis rigidioribus armatis. an Carduus dictus Cirsium, folio laciniato nigrius, & idem cum Asphodeli radicibus bulbosis I B. tom. 3. hujus exemplar in nos ditavit Dr. Sherard.

2. Carduo-Cirsium maxim. profundè laciniatum in folior. ambitu spinis mollibus hirtum. an Carduus pratensis foliis tenuibus laciniatis C B P. Erisithales Pliny. Hist. Lugd. nostri tamen flos non luteus est, sed purpureus.

3. Carduo-Cirsium minus, Cambro britannicum, floribus plurimis summo caule Coaggestis. Cirsium humile, montanum, Cynoglossi folio polyanthemum. Ray. Synops. 53. an Carduus mollis folio Lapathi. Clus. Hist.

4. Carduo-Cirsium minus, angustifol. capitulis plurimis amplioribus sparsis, è Maderaspatan.

5. Carduus tomentosus Acanthium dictus Arabicus. Hort. Oxon.

6. Carlina Chrysanthemos, Africana humilis ex Codice Compton. fortè Carlina Chrysanthemoides flore lutea Capit. Bon. Spei. Breyn. Prod. 2.

TAB. CLV.



Tab. CLV.

fig. 1. *Caryophyllus aromaticus* Ind. Or. *fructu clavato, monopyrene. Caryophylli aromatic. fructu oblongo* CBP. *Caryophylli Indici* I B. *tom. 1. Tshinka Moluc-censium* Piſon. Mant. Arom. *hujus fructus maturus & tumidus Medicis & Pharmacopolis Antophyllus nuncupatur, qui in Arbore remanens inſequente anno, sponte Cadit, iisq. languescente licet vi aromaticâ, in pretio habetur, et loco seminis Plantationi dicatur; et tunc Matrem fructuum vulgo appellat.*

2. *Caryophyllus aromaticus American. folio & fructu oblongo, polypyrene, acinis angulosis Uvarum vinaceis similibus. forte Auhuiba-miri Brasiliensium* Piſon. *Laurus odorata* Ligonis. *Sweet-Bay Barbadensibus dicta.*

3. *Caryoph. aromatic.* Ind. Occid. *folijs, & fructu rotundis, dipyrene, seminibus ferè orbiculatis planis. Caryophyllon Plinij* CBP. *Amomum quorundam odore Caryophylli.* I B. *tom. 2. Amomum aliud quorund., & Caryophyllon* Pliny. *Clusio suspicatum* Park. *Xocoxochitl. s. Piper* Tavasci *Fr. Hernand. p. 30. Piper odoratum Jamaicense Nostratib. Raij Hist. Pimienta de Chapa Hispanis Fr.* Redi *Exp. Nat. 168. Caryophylli folio et fructu rotundo* Breyn. Prod. 2. *All spice Barbadensib. vulgo.*

4. *Caryoph. aromat. Americ. Lauri acuminatis folijs fructu orbiculari. Myrtus arborea folijs Laurinis aromatica, D.ⁿⁱ Sloane; forte Ytzipericquaht s. Laurus Michuacanensis Fr. Hernand. 98. Pimienta & Jamaica Pepper Nostratibus nuncupata: hanc autem ab Icone Sloaniana apud* Transact. Philosoph. *exhibitâ depingi nos curavimus, ut ob oculos exposita diversitas faciliùs dilucescat.*

5. *Caryophyllus Regius.*



Tab. CLVI.
fig. 1 *Carpinus Virginiana floreſcens. Fagus floreſcens Virginiana Carpini folijs* Hort. Bedum. *ex ſeminib. à D. Baniſt. è Virgin. tranſmiſſ. in Horto. Comp. copioſe provenit.*
2 *Caſtanea Americana folijs averſâ parte, argenteâ lanugine villoſis. an Leucoma* Park. 1638. *Caſtanea Novæ Angliæ* Mus. Soc. Reg. *à Caſtaneâ pumilâ racemoſo fructu parvo, in ſingulis capſulis echinatis unico* D. Baniſt. *the* Chinquapin-bush. *Virginienſibus noſtrâ ſententiâ plurimùm differt.*
3 *Cenchramidea arbor pilulifera fructu tuberculis inæquali, ex granulis coniformib. in orbem glomerato, non capſularis. forte* Ytzamatl, *s. Papyrus novacularis* Nieremberg. 360. *forte etiam* Gacirma *arbor ejusd.* 295.
4. *Cenchramidea Celti arboris folio, capſulari fructu erinaceo, parvo, orbiculari, compreſſo, quinquefariàm diviſo, granulis Ficuum ſimilibus referto. forte* Amatzquitl, *s. Unedo papyracea.* Nieremberg. 360. *Barbadenſibus* Bastard-Cedar (ie) *Cedrus ſpuria vulgò nuncupatur.*



Tab. CLVII.

fig. 1. *Cedrus Barbadenſium alatis Fraxini foliis, ō. crenatis, fructu ſingulari, quinis, involucris craſſis, balidis, cochleato-cavis, totidem ſemina membranis adaucta, et Columnæ canaliculatæ, pentagonæ, prægrandi adnata, occludentibus, ornato.*


2. *Conchramidea arbor, Saxis adnaſcens, obrotundo, pingui folio, fructu pomiformi, in plurimas capſulas, granula Ficulnea, Stylo Colomnari, hexagono, præduro, adhærentia, continentes, diviſo, Balſamum fundens. an Pithahaya, quæ Saxorum Sciſſuris naſcitur* Nieremberg. 326. *forte Amacoztic. s. Papyrus lutea, s. Tepeamatl, Sycomorus Saxatilis Mexicentium* Hernand. *apud* Recch. 81. *quæ adhæret Saxis nōn mediocriter ſpectando miraculo, (ut ipſe loquitur) an hujus ſit Bdellij fructus apud* Lob. Icon. part. 2. Balſom Apple (ie) *Melo balſamum Barbadenſibus bulgò. in Hortum Regium Hampton. curâ et induſtriâ Jacobi Reede, hujus arbor bipedalis, cum fruſtulo petræ cui adnaſcitur, nuper invecta eſt.*

3. *Ceraſus Africana racemoſo fructu rubro, abſq; pediculi, folio longiori, & latiori.* ex Codice Comploniano.

4. *Ceras. Americ. Myrti conjugatis fol. fructu acerbo, tetrapyrene. an Ceraſ. Curaſſav. fructulo trapyreno, Indigenis* Simmer qucke Hort. Beaum. *Sower*. Cherry *Barbadenſib. dulc.*

5. *Ceras. Afric. fructu cæruleo e* Codice Complon. *forte Cambui Braſilienſ. s. Myrtus Americana sylveſtr.* Piſon. *Cambui. Parnambucens. arboreſc.* Ion. 51. Dendrograph. *Blacke Cherry (ie) Ceraſus nigra, Barbadenſibus dicta.*

6. *Ceraſo affinis* C B P. *Mahaleb* Mallkeoli, Hiſt. Lugd. *et* Aliorum.



Tab. CLVIII.
fig. 1 Ceraſa Americana rugoſis folijs fructu viſcoſo. an Copalxochitl Tepeacenſium de Laeto. Ind. Occid. lib. 5. Copalxochotl, s. Arbor gummi Pruniformis Hernand. lib. 3. Barbadenſibus Clammy-Cherry vocatur

2. Ceras. Africana fol. plerumq. in ſummo ſinuatis; fructu rubro, ex Codice Comptoniano.

3. Ceras. Afric. fructu rubro multiplici, folio longiori anguſto. fortè Cambui Pernambucens. fruticeſcens Ionſt. Dendr. 243. item Capolin Mexicenſibus. s. Ceraſus dulcis Indica Nieremberg. quoad Iconem 344

4. [illegible] racemoſa folijs Amygdalinis Americana. Capolin Nieremberg. quoad Deſcript. 344. Copalin. s. Ceraſus dulcis Indica Hernand. pag. 95. Cluſter-Cherry Barbadenſibus dicta.

5. Ceraſus Africana, fructu rubro, ſimplici, folio breviore, monococcos. ex Codice Comptoniano.

6. Cereus minima ſerpens Americana. in Horto Reg. Hampton. collegimus



Tab. CLIX.

fig. 1 Christophoriana Americ. Malabathri foliis acuminatis, nervosis, dentata. forte Caaghiyuyo Pison. p. 227. forte etiam Muiva Brasiliens. Marcgr. nostratibus, folia sunt utrinq; glabra. à Loti Arboris similitudine ut suspicor, Nettle-Tree Barbadensibus nostratibus nuncupatur.

2. Chrysanth. Americanum Helenii Indici max. folio & flore, s. Flos solis perennis. Helenium Indic. flore & semine maximis, perenne. Hort. Acad. Lugd.

3: Chrysanth. Virginianum, caule alato ramosius, flore minore.

4. Chrysanth. Maderaspatanum, latifolium, Scabiosæ capitulis parvis. à D. du Bois habui.

5. Chrysanth. Virginian. elatius angustifolium, caule hirsuto viridi-arbosacan quorundam; s. Helenium Canadense altissim. HRP.



Tab. CLX.

fig. 1. *Chryſanth. ferulaceum, Eliochryson dictum foliis mollioribus odoratum; Eliochryson foliis Abrotani.* C B P. *Heliochryſum quorund. foliis Abrotani.* I B. *Elyochryson, s. Coma aurea Ger. emac.* 645.

2. *Chryſanth. Perſicum Abrotani fœminæ foliis, umbellatum Heliochryſum Abrotani fœm. foliis P. Bocc.* 4. *Abrotanum fœm. verum Dioſcoridis.* Zanon


3. *Chryſanth. American. Ciceris folio glabro, flore Bellidis majoris* PBP. 323.

4. *Chryſanth. African. ad radicem Umbelliferarum more, comoſum. an Atepocapatli Mexicenſibus.* Hernand. p. 33. è Codice Comptoniano.

5. *Chryſanth. parvum ramoſiſſimum, membranaceo caule Maderaspatenſe. à D.* du Bois.

6. *Chryſanth. Maderaspatanum, Oxyacanthæ foliis, cæſiis, ad marginem ſpinoſis, calyce argenteo. à D. dubois communicata eſt.*

7. *Cinamomum ſylveſtre Barbadenſium; Arbor baccifera fructu calyculato, tetrapyrene, folio enervi.*



[Ta]b. CLXI.

1. Chrysanth. Americanum frutescens Balsaminæ luteæ folijs, nigris maculis punctatis. Chrysanth. Curaſsavic. frutescens, folijs Hyperici, nigris punctis notatis. PBP.

2. Cistus Chamærhododendros, s. Ledum Orientale Heptaneuros, folijs brevioribus, ferrugineâ, & molli lanugine, villosis. an Datura Indica folijs Malabathri. Breyn. Cent. Stramonia, s. Datura Cistoides frutescens hirsuta major, Indica, ejusd. Prodr. 2. forte Katou-Kadali. Hort. Malab. Part. 4. Zeylanensibus Ki-moy, et Mahabothya, Cingalensibus dicta. à Cl. viro Dre. Tancredo Robinsono. habui.

[3]. Cistus sempervirens, Caurifolia, floribus eleganter bullatis, Virginiana. D. Banister.

[4]. Cistus Virginiana flore, & odore Periclymeni. D. Banister. Qui utramq; propriâ manu accuratiſsimè ad vivum delineavit, & ad Nobiliſsimum Patronum Episcopum Londinens. in Angliam transmisit, cujus favore, & nos obtinuimus.

[5]. Citharexylum Americ. alter utr. folijs ad marginem dentatis. ab honesto viro Iacobo Reede, ex Insulâ Barbadensi, in Hort. Reg. Hampt. præter lapso anno allata.



Tab. CLXII.

fig. 1. Citharexylon Arbor Americana foliorum venis late canduantibus. ex cujus ligno Citharæ & Panduræ fiunt. forte Caaopia Braſilienſib. Piſon. Luſitanis Pao de Lacra. Fiddlewood Noſtratibus Inſulæ Barbados habitantibus dicta.

2. Citharexylon. s. Liriodendros ἔνυν & Arbor Americana materialis, triphylla, è cujus ligno Fidiculæ fiunt. an Tapia Marcgrav. Barbadenſibus noſtratibus Timber Fiddle-Tree nuncupata.

3. Coryli, s. Avellanæ folio oblongo et acuminato, Frutex Convolvulaceus, capreolatus, Americanus P. B. P. an Hopwood Barbadenſibus dicta

4. Clematis Peruviana, Digitalis flore folio Fraxini. Paradis. Batav. Prodr.



Tab. CLXIII.

Fig. 1. *Clematitis triphylla, arborescens, è Maderaspatan. forte Tsjori-Valli, Hort. Malab. Part. 7. an Colubrini genus triphyllum, Ind. Orient. [illegible] exsiccatas D. du Bois [illegible] Indiâ miſſas, inveni.*

2. *Clematis Myrsinites, amplioribus foliis, Americana, forte Tety-pole-iba Brasiliensibus arbustina. Pison. p. 250. an Tepehoila Capitzxochitl, Mexicensib.; Sanieula [illegible] Hernan. [illegible]*

3. *Clematitis novum genus. Cucumerinis folijs, Virginianum. Planta peculiaris pappescens, non lactescens: Banisteri.*

4. *Clinopodium Creticum, Pulegij odore, ex Horto Patavino. HRP. rectius autem (meâ sententiâ) Calamintha Clinopodij Austriaci folijs, odore Pulegij. sub priori tamen [illegible] communicavit. D. Sherard, qui in Horto Triumfetti, apud Bononienses, collegit. an Calaminth. Cattaria humilis, Polij folio, Pulegij odore. PBP. append.*

5. *Clinopodium Alpinum, hirsutum, CBP. item Teucrium Alpinum, comâ purpuro-cæruleâ. quod CBP. Chamædri Vulgari falsæ aliquatenus affinis; Alpinum Clinopodium Alpin. Pona. IB. tom. 3.*

6. *Clinopodium Pulegij Cervini folijs, Maderaspatanum, Verticillis parvis, eadem per intervalla arcte cinctis.*



Tab. CLXIV.
fig. 1. *Citrullus minor, Indiæ Orientalis. apud Exsiccatos du Boisianas invenimus.*
2. *Clinopodium Hyſſopi latioribus folijs, Maderaspatanum.*
3. *Clinopodium anguſtifolium, non ramosum, flore cæruleo, labio trifido, atropurpureis maculis notato. ex Virginiâ D. B.* [illegible]
4. *Clinopodium fistulosum pumilum, Ind. Occid. summo caule floridum.*
5. *Colutea exotica anguſtifolia, floribus luteis, aversâ parte, eleganter punctatis. ex Cod. Bentingiano.*



Tab. CLXV.
fig. 1. Colutea Javanica foliis oblongis Parad. Bat. Prodr. *Hamptoniæ in Plantarum rariorum ditiſsimo Horto Regio collegimus*

2. Colutea Sesban Ægyptiaca foliis accedens Maderaspatana.

3. Colutea Veracruzis vesicaria Par. Bat. Pr. *in Horto Regis nostri longè celeberrimo Hamptoniensi Observavimus :*

4. Coluteæ minima species dispermos ex Indiâ Orientali.

5. Colutea siliquosa Maderaspatana ad nodos caulium siliquis bigemellis. fortè Colutea foliis Acril. nominatum I B. t. 2. *pro adeptâ hujus ut et succedentium notitiâ; Rei Herbariæ cultores unà mecum Spectatiſs. viro. D. Carolo du Bois summas debent gratias, utpote qui has quatuor elegantiſs. Colutearum species simul cum plurimis aliis vesiccatis, quarum copiâ ejusdem humanitate nos quidem potiti sumus, præterito anno primùm in Europam deferri curavit.*



Tab. CLXVI.
fig. 1. Colutea siliquosa glabra ternis quinisvē folijs Maderaspatana, semine rubello. an Vzlacpatli 9. Terent. apud Recch. 451.
2. Colutea enneaphyllos Lotoides Ind. Orientalis siliculis conglomeratis.
3. Colutea siliquosa enneaphyllos Ind. Orient. siliquis & folijs aversâ parte pubescentibus.
4. Convolvulus monococcos Virginianus D. Banist.
5. Convolv. Maderasp. purpur. Violæ Martiæ folijs, floribus plurimis simūl junctis.
6. Convolv. Maderaspatanus villosus, quinquifidis folijs, capitulis Scabiosæ quodammodò mentientibus. an Convolv. Zeylanicus villosus pentaphyllus et hexaphyllus minor Hort. Acad. Lugd. Bat. 187.

TAB. CLXVII.



Tab. CLXVII.

fig. 1. *Convolvulus Americanus Vulgaris folio, capsulis triquetris, numerosis ex uno puncto longis petiolis propendentibus, semine lanuginosa ferrugineâ villoso. fortè Fructus 3. Simon Tovar. Clus. exot. (ie) Buenas noches Hispanorum. ejusd. hujus Convolvuli species est fructu majore. Mock-Climber Barbadensibus nostratibus dictus.*

2. *Convolv. cærul. Myosotis Indicus erectus Passerinæ minoris folio ramosissimus.*

3. *Convolvuli (fortè) Species Platani Occidentalis folio Prom. Bon. Sp. à D. Patricio Adair. communicata.*

4. *Convolv. Jamaicensis trilobatus folijs tomentosâ lanugine, densiori et lenissimâ, ac Veluti. ad instar utrinq; obductis, flore peramœne purpureo*

5. *Convolvulus minim: procumbens Acetosella foliolis, barbulis ad imum quaternis, summo apice tricuspidatis.*

6. *Convolvulus quinq; folius glaber Americanus, in Hort. Comptonian. ex seminibus natus.*



Tab. CLXVIII.

fig. 1 Conyza major capitata, ſeu globoſa. Paul. Boccon. p. 14.

2. Conyza Sicula, annua, lutea. folijs atroviridibus. caule rubente. Boccon. p. 62. *Conyz. caulibus rubentibus, tenuioribus, flore luteo. audi* Belan. Monsp. 7.

3. Corallina muſcoſa, s. Muscus marinus tenui capillo Spermophoros. ad maritimas noſtras invenit. D. Iacobus Petever. *& amice nobis communicavit.*

4. Corallina geniculata, mollis, Americana, segmentis latis & compreſsis. ex Insulâ Jamaicensi.

5. Cordis Indi folio, & facie, frutescens, Portoricensis. PBP. *Siliquoſarum est de genere, ut audio.*

6. Cordis Indi folio, et facie, frutescens, Curaſsavica, latifolia. PBP.



Tab. CLXIX.

Fig. 1. Corallodendron ligneum. P B P. *Glycyrrhiza vel Glycyrrhizæ affinis arborescens Americana, floribus ex luteo & rubro variegatis, folio acuminato siliquâ latiſsima* [illegible]

2. *Coriandrum minus testiculatum.* C B P. *Coriandrum minus odorum* I B. *tom.* 3.

3. *Cornus Americana sylvestris, Domesticæ similis, baccâ cœrulei coloris elegantiſsimâ. Amomum Novæ Angliæ quorundam.*

4. *Crithmum maritimum Eryngij capituli; folijs ex uno pediculo multis. Crithmus sativa, Asparagus Gallicus,* Tabernæmont. *Crithmi species* 2. *Matthioli.* Hist. Lugd. *ex Oris Mediterraneis, à* Dno. Fishwicke. *ad nos transmiſsa est.*

5. *Crotalaria Benghalensis, folijs Genistæ subhirsutis* P B P. *Katou-Tandale-Cotti.* Hort. Malab. P. 9.

6. *Crotalaria hirsuta, minor, Americana, herbacea, caule ad summum sagittato.* Hort. Acad. Lugd.

7. *Crotalaria Americ. triphylla, folijs firmioribus, glabris, frutescens, flore purpureo. an Crotalaria Americana, trifoliata, rotunda, glabra.* P B P.



Tab. CLXX.
fig. 1. *Coriandrum minus testiculatum, seminibus verrucarum instar, asperatis, & veluti saccharo incrustatis.*
2. *Cucumis Maderaspatensis fructu minimo. atq; haec una ex Plantis siccis humanitate D.ⁿ Caroli du Bois. communicata.*
3. *Cucumis sylvestr. Americ. Anguriae ſolio, fructu Ovi ſigurâ, & magnitudine, ad maturitatem pallido, spinosis tuberculis, Momordicae instar muricat. Guarerva-Oba, s. Cucumer Asininus.* Piſon. 264. in Hort. Comptonian. *ex seminibus natum invenimus.*
4. *Cucurbitifera arbor spinosa, fructu mali aurei facie, aromatica, Barbadensibus, a similitudine fructus istius* Ind. Orient. *suaviſſimi, Mangoſtans dicti Mangos forte, & Aspice nuncupatur. an Chiref Theveto.* I B. *tom.* 1. *forte etiam Arbor fructum Melonis facie proferens. ejusd.* I B. *an Calabaſſier D. Rochforti.*
5. *Cucurbitifera trifolia, spinosa, Indica, fructus pulpâ Cydonij aemulâ.* Raij. Hist. Plant. *tom.* 2. *Covalam* Hort. Malab. P. 3. *Cydonia exotica* C B P. *Malum Cydonium Indicum* Bontij. *Beli, s.* Serifole Bengalensium, *Cydonia eorundem Garciae* Clus in Not. ad Arom. Hist. *lib.* 2. *c.* 14. *Cydonium e Bengala* Acostae *Mala Cotonea, s. Marmelacta, ex quo fructus quem Capotes, s. Chicotapotes nominant.* Part. 9. Ind. Occid. *lib.* 4.



Tab. CLXXI.
fig. 1. Cucurbitifera arbor Americana, folio longo, mucronato, fructu orbiculari, granis cordiformibus, pulpâ nigrâ involutis. Arbor Cucurbitifera folio longo, mucronato,
Laurino Raij. Hist. Pl. Laurifolia Guianensis. CBP. Arbor folio Lauri, fructu Cucurbitae ex Guinea IB tom. 1. Arbor peregrina ex Guinea Clus. exot. item Macoquer Virgini-
-ensium forte, ejusd. Clusij. Fructus Orbicularis, granis Cordis effigie CBP. 434. huc etiam spectat Jenipapoeqwa Brasilianor. Clus. exot. Janipa. D. Rochfort & Genipat. Thevet.
2. Cucurbitifera arbor subrotund-folijs confertis, fructu Ovali, seminibus cordatis, massulô nigrâ inclusis, Americana Arbor Cucurbitifera American, folio subrotundo
Raij. Hist. Laurifolia Americana pomis Capitis magnitudine CBP. item Arbor Indica fructu Cucurbitae formâ & Sapore ejusd. forte etiam Ficus Nigritarum
similis, fructu magno Meloni pari, ejusd. CBP. Cujete Margrav. & Pison. bulgô corrupte Cochine. lib. 4. Choyne Americana, cujus Historiam non male Guana-
-bano quadrare Clusio videtur, Higüero Oviedi ejusd. I B. Cohyne Nieremberg. 310. Cohyne Americana. The God-Tree, (ie) Arbor Dei. Park. cujus fructum Maraka & Tamaraca
-nibales appellant, ut Clus. in Not. ad Garciae Arom. Hist. lib. 1. cap. 11 ad quam ibidem quam proxime accedit, ut ego eandem suspicor, Arbor Cucurbitif. Tabacensium, de Laet. Ind.
3. Cupi Malabarica accedens, Arbor Laurinis folijs, Maderaspatana.
4. Curini (forte) prima species, s. Carim-Curini Hort. Malab. P. 2. â Maderaspatan.
5. Curini species Maderaspatana, capsulis in vesicam, Dictamni Cretici folijs, villosa. Utramq; nos â D. du Bois impetravimus.



Tab. CLXXII.

Fig. 1. *Cucumis Indic. striatus, operculo donatus, corticoso putamine tectus. an Picinna* Hort. Malab. *P.* 8.[2] *Cucumis sylvestr. Malabaric. fructu striato amaro* Cmd. in Not.[2] *ex seminibus in* Horto. Comptoniano. *succrevit praeterito anno.*

2. *Cuscuta baccifera Barbadensium à maritimis. fortè Acatsja-valli* Hort. Malab. P. 7.

3. *Cynoglossum procumbens, glaucophyllon, maritimum, nostras, floribus purpuro-caeruleis, semine laevi. Echium marinum* Phytolog. Britan. Ray. Hist. Bu... *-sum dulce, ex Insulis Lancastriae* Park. *an Cynoglossum African. Myrtifolium Breyn.* Fascic. *fortè etiam Cynoglossum marinum* Hort. Palav. à Turr...

4. *Cynophallophoros s. Penis Caninus. Charibbaearum, Arbor foliis subrotundis, rugosis, clavos pulpiferos phalloides pro siliquis gerens. Dog prick: Bar...*

5. *Eadem mucronatis foliis, folliculis clavatis, ex uno pediculo binis.*

6. *Cynoxylum Americanum folio crassiusculo molli, et tenaci. fortè Mangaiba genus Americanum. an Kada-Kandel.* Hort. Malabaric. Part. 6. *Cynoxylum nigrum Americanum. nostratibus black dogwood vocatum.*



Tab. CLXXIII.

infeliciter depictus:

fig. 1 *Daucus montanus Pimpinellæ Saxifragæ hircinæ folio nostras* Dubriensis. *an Apium petræum s. montanum album* I B. *tom* 3. *Daucus montanus Apii folio minor* CBP. *&c in Prod.* [illegible]

2. *Daucus Pyrenaicus tenuifolius, folijs Citri odore lucidis* Dni. Fagon. Schol. Botan. a Dn. Sherard *accepi*.

3. *Echolium s. Adhatoda Zeylanens.* Mus. Zeyl. Hort. Acad. Lugd. app. *Wanapala* Malabarorum.

4. *Echinophora Maderaspatana, Sideritidis non serratis, nervosis folijs, fructu capsulari, Caucalidis æmulo. hujus forte sunt genera Codiwedi apud* Hort. Malab. P. 10. Tab. 8. & 9. *ut et Tab. 59. Ingeniosiss. vir.* Dn. du Bois. *nobis communicavit.*

5. *Elemnifera Curassavica arbor* PBT. *ex sententia* Dn. Sherard. *forte Garab Maurorum* Rawolfij. Hist. Lugd. *append. Garb Arabum* Avicen. *&c. Salix Arabica* *Atriplicis* CBP. *Horti Reg. Hampt. alumna.*

invenitur:

6. *Elichrysum latifol., villosum, alato caule, odoratissimum. cujas autem est hæc elegans Elichrysi species, nobis nondum innotuit. in Hort. Reg. Hampt.* [illegible] *annos florentem.*



TAB. CLXXIV.

fig. 1 Elichryſo affinis Africana arboreſc. floribus purpureo-violaceis. Salviæ foliis, odore Roſmarini H. Ac. Lugd. *Conyza Afr. arboreſc. Salicis capreæ folijs, odore Roſmarini* Breyn.

2. *Ephemerum Zeylan. Alſines medio folio, procumbens* Parad. Bat. Prod.

3. *Ephem. Phalangoides Maderaspatan. minimum, secundum caulem quaſi ex utriculis floridum, huic forte ſpectat Nir-pullu* Hort. Mal. P. 10.

4. *Ephemer. Phalangoides Virginian. majus erectum. Pſeudo-phalangium ramoſum majus erectum.* D. Banist. Cat. Stirp. Virg.

5. *Ephemer. Phalangoid. Virgin. flosculis Arbuteis bullatis aureis in spicam dispoſitis. Phalangium spicatum flosculo Arbuteo, bullato, aureo.* D. Banister.

6. *Ephem. Phalangoides erectum, folijs Liliaceis, bulboſum, flore flaveſcente.* Cap. Bon. Spei. ex Codice Comptoniano.

7. *Epidendron Lychnidis flore, African.* ex Codice Comptoniano. *Huic plurimum accedit Arna Overo Ana Varecca* Zanon. Istor. Bot. *nostra tamen* [illegible]



TAB.CLXXV.

fig.1. Erica humilis Rosmarinifol. Unedonis flore, capsulâ Cistoide. Ledum palustre nostras Arbuti flore Ray. Synop. Stirp. Brit. *Rosmarinum sylv. minus nostras Park. Viti Idaeo affini: Polifolia montana* I B. *tom.* 1.

2. *Erica tenuifolia flosculis suavê rubellis* Prom. Bon. Sp. *an Micatlach-Pahoa-ztli Nov. Hispan.* Terent *apud* Rech. 386. *quæ primò ab, amiciſs. viro D.* Patricio Adair *deinde à D.* Doody *nobis monstrata est.*

3. *Eriaë* Hort. Malab. *P.* 2. *Apocynum latifol. Ægyptium incanum, erectum, floribus magnis pallidè violaceis.* PBP. *Beidelsar* Alpini *s. Apocyn. Syriac.* IB. *tom.* 2. *Lapathum Ægyptiaslactesc. siliquâ Æsclepiad.* CBP. *ad Apocyna relegatur.*

4. *Eryngium Americanum Yuccæ folio, spinis ad oras molliusculis. Eryng. campest. Yuccæ folijs, spinis tenellis hinc inde margin. appositis D.* Banist. Cat: Stirp. Virg. *an Ocopiatzli Mexicens. s. Scorpij spina Hernand.* p. 222.

5. *Erythroxylum American. Hydrolapathi folijs, nuculas pyramidales filamentoso cortice inclusas, nucleo versicolore proferens forte Brasilio simile Lignum:* Vernimbock *Germanis dictum.* Redwood *Barbadensibus vulgò. Uvifera arbor Orientalis folio longo* PBP. *huic valdè similis est, si non idem.*

6. *Escharoxylum. s. Lignum focale American. quod in focis extruendis maximè usitatum. cui fructus Pyriformis octies striatus, Oxyacanthæ Virgin. magnitudine per maturitatem lignescens. an Lignum fomitis vicem præbens* Clus. *exot. l.* 1. *c.* 8. *Fire-Sprigg Barbadensibus dictum.*



Tab. CLXXVI.

fig. 1. Euodexylum, s. Lignum odoratum American. folio amplo, subrotundo, profunde venoso, fructu glandiformi Berberis instar; nullo calyce donato. Santali forte genus, aut Agallochi. Barbadensibus nostratib: Sweetwood nuncupatur. hujus folia à Guajeru Brasiliensium Marcgr. haud multum abludunt.

2. Euodexylum Americanum, folio magis mucronato. Sambosiana forte Malabarica Garciæ apud Rajum. Hist. 1804. Sweet-smelling Wood(ie) Lignum odore fragrans, Barbadensibus dictum.

3. Evonymo affinis Æthiopica sempervirens, fructu globoso scabro, foliis Salicis rigidis, serratis Hort. Lugd. Laurus non odorata fructu globoso Africana Sterbeeck. Citricult. Lauro serratæ odoratæ Stapelianæ similis inodora. Capitis Bonæ Spei. Breyn. Prodr. 3.

4. Evonymus Margaritifera pentacoccos Americana. Margaritifera arbor Surinamensis. PBP.

TAB. CLXXVII.



Tab. CLXXVII.

Fig. 1. *Eupatoria Conyzoides, integro Jacobææ folio molli & incano.* Ind. Or. *forte Jaceæ & Serratulæ affinis* Breyn. Prodr. 2.

2. *Eupatoria Conyzoid. Maderaspatana folijs glabris summo caule ramosior. an Nari-patja* Hort. Mal. *Part. 10. Conyza Malabarica Canij folio, flore purpureo.* Comelin. in Not.

3. *Eupatoria Conyzoides folio molli, & incano, capitulis magnis, Americana.* Arch-angel. *Barbadensibus dicta*

4. *Eupatorio adfinis Americana bulbosa, floribus scariosis. calycibus, contectis. Huic in capitulis saltem persimilis exhibetur, in* Hist. Mexic. Recch. *sub nomine* Xararo *ubi videsis pag. 196. Planta pappescens non lactescens Virginiana D.* Banister.

5. *Euphrasia angustis & tricuspidatis folijs flore albo & purpureo. an Euphragia Linifolia* Fab. Column. *ecphras. Part. 2. p. 68. Euphrasia folijs Lini angustioribus* CBP.

6. *Euphrasia pratensis Satureiæ folijs scabris, e Maderaspatan. an Euphrasia frutescens Coridis folio, flore albo spicato.* Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2.

7. *Fagotriticum volubile majus Virginianum. Convolvulus niger Virginianus major* Hort. Oxon.



Tab. CLXXVIII.

fig. 1. *Ficus Americana, latiori folio venoſo ex* Curacao. *an Ficus arbor Barbadenſium* Ligonis, *pag. 69. Tjakela (forte)* Horti Mal. *Part. 3. in* Hort. Regio. Hampt. [illegible]

2. *Ficus Malabarens. folio cuſpidato, fructu rotundo, parvo, gemino. D. Syen. Arealu* Hort. Malab. *P. 1. Cingalenſibus* Bogah. [illegible] *arborem adorare, quamobrem ab Incolis Chriſtianis, Arbor Diaboli, nominatur.*

3. *Ficus Indica Tiliæ folio, subtùs albo, & villoſo, polyrhizos s. filamentis è ſummis ramis ad terram miſſis, radicoſa, è* Plinio. Theophraſto, *et* Strabone [illegible] *Ficus Indica* Cluſ. exot. *Ficus Indica folijs Mali Cotonei ſimilibus, fructu ficubus ſimili, in Goa.* C.B.P. *an Ficus arboreſc. Bengalenſis folio* [illegible] *orbiculato. Pipal Bengalenſibus.* Hort. Beaum. *Broad-leafed Mangrove, Barbadenſibus noſtratibus, dicta.*

4. *Ficus arbor Americana, Arbuti folijs, non ſerrata, fructu Piſi magnitudine, funiculis è ramis ad terram demiſſis prolifera. forte Ficus arboreſcens,* [illegible] *Arbuti folijs, non ſerratis.* Hort. Beaum. *an Katou-alou* Hort. Malab. P. 3. *quæ ipſiſſimam Ficum Indicam Cluſij* [illegible] *tamen folia, omninò ſunt glabra, infernè quidem albicantia, non lanuginoſa. Bearded-Fig-Tree, (ie) Ficus barbata Barbadenſibus* [illegible].

TAB. CLXXIX.



Tab. CLXXIX.

Fig. 1. *Filix Africana maxima Polypodii facie* PBP. *fortè etiam Filix African. lobis profunde inciſis & mucronatis ejusd.* PBP. *inter* Addenda. *primùm in* Hort. Reg. Hampt. *observ.*

2. *Filix mas Vulgari similis, pinnulis amplioribus, planis, nec crenatis, Virginiana. Conſumatiſsimus ille Botanic D. Banister, manu suâ, accuratiſsimè delineavit & in Angliam transmisit. quam* Reverendiſsim. Dom. Episcopi. Londinens. *gratiâ accepimus.*

3. *Filix Saxatilis folijs non serratis.* CBP. *Filix minor non ramosa.* IB. *t.* 3. *Filicis genus parvum primum in Montibus* Cæsalpin.

4. *Filix arborea s. Dryopteris Tragi.* Hist. Lugd. ... 5. *Filix querna.* CBP. *Filicis genus parvum alterum in Montibus* Cæsalpini.

5. *Filix pumila Saxatilis altera.* Clusij. Park. *Filix non ramosa, nigris maculis punctata.* CBP.

6. *Filix mas non ramosa, pinnulis, latis, auriculatis, spinosis.* Ger. emac.



Tab. CLXXX.

fig. 1. *Filix mas aculeata noſtras, alis expanſis, muſcoſâ lanugine aſperſa. an Filix aculeata maj.* CBP. *Filix Conchitidi affinis* IB. *fortè etiam Filix mas non ramoſa, pinnulis, latis, denſis, minutim dentatis.* Ger. emac. 1129.

2. *Filix Africana humilis, ſpinoſa, pinnulis latioribus, minus patula.* in Hort. Reg. Hampton. viget.

3. *Filix aculeata Conchitidis æmula noſtras.*

4. *Filix mas non ramoſa, pinnulis anguſtis, rarioribus, profundè dentatis.* Ger. emac. 1130.

5. *Filix Saxatilis caule tenui fragili.* Ray. *Adianthum album folio Filicis.* IB. *Filicula fontana major. ſ. Adianth. Filicis folio.* CBP. *Dryopteris candida* Dod. Hist. Lugd. 1127.

6. *Filicula fontana latiori folio, ad imum ſolummodò ramoſa. an Filicula fontana Adianthi facie, latifolia, dentata.* Schol. Botanic. pag. 3.



ab. CLXXXI.
ig. 1. *Filicula fontana Rutæ murariæ facie, tenerifolia. an Filicula fontana minor.* CBP.
2. *Filix mas ramoſa, pinnulis dentatis.* Ger. emac. 1129.
3. *Filix exotica, prælongis, & anguſtis ramulis, denticulata.*
4. *Filix Virginiana, non dentata, florida, folijs alternis, & in ſummo caule, ſeminibus occultatis.*
5. *Filix Africana, floridæ ſimilis, in ambitu foliorum, argutè denticulata. an Filix Africana, vel Monomotapenſis, ramoſa, fœmina* Hort. Beaumont. *pag. 21. ab amico noſtro,* D. Patricio Adaire. *communicata eſt.*



Tab. CLXXXII.

fig. 1 *Filix ſaxatilis ramoſa maritima noſtras.* Raij. Hiſt. Pl. 151. *Filix Orubia ramoſa* PBP. app. *in Hort. Reg. Hampton.*

2. *Filix ſaxatilis ramoſa major. ex Horto Patavino inter Collectanea ſuas, oſtendit nobis, Cl. Vir. D. D. More, annis, & Scientiâ gravis.*

3. *Filix Acaciæ Corniger æfolijs peregrina, nobis communicavit. amicus noſter integerrimus,* D^r. Tancred Robinſon.

4 *Fraxinus Alepenſis.* Hort. Acad. Lugd. *Fraxinus (fortè) rotundiore folio.* CBP. *Ornus Galli Preſſani, lib. de re ruſticâ.*

5. *Frutex Guineenſis, Zyzyphi folijs, leviter ſerratis, & odoratis,* Hort. Beaumont. *pag. 22.*

6. *Fucus. ſ. Alga viridis capillaceo folio.* CBP. *rectiùs autem Conferva marina, ſ. Muſcus marinus, virens tenuifolius.*



LXXXIII.

Frutex Africanus ambram ſpirans, in Hort. Comptoniano. *ex ſeminibus oritur, & in Codice Comptoniano depingitur.*

Frutex Maderaſpatan. Hyperici fruteſcentis facie, cortice cinereo. an Frutex Guineenſis Hyperici arboreſcentis dicti, folijs majorib. Hort. Beaumont. 22.


Frutex baccifer Pruneſolius, non ſerratus, e Maderaſpatan.

Fruticulus capſularis, hexapetalos, Caſiæ Poetarum folijs, e Maderaſpatan. Frutex baccifer folijs Lini vel Caſsiæ Poeticæ Maderaſpatenſis, noſter. Phytograph. P. 1. Tab. 31. an Evonymo affinis, alatis folijs, alternis, pericarpio in Sex loculamenta diviſo.

Idem folijs brevioribus, ſubrotundis, & denſius ſtipatis. in Hort. Reg. Hampton. *e ſemine natus. forte Kirganeli.* H. M. *P. 10.*

Idem breviorib. folijs & anguſtis. ex Plantis ſiccis du Boiſianis, hos Fruticulos excerpſimus. an Tjeru-Kirganeli. H. M. *P. 10.*

TAB. CLXXXIV.



Tab. CLXXXIV.
fig. 1 Frutex Capensis baccifer, spinosus, foliis pennas avium referentibus; forte Arbor spinosa ex Javâ, unde Cato... Lycium exprimitur. Bontij. Hist. Item, Copalquauhxiotl Mexicensibus. Recch. + 7. an Viy Brasiliensibus Arbor. Maregr.
2 Fucus trichoides nostras, aurei coloris, ramulorum apicibus furcatis. an Corallioides tenuifolia, obsequiosa, minima. IB.
3. Fucus Indicus, teres, setam piscatoriam referens, longiſſimus.
4 Fungus arboreus Virginianus, platyceros, parvus. D. Banister.
5. Fungus pulverulentus Virginianus, caudice Corallino, topiario opere contorto. D. Banister.
6. Fungus phalloides, parvus. Penis caninus Virginiae. D. Banister.
7. Fungus pulverulentus, granulatus, Virginiensis. D. Banister.
8. Fungus pulverulentus, Pyriformis, fundo spongioso, ex Virginiâ. D. Banister.
9. Fungu. Campaniformis, niger, parvus, multa semina plana in se continens. D.ris Merret. Pinac. Fungus minimus χυάνιμος Clus. Fungus minimus, ligneis tabellis areolarum hortorum adnascens. CBP. Fungi Calyciformes, seminiferi Mentzel. hujus delineationem Celeberrimus ille Botanicus D. Banister ex Virginiâ transmisit.
10 Fungus Virginianus barbatus, fœtidus. D. Banister.



Tab. CLXXXV.
fig. 1 Galactoxylon, s. Arbor Americana, baccifera, lacteum liquorem, ex ligno fundens; qui durus, instar Gummi evadit. an Muruaugifera arbor. de Cat. Milk-wood Barbadensibus. dicta.

2 Genistella arborescens, Styracis folio major; flore cæruleo. Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. *Crotalaria arbor Africa, Styracis folio molli incano, flore cæruleo.* Amm. *Charact. Pl. Arbor siliquosa, Africana, Genistæ semine.* Bartholin. Act. Hafn. *Anno 1673. Obs. 131. Hort. Comptoniani, insigne constat Ornamentum.*

3. *Genistæ similis, Frutex folijs cæsijs (triphyllos)* PBP. *in* Hort. Reg. Hamptoniens. *colitur.*

4. *Genista Oleastri Germanici. folijs singularibus, Maderaspatana.*

5. *Genista Capensis, spinosa, Ligustri folio, pentaphyllos, floribus spicatis, rubris. à Cl. D.* Patricio Adair, *accepi.*

6. *Genisto-Spartium, bacciferum, Ericæ folijs, Africanum. ex* Codice. Comptoniano.



Tab. CLXXXVI.

fig. 1 *Gentiana major, Virginiana, floribus amplis, Ochroleucis.*

2. *Gentianella Utriusq; Indiæ, impatiens, foliis Agerati; hujus capsulæ aquâ aliquandiu immersæ, cum strepitu diſſiliunt, & semen maturum, exiliendo vibrant; & inde ratio nominis, Snap-graſſe Barbadensibus vulgò.*

3. *Geranium argenteum, Alpinum.* C.B.P. *Geran. argenteum,* Montis Baldi I.B. *Geran. argent. Alpin. longiùs radicatum* Ponæ. Park.

4. *Geran. African. tenuifolium, Robertiani divisuris, flore magno striato, ex* Codice Bentingiano.

5. *Geran. African. noctuolens, flore ruberrimo, Anemones foliolo latiore.*

6. *Geran. Africanum, noctuolens, flore rubro, Anemones folio angustiori. Utramq; ex* Codice Comptoniano. *transtulimus.*



. CLXXXVII

1. *Geranium African. noctuolens, Aquilegiæ folio, flore incarnato rubente.* ex Codice Comptoniano.

. *Gladiolus Phalangoides Æthiopicum, floribus parvis, flaveſcentibus.* ex Codice Bentingiano. *Siſynrichij (fortè) spec. Africana.*


. *Gladiolus Phalangoides Æthiopicum (fortè Siſynrichij genus) flore pentapetalo, obſoleti coloris.* ex Cod. Bentingiano.

. *Gladiolus Africanus, anguſtiſſimo folio, dilutè purpuraſcens* ex Cod. Comptoniano. *an Gladiolus pumilus Africanus, anguſtiſſimo folio.* PBP.

. *Gnaphalium latifol. minus, ramoſum, capitulis palleſcentibus, è Maderaspatan.*

. *Gnaphal. supinum, echinato ſemine, Luſitanicum.* Grisleij. Viridar. Lusitan.

. *Gnaphalio Americano affinis, planta, capitulis conglobatis.* Hort. Reg. Paris.



Tab. CLXXXVIII.

fig. 1. *Goſſipium fruteſcens, annuum, folio trilobato, Barbadenſe. Goſſipium fruteſcens, ſemine albo.* CBP. *Xylon, ſ. Goſſipium herbaceum.* IB. *an Goſſipium Braſilianum flore flavo; Aminiju Indigenis, Algodon Luſitanis.* Marcgr.

2. *Goſſipium fruteſcens, annuum, folio Vitis ampliori, quinquifido, Inſulæ Providentiæ. an Bambagia arborea, di Pernambuco.* Zanon. p. 40.

3. *Goſſipium herbaceum, ſ. Xylon Maderaſpatenſe, rubicundo flore pentaphyllæum. an Cudu-pariti Hort. Malab. P. 2.*

4. *Goſſipium, ſ. Xylon arbor Oriental. digitatis folijs, lævibus, fructu quinq; -capſulari, albâ & nitente lanugine farcto. Goſſipium Javanenſe, ſalicis folio.* CBP. *Lanigera arbor, ſ. Goſſampinus Plinio,* Bontij. *Panja Panjala* Hort. Malab. *P. 5.*

5. *Graminifolia aquatica, Thlaſpeos capitulis, rotundis, ſepto medio, ſiliculam, dirimente. à D. Sherard Inventore, ex Hiberniâ in Angliam, nuperrimè nobis tranſmiſſa eſt.*



Tab. CLXXXIX.

Fig. 1. *Goſſipium: Xylon arbor Occidentale, folijs digitatis, per marginem crenatis, fructu conoide quinq., capſulari, lanugine leucophæâ, referto.*

2. *Goſſipium s. Xylon arboreum [illegible] rite dictum, è Monte Serrato, Americanum, quinq., capſulari fructu Cylindroide, leucophæâ lanugine farcto hujus tantum fructus Icon. exhibetur, quem ab Inſigni Botanico D. Gulielmo Courtine habuimus.*

3. *Gramen geniculatum folijs brevibus, aculeos mentientibus, Maderaspatanum. fortè Arundo graminea, aculeata.* Pr. Alpin. exot.

4. *Gram. miliaceum, latiori folio, Maderaspatanum; apud exſiccatas du* Boisianas. *Obſervavimus.*

5. *Gram. paniceum minus, spicâ divulsâ, Inſulæ Barbadens. Pagiter Graſſe. & Peſtis Coloni, noſtratibus nuncupatur.*

6. *Gram. juncoide, glomeratis capitulis, Maderaspatenſe.*

7. *Gram. dactylon Americanum, cruciatum, Barbadensib; noſtratibus, Dutch-Graſſe, dictum; an Gramen Stellatum, Ægyptiacum* Vesling in Not. ad. Alpin. *Gram. Iavanicum, cruciatum.* Iac. Bontij.



CXC. CBP.

ramen dactylon, aromatic., multiplici paniculâ, spicis brevib; tomento candicantib; ex eodem pediculo binis. Schoenanthos, s. Juncus odoratus. IB. Juncus odoratus aromaticus.
ram. dactylon, maximum, Americanum. Hort. Reg. Par. Gram. dactylon, Indicum, esculentum, spicâ articulatâ. Ambrosini Phyt. Sesamum perenne, Indic. Zanoni. pag. 13
ram. amoris. Indiæ Orient. paniculâ sparsâ, glumarum petiolis, huc illuc undatim inflexis.
ram. Maderaspatanum, paniculâ spicatâ, longâ, speciosissimâ.
ram. Maderaspatanum, spicâ interruptâ, totali e pluribus spicis parvis villosis, elegantissimè constructâ.
ram. Alopecuroides Maderaspatanum, spicâ quasi geniculatâ, molli.
ram. hirsutum, Indic. glomeratis capitulis, Lagopi æmulis, glumâ, è squamulis plurimis, purpurascentibus, aristâ unicâ donatis, compactili.
ram. Cyperoid. latiori folio, paniculâ in summitate caulis, Conglomeratâ. Horum pleraq; novas, Graminum species, Indianas, ex siccis suis Plantis, obtulit n...
D. Carolus du Bois. Stirpium rariorum, Collector, & Cultor præstantissimus.



Tab. CXCI.
fig. 1 Gram. paniceum, multiplici spicâ, Maderaspatanum.
2. Gram. multiplici spicâ, Maderaspatanum, Calamo, secundū longitudinem, aculeis horrido.
3. Gram. avenaceum, Maderaspatanum, paniculâ sparsâ, aristis longioribus, ornata.
4. Gram. avenaceum, Maderaspatanum, locustis rarioribus, turgidulis, aristis, brevibus, donatis.
5. Gram. Secalinum, Indicum, spicâ, gracili, tomentoso, aristis longiorib;, ad se invicē intortis.
6. Gram. Loliaceum, majus, spicis in verticillas, multiplicatis, Maderaspatanum.
7. Gram. Cyperoides Indiæ Orient. elatius, paniculâ sparsâ, pallescente.
8. Gram. Cyperoides, pumilum, elegans, è Maderaspatan.



Tab. CXCII.

Fig. 1 Gram. Cyperoides rarius, et tenuius spicatum, è Maderaspatan.

2. Gram. Cyperoides Maderaspatanum, paniculâ magis sparsâ, & speciosâ.

3. Gramen. Cyperoides, elegans, paniculâ, spicis mollibus compositâ, Maderaspatanum.

4. Gram. Cyperoides, Maderaspatanum, spicis plurimis, summo caule, in orbem congestis.

5. Gram. Cyperoid. Maderaspatanum caule compreſſo, sparsâ paniculâ Junci.

6. Gram. Junceum; s. Juncus foliaceus, humilis, caule rotundo, Maderaspatensis.

7. Gram. Junceum, minus, è Maderaspatan; s. Juncus pumilus, capitulis in summitate, aphyllos. plurima horum rariorum Graminum genera, ex Plantis siccis, liberalitate Spectatiſſ. Viri, & Botanici Celeberr. D. Caroli du Bois. nobis communicata sunt.



Tab. CXCIII.

fig. 1. *Gratiola Indica minor vera s. Hyſſopoides è Maderaspatan. inter Collectaneas du* Bois'ianas *invenimus*.

2. *Gratiolæ affinis Chamædryoides, Maderaspatensis. ibidem.*

3. *Gratiolæ affinis Maderaspatana, Digitalis æmula, folio Clinopodij, capsulis in verticillas positis.*

4. *Guaiava alba acida, fructu rotundiori Ind. Or. Guyabo pomifera Indica* CBP. *Guaiava Indica, fructu Mali facie* IB. *tom.* 1. Xalxocholl *Mexicanis. s. Pomum arenosum,* Hernand. *Araca-Guacu, Brasiliens.* Pison *hujus alter a species, viz. Guaiava rubra fructu itidem rotundiori. Malacka-Pela Malabarensibus nuncupatur, de quâ consule* Hort Malab. *P. 3.*

5. *Heliotropium Gnaphaloides litoreum, fruticescens, Americanum.* Sea Lavender *Barbadensibus dictum.*

6. *Hippuris muscosus sub aquâ repens in Hiberniâ, ubi insignis Botanicus,* D. Sherard *invenit, & in Angliam ad nos transmisit.*

7. *Hippuris exigua fluviatilis petræa nuda Virginiensis* D. Banister. *à Musco marino Equisetiformi, non ramoso* D. Ray. *haud multum abludit. cujus* Icon *exhibetur,* Phytogr. P. 1. T. 48.



Tab.CXCIV.

fig.1 *Hieracium Alpinum humile, Doronici facie,* Schol. Botanic. *pag.190.*

2. *Hieracium Alpinum, latiore folio piloſum, flore majore. an Hieracium Alpin. latifol. billoſum, magno flore.* CBP. *an Piloſella, s. Pulmonaria lutea, anguſtiori folio, valdè piloſa.* IB. *tom.2.*

3. *Hieracium piloſiſſimum parvo flore, non ramoſum. an Piloſella Syriaca.* CBP. *Piloſella maxima, Syriaca.* Lob. Hiſt. Lugd. *ſub quo titulo, in Herbarijs Vivis apud Patavinos compilatis, ſæpiùs invenimus.*

4. *Hieracium latifolium piloſum, coccineum, umbellatum, Indicum,* Hort. Acad. Lugd. *Piloſella Indica* Cornuti. Canadens. Plantar. Hiſt. *in app.*

5. *Horminum rugoſo, verrucoſoq; folio, cornu Cervinum exprimente.* PBP. *Horminum Syriacum, tomentoſum folijs Coronopi, s. profundè laciniatis.* Breyn. *Prodr.2. Horminum rarum, folijs laciniatis.* Rawolfÿ. *in Herbario vivo.*

6. *Horminum Arabicum, alatis, folijs, flore rubello.* Hort. Oxonienſ.

7. *Hormino accedens, anguſtiſſimo folio, glabro, Maderaspatenſis, ex Plantis siccis du* Boſianis *habuimus.*



Tab. CXCV.

fig. 1. *Hyacintho affinis, tuberosâ radice, Africana, umbellâ cœruleâ, inodora.* H. Ac. Lugd. 327. *in Hort. Reg. Hampt. floruit, & elegantiſſimè depingitur in* Cod. Bentingiano.

2. *Hyacinthus Africanus folijs Colchici, floribus coccineis, major.* ex Codice Bentingiano.

3. *Hyacinth. Coccineus, Africanus, minor, flore longo, cernuo* ex Codice Bentingiano.

4. *Hyacinthus stellatus, spicatus, floribus incarnatis, caule & folio Orchidis,* ex Prom. Bon. Spei. Codic. Comptoniani.

5. *Hyacinth. Africanus, Orchioides serpentarius, folio singulari, undato, pilis ciliaribus, fimbriato, floribus ex aureo purpurantibus.* Codicis. Comptoniani.

6. *Hyacinthus Africanus, Orchioides, triphyllos, flore croceo, Colchici Fritillarici folijs undatis, capsulâ inflatâ.* ex Codice Comptoniano.



Tab. CXCVI.

fig.1 *Jacea lutea, Cichorei folijs, minus laciniatis, Americana. ex seminibus, è Virginia miſſis, in hortulo nostro per biennium floruit.*

2. *Jacobæa Africana, frutescens, folijs Abrotani, s. Crithmi minor.* PBP. *hujus ramulum, à Prom. Bon. Spei. absq. titulo allatum, à Botanico exercitatiſſimo D. Samuele Doody. accepimus; cujus varietas major, in* Hort. Reg. Hampton. *nunc colitur.*

3. *Ilex folio Agrifolij, Americana. fortè Agria, s. Aquifolia Glandifera* Anguillaræ IB. *quale autem sit, hoc ejus Aquifolium, ingenuè fatetur se ignorare* Bauhinus.

4. *Ilex aculeata, sanguineis bacis, radicibus tuberosis, Americana.*

5. *Ilicis facie, folijs majoribus, leviter aculeatis, è Maderaspatan. fortè Ahuapatli Tiliacensis.* Hernand.

6. *Iris Virginiana pumila, s. Chamæiris verna, angustifolia, flore purpuro-cæruleo, odorato.* D. Banister.



Tab. CXCVII.

Fig. 1 Ilex aculeata, foliis nigris ampliſſimis; forte Phellodrys nigra, latiſſimo folio Hist. Lugd. 26. Phellodrys nigra I.B. in Horto Comptoniano, ſuccreſcit.

2. Jujuba. s. Zizyphus Zeylanica rotundifolia, crenato, minor, foliis subtus lanuginosis, in Hort. Regio. Hampton. Obſervavimus.

3. Jujube s. Zizyphus Africana, mucronatis foliis, spinâ gemellâ, forte Jujube Africana longiſſimis, & acutiſſimis spinis horrida. Hort. Beaumont. 25.

4. Juniperus Barbadensis, Cupreſſi folio, ramulis quadratis. Savin, or Cypreſſe Tree, nostratibus dicta. ab honesto viro Jacobo Reede, in Inſulâ B...


collectum, & siccatum nos accepimus.

5. Juniperi foliis Frutex Africanus. PBP. in Hort. Reg. Hampton. conſpeximus.

6. Juncus conglomeratus Maderaspatensis, acumine geniculato.

7. Juncellus Maderaspatensis, capitulis compactioribus, acumine bifido, longiori.

8. Juncus minor Barbadensis, paniculâ compactiore, acumine bifido, brevi.



Tab. CXCVIII.

fig. 1 *Lamium purpureum, fœtidum, folio parvo, acuminato, flore majore. Galeopsis s. Urtica iners, flore purpuraſcente, majore, folio non maculato.* IB. *tom.* 3. *an Lamium, folio oblongo, flore rubro* Park. 606.

2. *Laserpitium majus, segmentis longioribus, & indiviſis. forte Laserpitium anguſtifolium non ſinuatum* Schol. Botan. 167.

3. *Laserpitium lobis anguſtioribus, & dilute virentibus, conjugatim poſitis.* Morison. Umbel.

4. *Laserpitium tenuifolium, lobis obscurè virentibus, Laserpitio Lobelij ſimilis, anguſtifolia* IB. *tom.* 3. *Laserpitio Maſſiolotico ſimilis, anguſtifolia planta* Chabrei. *an Laserpit. anguſtifol. ſemine criſpo, D. Fagon.* HRP.

5. *Laserpitium lobis anguſtioribus lucidis saturatè virentibus, pluriſariam diviſis. Laserpitium Gallicum* CBP. *Laserpitium Maſſioloticum* Lobelij. *Laserpitium è Regione Maſſiliæ allatum* IB.

6. *Laserpitium lobis anguſtioribus, longioribus, & dilute virentibus, pluriſariam diviſis. Moriſ. Umbel.* 64. *Cl. Hermann, et Sutherlandus noſter in ſuis Catalogis, hanc speciem, pro eâdem cum Laserpitio Gallico. s. Maſſioſotico ponunt; At ipſe* Morisonus *in* Præelud. *clarè pronuntiat illam ab hâc diſtingui, quòd folia producit dilutiùs virentia, quàm Gallicum, cujus folia sunt lucidè atro-virentia. an Laserpitium Daucoides, Prutenicum viscoso ſemine Breyn. Cent.* 2.



Tab. CXCIX.

Fig. 1. *Laserpitium anguſtiore folio, umbellâ concavâ, & contractâ.* Schol. Botan. 167.

2. *Laurus Maderenſis anguſtifolia pallida, odoratiſſima, venis foliorum, averſâ parte, magis extantibus.*

3. *Laurus Azorica pallidioribus, & latioribus folijs, inodora.*

4. *Laurifacie Arbor, folijs supernâ parte saturatè viridibus, subtùs candore nitentibus, Americana. an Laurifolia arbor Americana* PBP. *in Hort. Reg. Hampt. cohor*

5. *Laurifacie Arbor, graveolens, folijs pallidioribus, foliaceis pediculis, Americana. an Arbor Indica Nerij folijs, plenubreau.. ex Catr. y.* D. Herman. *sub eodem enim titulo aliquandò Obſervavimus.*

6. *Laurifacie Arbor, venuſtiſſimè venoſis folijs, lacte turgens. Americana. an Mangaibæ Braſilienſium cognata nimis.*

7. *Laurustinus floribus albidis, eleganter bullatis, Virginiana.* D. Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.



Tab. CCC.
fig. 1 *Leucadendros Africana, arbor tota argentea, sericea, folijs integris.* Atlas Tree. D. Herman. *hujus ramulus ex* Prom. Bon. Spei. *ad D. Doodij Botanicum acerrimum, allatus est, qui nobis ad exsculpendum communicavit.*
2. *Leucadendro similis Africana arbor argentea, folio summo, crenaturis florida. an Leucadendros Africana, folijs serratis, D.* Herman. à Promont. Bon. *Sp. sibi allatam, ad me misit amiciſſimus Vir. D.* Patricius Adair.
3. *Leucoium African. flore Lini cærulei, Mollugimis folio. D. Herman. forte Chichimecapatli, seu Chichimecæ Gentis Medicina* Hernand. *è Codice Complon.*
4. *Leucoxylum arbor siliquosa, quinis folijs, floribus Nerij, alato semine Americana. Pseudo-Apocyni genus, quinquefolium Barbadensibus nostratibus, Whitewood, Tulipflower, et aliquando Trumpet Flower, nuncupatur.*
5. *Limonium fruticosum, minimum, glabrum. forte Limonium maritimum minimum* CB. prodr. *cujus Iconem vidi si; quod Bocconiana.*
6. *Locus spuria, punctatis folijs, Arbor Americana, fructu parvo Pruniformi, officulo sulcat. Barbadensibus Bastard-Locus, vocata. forte Frutex arborescens innominatus, folijs oblongis, acuminatis, leviter serratis, alternis, & veluti perforatis.* Marcgr. p. 81.
7. *Lotus Maderaspatanus villosus, Ornithopodij siliquâ singulari.*

thus far 116A Figures



Tab. CCI
fig. 1. *Lotus* πολυκέρατος *incana flore majore, viridi.* Morison. *Hist.* 2. *p.* 178. *Lotus pentaphyllos incanus.* CBP. *Dorycnio congener Planta* I. B. *tom.* 1. *Dorycnij congener planta,* Clusij. Hist. Lugd.
2. *Lotus tenuifolius Maderaspatanus, siliquâ singulari glabrâ. Manneli.* Hort. Malab. *huic proprius quam Anil sylvestri Bisnagarico* Ph. Phytograph. *Tab.* 101. *accedere videtur.*
3. *Lucinium Tiliæ folijs minoribus, Americanum, forte Curupicaiba Brasiliensib.* Marcgr. *p.* 132. *an Arbor Populo similis, resinosa.* CBP. *Toco Guebet* (ie) *Arbor desiderij.* *forte etiam Arbor lucens, Jamaicensis nostras Raij. Hist. app. Arbor muscarum splendentium* Ionston. Dendrolo. 471. *Barbadensibus nostratibus, quibusdam* Light-Wood, *ab alijs Lignum Rhodium nuncupatur.*
4. *Lupulus sylvestris Americana, claviculis donata. Wilde Hop-seed, Barbadensibus dicta.*
5. *Lupulo vulgari similis Indiæ Orientalis, floribus in spicam, ex origine foliorum prodeuntem,* dispositis. *an Urticæ genus Indianum, minime pungens. forte Batti-Schorigenam* Hort. Malab. P. 2.
6. *Lycium maximum, cordatis folijs, Maderaspatanum, hamatis spinis, flosculis ex uno pediculo racemosis.*
7. *Lycium cordatis folijs, magis ramosum, spinis rectis è Maderaspatan. ex Plantis siccis, Utraq; liberalitate Spectatissimi Viri D. Caroli du Bois. communicata.*



Tab.CCII.

fig.1 *Lycium ternis spinis, serratis non foliis, ad genicula prorumpentibus. forte Lycium Creticum Prosp. Alpin. exot. Lycium Cretense s. Berberis Cretica. I.B. Berberis Alpina Cretica. C.B.P.*

2. *Lycium Mader aspatanum, Indici Alpino putati æmulum, bijugis, & gracilioribus aculeis, horridum.*

3. *Lycium Portoricense, Buxi foliis angustioribus* Hort. Beaum. *an Berberidis facie, Arbuscula Americana spinosa, foliis Lycio nonnihil similibus.* P.B.P.

4. *Lycium cordatis Buxi foliis, Maderaspatanum, ad singulorum foliorum sedem, spinula ornatum. è du Boisianis.*

5. *Lycium Pyracanthæ foliis latioribus, an ipsa Pyracantha è Maderaspatan.*

6. *Lycio cognatus Frutex, Polemonij facie triphyllos è Maderaspatan. ex Herbario vivo du Boisiano.*

7. *Lysimachia lutea, corniculata angustifolia flore minore. an Lysimachia angustifolia Canadensis altera caule rubro, flore minore* Schol. Botan.

8. *Lysimachia non papposa Virginiana, Tuberariæ foliis hirsutis, flore tetrapetalo rubello.* D. Banister.



Tab. CCIII.

fig. 1. *Lychnis viscosa Virginiana flore amplo, coccineo, s. Muscipula Regia D. Baniſter.*

2. *Lysimachia non papposa flore luteo majore, siliquâ Caryophylloide minore, ex Virginiâ. D. Baniſter. forte Camaramoniga altera Braſil.* [illegible]

3. *Lysimachia corniculata, maritima, sinuatis, & pubescentibus folijs, Virginiana. D. Baniſter.*

4. *Lysimachia viscosa, glabra, Parietariæ folijs, Virginiana.* Hort. Oxon.

5. *Lysimachia non papposa, humilis, Maderaspatana. Clinopodij lutei folijs non crenatis, fructu Caryophylloide parvo.*

6. *Lysimachiæ spicatæ purpureæ affinis, Hyssopi folia è Maderaspatan.*

7. *Manga sylvestris Indiæ Orientalis.* Hort. Reg. Hampton. *forte Cat-Ambalam s. Pee-Ambalam.* Hort. Malab. *P. 3. abſq; Fig.* [illegible]



Tab.CCIV.

fig.1 *Malus Persica, dilaceratis folijs, & veluti circumrosis, Virginiana.* in Hort. Comptonian. *per multos annos exculta.*

2. *Mamee arbor* Indiæ Occidentalis, *Juglandis folio vinifera. Mamaya.* IB. *forte etiam Arbor vinifera, Couton Juglandis similis ejusd* IB. *tom.* 1. *Arbor Indica Mamaia dicta.* CBP. *Mamee, Momin, & Toddie Tree Nostratibus appellata.*

3. *Mangle arbor Pyrifolia, ſalsis, & uliginosis locis, in America, proveniens; fructu oblongo, tereti, sommis ramis radicosa. Mangle Pyrifolijs, cum siliquis longis, Ficui Indicæ affinis.* IB. *Mangues. s. Mangles* 3ª *species, Guaparaiba dicta.* Pisonis. *Paretuvier* Rochfort. *Arbor de Raiz.* Linschot. *Ind. Or. P.* 4. *Ostreifera arbor quæ in* Sierra Lionia. *provenit.* Purchasij. *Navigat. tom.* ; *forte Kandel, Kari-Kandel, vel Pee-Kandel.* Hort. Malab. *P.* 6. *Swamp-Mangrove-Tree, Nostratibus dicta et aliquando, Oyster-Tree.*

4. *Mangle alba, Coriaria, folio densiusculo subrotundo, glabro; fructu forma caryophylli aromatici majore. Mangue* 2ª *species, s. Cereibuna Braſilienſium* Pisonis. *Pou-Kandel. forte* Hort. Malab. *P.* 6. *White Mangrove Barbadensibus dicta.*

5. *Nasturtiolum Alpinum, tenuiſſime divisum.* IB. *tom.* 2. CBP. *Thlaspi montanum minimum.* Hist. Lugd.



Tab. CCV.

Fig. 1. Manihot Indorum, s. Yuca foliis Cannabinis; CBP. *Manihot* Theveti. *Yucca, & Caſſavi;* IB. *Hiucca, s. Mandioca ex quâ Caſſavi fit.* Park. *Hiuca, s. Mizmaitl.* N[illegible]
Hiſp. Terent. *apud* Hernand. *Maniiba, & Manduba Braſilienſib; cujus radix Mandihoca,* Piſon. & Marcgr. *Yucca Braſiliana, & Americana, ſtellato folio, muci*[illegible] Monlingy.

2. *Melanacrodryon Arbor Americana, Prunifolia, baccas atramentarias proferens, ad ortum foliorum, ſpinulis barbata. Inkewood, & Inkeberry Barbadenſib; dicta.*

3. *Melanomma, et Melanoxylon. Arbor Laurifolia. Nucifera, gemmis nigricantib; Americana. Andira (forte) s Angelina Piſonis. Black-bud. & Black-wood Barb*[illegible] *denſib; dicta.*

4. *Mercurialis Maderaspatenſis, tricoccos, acetabulis deſtituta. forte Pee-Cupameni Hort. Malab. P. 10.*

5. *Muſcus terreſtris, repens, clavis ſingularibus, folioſis, erectis. Raij. Hiſt. Pl. 121.*

6. *Muſcus ceranoides albus, fungoſus, apicibus nigris.*

7. *Myoſotis, foliis ſubrotundis, herba, Indiæ Orientalis.*



.CCVI.

1. *Myagrum monoſpermum minus* CBP. Park. 826. *an Myagro ſimilis flore albo.* IB. *tom.* 2.

Myrrhis Cicutaria. Tabern. Ic. 98. *Cicutaria bulboſa* CBP. *Bulbocaſtanum coniophyllon.* Camerar.

Naſturtium Alpinum inſipidum. CBP. *Cardamine Alpina inſipida,* Columm. *rectiùs tamen, Braſſica Alpina ſpuria, folijs Burſæ paſtoris inſipida.*

Naſturtium petræum, annuum, noſtras. an potiùs Thlaſpeos. genus, circa Briſtoliam. an Naſturt. petræum folijs Burſæ paſtoris CBP. *Naſturt. petræum* Tabern.

Negundo mas Garciæ, & Acoſtæ. *Negundo arbor mas, & fœmina* IB. *Frutex Indicus baccifer, fructu calyculato, monopyreno, Negundo dicta,* Raij. Hiſt. *Pl. Pyr.* *ſimilis, Fructus ſtriatus.* CBP. *Bemnosi* Hort. Malab.

Ilex, aut potiùs Olea, Laurino folio, Portoricenſi, ſummo margine, crenato. nomine Amygdali Braſiliani, à Cl. Herm. aliquando recepta, ut audio huc fortè ſpectat Kari-vetti Hort. Mal.

P4



Tab.CCVII.

fig. 1 Nerium Americanum maximum folio obtuso P.B. Prod. an Nerium Americ. lacteſcens, longiſſimo folio, flore albo, odoratiſſimo Hort. Beaum. in Hort. Reg. Hamp. succreſcit.

2. Nerio affinis Barbadensis Arbor latifolia, flore purpureo, Jasmini odore; Jeſſemye-Tree, Nostratibus dicta.

3. Nerio affinis, angustifolia lacteſcens, flore luteo, Americana.

4. Nux Americana, costâ foliorum appendicibus auctâ. Nux Americana folijs alatis bifidis; Krippa. PBP.

5. Nymphæa Maderaspatana, Nasturtij Indici scutato folio, solidiori, venis atris, pediculo spinulis asperato.

6. Nymphæa minima Maderaspatana, folijs alas Papilionum, referentibus. huic forte Haij-alem-el-maovi, e. Sempervivum aquatium. Pr. Alpini, & Stratiot: Ægyptia. Dioscoridis. Veslingij in Not. ad Alpin. de Pl. Ægypt. 44. utramq; ē Collectaneis du Boiſianis accepimus.



Tab. CCVIII.

fig. 1. Nux Veſicaria Oleoſa, foliis umbilicatis, ex Inſulâ Barbadenſi, Nux Zeylanica, umbilicatis foliis. Hort. Beaum. Arbuſcula exotica, foliis umbilicatis, nuculam, nuculæ Indicæ Sonaræ IB. ſimilem ferens. Breyn. Prodr. 2. Althæa arborea Indica, folio, umbilico rubente. PBP. Jacke in a boxe, noſtratibus dicta.

2. Nux Portoricenſis, ampliſſimis foliis, venoſis, & latè virentibus.

3. Nux Zeylanica folio multifido, digitato, flore merdam olente, Telabo Zeylanenſium Parad. Batav. Prodr.

4. Ocimum Maderaſpatanum, fruteſcens, gratiſſimi odoris, flore parvo, cauliculis villoſis. an Ocimum fruteſcens perenne flore parvo. Breynii. Prodr. 2. forte etiam Xicoxihoitl. Nov. Hiſp. Terentii. apud Recchum. an Herba Cidreira Luſitanis Marcgr. 32.

5. Ocimum odoratiſſimum, calycibus, ad verticillas deorſum tendentibus, absq; petiolis, è Maderaſpatan.

TAB. CCIX.



Tab. CCIX.

Fig. 1. *Nux moschata fructu rotundo.* CBP. *Nux aromatica fœmina* IB. *Nux Myristica.* Matthioli. *hujus fructus, cortice denso, ut in nostris nucibus, tegitur; cui alter tenuior, reticulatus, rubescens subest, qui Macis dicitur.*

2. *Nymphæa Indica minor floribus cum petiolis, ex foliorum pediculis naſcentibus. à D. du* Bois *communicata.*

3. *Olea ſylvestris Barbadensium, folio anguſto pingui, leviter crenato. hujus Arbor gummi instar Elemi (ut audio) fundit.*

4. *Orleana, s. Orellana, s. Urucu* Marcgr. v. Piſon. *Orleana. s. Orellana, folliculis lappaceis.* Hort. Lugd. Bat. *Achiotl, s. Medicina tingendo apta.* Hernan. Hist. Mexic.

5. *Orobanche Verbasculi odore.* D. Plot. Hiſt. Nat. Oxon.

6. *Orobanche Virginiana, radice fibroſâ, summo caule, foliis subrotundis,*

7. *Orobanche Virginiana, flore pentapetalo, cernuo. D. Baniſter.* Cat. Mſſ.



Tab. CCX.
Fig. 1. Ophioxylum Americanum, folijs oblongis, mucronatis, leviter serratis, Bardanæ instar subtus lanuginosis. Lignum Colubrinum, Barba=densium. Snakewood ibi nuncupatum.
2. Orobus Pyrenaicus, latifolius, nervosus. Schol. Botan. p. 242.
3. Paſſiflora s. Flos Paſſionis Curaſſavicus, folio glabro, trilobato, & angusto, flore flavescente omnium minimo. PBP. in Hort. Reg. Hampton. hujus speciei cortice admodum fungoso prædita est.
4. Paſſifloræ affinis, Hederæ folio, Americana. Nhandir-Oba Brasiliensib. Pisonis. an Planta Scandens, hederaceis folijs Zeylanic. Breynij. Eph. Germ. Ann. 4. & 5. Obs. 137. forte Hedera folijs Guineensis fruticosa scandens capreolis. Hort. Beaumont. p. 24.
5. Pentaphylloides erectum luteum, Alchimillæ Alpinæ effigie, quinis folijs incanis, ad summitates trifidis.
6. Pentaphylloid. fruticosum, Alpinum, argenteis folijs flore purpureo. trifoliatum. Trifolium argenteum Alpinum Ponæ Ital. Trifolium Alpinum argen=teum Persici flore. CBP.
7. Persicaria Maderaspatana, longiore folio, hirsuto. forte Belutta-Modela-mucu Hort. Malab. P. 10. forte etiam Potinzoba Brasiliensium. Pisonis.



Tab.CCXI.
fig.1 *Orobanche Autumnalis, Virginiana radice dentatâ* D. Baniſter.
2 *Orobanche Verna radice dentatâ Virginienſis.* D. Baniſter.
3 *Paſſiflora arborea Laurinis folijs Americana. Cucumis. Flos Paſſionis dictus Quajavas folio majori.* Hort. Lugd. *Clematis Americana, Digitalis flore ſiliquoſa, monophyllos major.* PBP. *an verius. Murucuia 4.ª Barbadenſibus.* Piſonis.
4 *Periclymeni ſimilis, Myrtifolia arbor Maderaspatenſis; Nirs-Notſjil fortè Malabarorum cognata; è Viridario ſicco* du Boiſiano *accepimus.* in Hort. Reg. Hampton. *Arbuſculam pulcherrimam humana altitudine obſervavimus.*
5 *Phaſeolus arboreus, tetraphyllos Zeylanicus.* Horti. Reg. Hampton.
6 *Phaſeolus Novi Orbis, Faba purgatrix latiſſima cordis figurâ.* IB. *tom. 2. Fabæs. Phaſeoli purgantes* Park. *Faba purgatrix latiſſima e Inſulâ* D. *Thomæ.* CBP. *Cor S.ti Thomæ, & Phaſeolus major, fabæ purgatricis nomine miſſus,* Cluſ. Comment. ad. Monard.
7 *Phaſeolo D. Thomæ quodammodò accedens, Frutex ſpinoſus. Hort. Reg. Hamp. an Cytiſo quodammodò affinis arbor quadrifolia ſpinoſa, Americana flore luteo odorato, ſiliquâ, planâ membranaceâ per medium planitierum ſecundùm longitudinem (Serræ leguminoſæ in modum) ſeſe operiente: Breyn. Prodr. 2*



Tab. CCXII.

fig. 1 *Paſſiflora non crenata, Americana, triphylla.* ex Codice Bentingiano.

2. *Pentaphyllum paluſtre rubrum, craſſis, & villoſis folijs Suecicum, v. Hibernicum. hujus exemplar ex Sueviâ ſibi allatum. nobis dedit* Reverend. D. Stoneſtreet *quod etiam Ornatiſſimus Vir D. Gideon.* Bonavert *ex Hiberniâ (quâ invenit) rediens, nobis amiciſſimè communicavit.*

3. *Pentaphylloides fruticoſum minimum procumbens, flore luteo, folijs ſericeis Fragariæ ternis. Fragariæ affinis ſericea incana.* CBP. *Fragaria sterilis ſylveſtris, ſericea, ſ. incana* Moriſon. Hiſt. 2. *Incana Pentaphylli effigie, an Leucas Dioſcoridis.* Adv. Lob. *Pentaphylli effigies. Leucas quibuſdam.* I.B. *tom. 2. forte Fragaria Helvetica nana.* Park.

4. *Periclymenum Americanum, è cujus radice fit Atramentum. Lauri facie Curaſſavica, è cujus radice Atramentum conficiunt Americani.* PBP.

5. *Periclymenum ſur-rectum Perſicæ folijs Maderaſpatanum. forte Itti-Canni.* Hort. Mal. *P. 7.*

6. *Periclymenum Zeylanic. herbaceum folijs variegatis diverſicoloribus maculis ornatis.* PBP. *Clematis Indica folio Perſicæ, fructu Periclymeni* CBP. *Lignum Colubrinum* Garciæ ab Hort. *ex ejuſdem ſententiâ Ekaverija Zeylanenſium. an Tſjudemaraam.* Hort. Mal. *P. 6.*

7. *Petaſites minor folio Tuſſilaginis.* Hort. Bleſ. *Petaſites minor alter Tuſſilaginis folio.* HRP. *pag. 139.*



Tab.CCXIII.
fig.1. Periclymenum hirſutum folijs Quernis ex albo, viridi, et luteo, eleganter adumbratis. Periclymenum perfoliatum, folio variegato D. Mares ant. Hort. Lugd. app. Periclymenum folijs ſinuatis, variegatis, & hirſutis Ray. Hiſt. app. in Horto. Comptoniano colitur.
2. Phaſeolus Americanus fruteſcens, folijs glabris, lobis pluribus, villoſis, pungentibus fructu orbiculari, plano, hilo nigro, tanquam annulo, totum fere ambiente; Mucuna Braſilienſibus Maregr. & Piſon. Phaſeolus Braſilianus Macouna dictus Cluſ. ad Monard. item Phaſeolus Nigritarum Cluſ exot. Phaſeolus Nigritarum colore fuſco IB. tom. 2. forte etiam Phaſeolus Braſilianus Multis, ſpadiceus magnus, cum magno hilo nigro plurimum ambiente ejusd IB. ibidem. Noſtratib; Oxe-eye nuncupatur. huc ſpectat Kaku-valli Hort. Mal. P.8. quod forte, idem cum Lobo peregrino cartilagineo. Cluſ. exot. lib.3.
3. Phaſeolus erectus incanus ſiliquis toroſis Kayan dictus. Cajan arbor India folijs Trifolij bituminoſi ſiliquis Orobi Breyn. Prod. 1. forte Arbor trifolia, Indica IB. tom. 2. Thora Paërou. Hort. Malab. P.6. Anagyris Indica leguminoſa ſiliquis toroſis. PBP. Kajan s. Katsjan Zeylanenſibus. Lak-Goetum Chinenſibus, & a Barbadenſibus Noſtratibus Pigeon-Pea (ie) Piſum Columbarium nominatur.
4. Phaſeolus Maderaſpatanus Caplab effigie flore parvo ochro-leuco, ſiliquis falcatis gemellis.
5. Phaſeolus arboreus è Maderaſpatan folio parvo molli & incano, flore unico coccineo.
6. Phaſeolus arboreus è Maderaſpatan, folio parvo glabro, floribus binis venuſte rubellis. ex viridario ſicco du Boiſiane Impertivimus.



Tab.CCXIV.

fig.1. *Phas. Amer. fol. molli lanugine obſitis, siliq. plur. im. hirſutie pungentibus, ſemine fuſco, punctato. planè diverſâ est hæc Phaſeoli genus, à Zuratensi Ind. Or. s. Nai-Corana* H.M. *P.8. cujus ſemina perpetuò ſunt atro-nitentia, et propterea ab hoc noſtro ſeperandus. Couhage vulgò.*

2. *Ph. ſubhirſutus Americ. exitioſus, ſiliquis longis cauliculis, inſidentibus. fortè Guaiana-Timbo Braſilienſib.* Piſon. *Barbadenſib. Kil-wench. et quibus Fuddle-fiſhe nuncupatur.*

3. *Phaſeolus Maderaspatanus foliis glabris trilobatis, floribus exiguis, longis petiolis ex eodem puncto gemellis.*

4. *Ph. alatus Arbor ſiliquoſa Juglandis folio Braſilianus lobo longiſſ. Acaciæ ſiliquæ instar diſtincto* CBP. *Lobus Braſilianus ingens Acaciæ formâ* JB. *tom.1. an Perim-Kaſuvalli.* HM. *P.8. Phas. alat. Ind. fructu fuſco, orbiculato, max. lobis latiſſ. & longiſſ.* H.Ac.Lugd.

5. *Ph. arboreus alat. volubilis & maj. Ind. Or. fructu coccineo, hilo, nigro, notato. Phas. Ind. ruber* Bonly. *Piſum Ind. minus coccineum.* CBP. *Abrus* Alpin. *de Pl. Ægypt. Arachus Ind. s. Africanus* Park. *Konni.* HM. *P.8. Glycyrrhiza Ind. ſiliquis, & ſeminibus Piſi coccineis, hilo nigro notatis.* PBP.

6. *Ph. alat. min. Americ. Glycyrrhizæ ſapore, ſiliquis Orobi, ſeminibus nigris, hilo coccineo notatis. Liquorice Tree (ie) Glycyrrhiza arbor* Jamaicenſibus *et ejus ſemina* Monkey-berryes *Barbadenſibus nuncupantur.*



Tab. CCXV.
Fig. 1. Phyteuôides Americanum flore albo tetrapetalo, staminibus referto, fol. & ramulis per intervalla ternis. Jamaicensibus Sweetweed dictum. forte Tupeicava Braſilienſ. s. Scoparia. Piſon. Basourinha Luſitanis. ubi licet tota plantu manifeſto ſapore & odore carere deſcribitur, ut et noſtra, ex uſu tamen ipſius, hunc titulum noſtratibus adeptum mereri videatur, cum intelligam, quod ſcopas ex eâ conficiunt Americani, quibus ædes verrere ſolent; quisquilias, & ſordes evertunt, & hoc modo omnia sua, nitidè et odore conſervant. & inde forsan ratio nominis.
2. Piper frutex Americ. ſpicâ longâ gracili; Nhandu Braſilienſ Piſonis. Amalago. H. M. P. 7. Piper ex Floridâ. IB. tom. 2. Planta peregrina Cluſ. exot. Pimienta dos Indios à Luſitanis, vulgò. an Tlatlancuaye Nov. Hisp. Hern. & Nieremb.
3. Planta siliquosa bivalvis, unica. ſularis ſiliquis in plurimos ramulos falcatos diffuſis, Crithmi marini ſapore [illegible] mentiendo. è Madera [illegible]
4. Plantaginis Stellatæ folio, florum ſpicâ ex utriculo caulis erumpente. huic capſula à Phillo mari Ind. [illegible] haud diſpares.
5. Pneumato xylum Arbor baccifera calyculata, tetrapyrena alatis foliis, Americ. Barbadensib. Spirit-wood. vocata.
6. Portulaca Americ. latifolia, lanugine obducta, longioribus aculeis horrida.



Tab.ccxvi
fig.1. Portulaca Curaſſavica, anguſto, longo, lucidoq, folio, procumbens, floribus albis. H.R. Hampt.
2. Portulaca, an potius Telephium Africanum, flore aurantiaco. è Cod. Bentingiano.
3. Portulacæ similis, Planta Ind. Orient. an Bremi Malabarorum HM. P.10. Glaux Indica, Portulacæ folio, fl. majore, dilute cæruleo albicante colore. Commel. in Not.
4. Potamogeiton fluviale, Sargazo ſimile lucens, foliis margine dentatis. Fluviatilis Piſana, foliis denticulatis. IB. tom. 3.
5. Potamogeiton maritimum grandiuſculis capitulis; folio capillaceo noſtras forte Potam. puſillum marit. folio gramineo Raij. Synops. an Potam. minim. capillac. fol. CBP. & Prodr. Potamog. puſill. fluitans. Boccon. p. 42.
6. Prunus Zeylanica, ſpinoſa, longiori folio viridi, fructus oſſiculo orbiculari ſcrobiculis referto. HP.H.
7. Pr. sylv. Virginiana, fructu luteo rubello, acerbo, vix eduli, Oſſiculo lato & compreſſo. an Mecazocotl. s. Prunus Cerinus Nieremb. 318. Mecazochotli Hernand. 384. Pr. Curaſſav. Mucaxa dicta. PBP.
8. Prun. sylveſtr. cortice albicante punctatis foliis Americana. White Plumme Barbadenſibus dicta.

TAB. CCXVII.



Tab. CCXVII.

fig. 1 Prunus ſylv. Inſulæ Barbados Myrtifolia, fructu acerbo, & nigrato ſapore.
2. Prunus Sebeſtena Matth. Hiſt. Lugd. Sebeſtena domeſtica ſubrotund. foliis, an Ομυξα ʒis. Athenæi. C.B.P. Sebeſten domeſtica. Pr. Alp. de Pl. Ægypt. Myxa domeſtica s. Sebeſten. I.B. tom. 1.
3. Prun. Sebeſtena longiori folio Maderaſpatenſis. Sebeſtena ſylv. C.B.P. Sebeſten ſylv. Pr. Alp. Vidi [illegible] H.M. P. 4. Prun. Malabarica fructu racemoſo calyce excepto Ray. Hiſt. an Igli arbor de Inſula Solar. Zanon [illegible] Bol.
4. Prunifera Fago ſimilis arbor, Gummi Elemi fundens, figura [illegible] Ilva ex Inſula Barbadenſi. an Iucaraba Braſilienſium. Piſon. [illegible] in hujus Officulum Veneris immunda verenda à Natura penicillo figurantur.
5. Prunifera vel Nucifera, s. Nuci-prunifera arbor Americana procera, angustis Laurifoliis, late virentibus. Maſtichen odoratam fundens. [illegible] arbor Barbadenſium Ligonis. an Jambolonifera Garc. Jambolani. Acoſt. Hiſt. Arom.
6. Prunifera s. Nuci-prunifera arbor Americana Lauri ſubrotund. [illegible] foliis, apicibus tantum mucronatis, Damaſon-Tree Barbadenſibus dicta. Iqciya forte de Laet. lib. 17.
7. Prunif. s. Nuci-prunifera, fructu Saponario, orbiculato, monococco nigro, America [illegible] Braſilienſis Piſon. Jequitinguaçu arbor Laet. Ind. Occ. lib. 15. forte Nebo Arabum & Coral Precarium apud Igleſium [illegible]



Tab. CCXVIII.
fig.1. *Prunifera arbor. s. Nuci-prunifera, folio dodrantali longitudine, lævi mollitie prædito: Barbadenſib. Bully Bay nuncupatur forte Katou Tsjeroos.* ...
2. *Prunus Javanica Atriplicis foliis.* Commelin. *Kakousa* Iavanis. H. Beaum. *Elenn. ...æ noſtræ* Sherardinæ *Phytogr. Tab. 173. exhibitæ, quam proxime accedere* ...
3. *Prunus Americanus oſſiculo magno ex filamentis lignoſis reticulatim conflato.* Gul. Hughes. p. 88. *Acaja Braſilienſ.* Piſon. *Acajá quæ* ...
Braſilienſibus. Marcgr. *Prunus Braſilienſis fructu racemoſo, ligno intus pro oſſiculo.* Raij. Hiſt.
4. *Prunus pentaphyllos. Malabarica fructu calyci inſidente.* Raij. Hiſt. *Kar...* Hort. Mal. P. 4.
5. *Pruno ſylveſtri affinis Canadenſis* C.B.P. app. *Hypericum fruteſc. Americanum flore albo* Park. Theatr. 576.
6. *Rhamnus forte, s. Arbuſcula ſpinoſa. Evonymi foliis, ſpinis ſingularibus Virginiana ab amiciſſimo Viro & Pharmacopæo Londinenſi peritiſſ.* D^{r}. Charlwood ...
7. *Rhamnus forte, s. Arbuſcula ſpinoſa Evonymi folio, ſpinis gemellis Maderaspatana.*



Tab.CCXIX.

fig.1 Ptarmica Virginiana Scabioſæ Auſtriacæ, folijs, indiſſectis. accuratior Icon quam in Phytogr. Tab. 53. exhibere curavimus.

2. Ptarmicæ Virginianæ ſimilis, Planta Americana, floribus ſparſis, hexapetalis. ex Cod. Bendingiano.

3. Reseda latifolia minor Alpina, flore albo flaveſcente. forte Reseda latifolia flore flavo Moris. H. Bleſ. forte etiam Sedum tridactylites Alpinum, pallente luteum &c.

4. Rhamnus Maderaspatanus, folijs pendulis, ſpinis longioribus nudis.

5. Rhamn: Maderasp. dependentibus folijs, ſpinis longiſſimis folioſis.

6. Rhus Africanum trifoliatum majus folijs ſubtus argenteis, dentis, & margine inciſis.

7. R hus Afric. trifoliatum majus, folijs obtuſis, & inciſis, hirſutie pubeſcentibus.

8. R hus Afr. trifoliat. majus folio ſubrotundo integro, molli & incano.

9. R hus Afric. trifoliat. minus glabrum, ſplendente folio ſubrotundo integro. forte Lentiſcus Africana triphyllos quorundam.



Tab. CCX[illegible]
fig. 1 R[illegible]labaricæ Mail-anschi dictæ similis ē Maderaspatan. de quâ vid. HM. P. 2.
2 Ricinus asperior Alceæ Venetæ foliis aliquatenus accedens Maderaspatensis. ex Herbario Vivo du Boiſiano.
3 Ricinus lactescens, Fici foliis, spinulis mordacibus armatus. D. Banist. Ricinus Tithymaloides Americanus lactescens, & urens, floribus albis. PBP. Frutex innominatus purgens, & urens. Marcgr. Brancamos Lusitanis.
4 Ricin. Maderaspatan. fl. purpureo, trilobato folio, mitibus denticulis, crenato. an Ricin. American. lactescens trilobato folio, perennis flore nigricante. H. Beaum.
5 Ricin. dulcis, arborescens American. Populneâ fronde argenteâ s. foliis Populi nigræ argenteis. Breyn. Prod. 2. Ricini fructu Arbor Curassavica, foliis [illegible] argenteis Zeylanic. [illegible]
6 Ricophora Indica Bryoniæ nigræ similis, ad foliorum exortum verrucosa. HRH. forte Kalu-Katsjil. HM. P. 7.
7 Sagittariæ foliis Planta glomerato fructu, [illegible] Coriandri fere figura, Ricopho[illegible] forte generis ē Maderaspatan.
8 Sagittariæ quodammodo similis, Planta Maderaspatana, floribus medio caule, quasi ex utriculo prorumpentibus, ex Herbario Vivo du Boiſiano.



Tab. CCXXI.

fig. 1. *Salix arbor folliculifera, obtuſis folijs candicantibus, Americana White-Willow, Barbadenſibus dicta.*

2. *Salix arbor folliculifera tetraphyllos lucidè atrovirentibus, acutis folijs, Americana, blacke Sallow, Barbadenſibus vulgò.*

3. *Salvia Barbadenſibus dicta spicâ florum compactiori.*

4. *Salvifolia Arbor Orientalis, folijs tenuiſſimè crenatis.*

5. *Sambucus humilis s. Ebulus exotica Marrubij aquatic. laciniatis folijs H. Pat. à D. Doody accepimus.*

6. *Sambucus Barbadenſibus dicta, folijs subincanis, fortè Aninga Peri Braſilienſibus. Piſon. p. 218. fortè etiam Xumail Mexicenſibus. s. Sambucus* Hernand. *lib. 3. c. 81.*

7. *Scabiosa Graminifolia nudicaulis, capitulis argenteis s. Statice minima Maderaspatana, ex Herbario Vivo du Boiſiano.*



Tab. CCXXII.

fig. 1. *Sanicula montana crenata, folio longiore, pediculo folioso.* Schol. Bot. pag. 27.

2. *Sanicula Alpina, s. Sedum Alpin. 3.*[m] *Fr. Gregor. Rhegiens.* Column. *secunda varietas.*

3. *Sanicula Alpin. s. Sedum tridactylites Alpin. majus album.* CBP. *Saxifraga petræa* Ponæ.

4. *Sanicula Myosotis floribus albicantibus ferè umbellatis.* Phytogr. *Tab. 58. felicior Icon.*

5. *Sanicula Virginienſis albæ folio oblongo mucronato.* Phytogr. *Icon accuratior.*

6. *Saſſafras arbor Monardi* Hist. Lugd. *Saſſafras s. Lignum Pavanum* IB. *tom. 1. Arbor ex Floridâ Ficulneo folio.* CBP. *Anhuiba Brasiliensium s. Saſſafras* Pison.

7. *Scabiosa affinis, Chrysanthemi facie, Lamij folijs Americana. Archangel Barbadensibus dicta.*

8. *Scortea arbor Americana, ampliſſimis folijs, aversâ parte nervis extantibus hirsutie ferrugineâ refertis. Leathercoat-Tree Barbadensibus nostris.*



Tab. CCXXIII.

fig. 1. Sedum Africanum teretifolium, flore Hemerocalidis. è Codice Compton.

2. Sedum petræum teretifolium Virginianum D. Banister.

3. Sena humilis Americana foliis herbæ Mimosæ, siliquis erectis. à Chamæ cristâ Pavonis Americana siliquâ multiplici Breyniana admodùm diversa

4. Senecio fœtidus Africanus perennis, foliis confertim nascentibus D. Syen. Conyza Africana Senecionis flore, retusis foliis H. Ac. Lugd an Conyza Melitensis retusis foliis Boccon.

5. Senecio perennis latiori folio. Prom. Bon. Spei. quo loco ad se miſſum nobis communicavit D. Doody.

6. Sideroxylum Africanum, s. Lignum ferreâ duritie folio oblongo, Lignum ferreum vulgò. PBP. in Hort. Reg. Hampt. colitur.

7 Siler Aquilegiæ foliis Moris. Umbel. 7. u. 8. Libanotis latifolia, Aquilegiæ foliis CBP. Ligusticum Rawolfii foliis Aquilegiæ. IB. tom. 3.



Tab. CCXXIV.

fig. 1. Sideritidis facie Thlaspi [illegible] binis serratis, Fructu [illegible] in medium [illegible] circulari utrinq. [illegible], septo membranaceo intergerino di[illegible]. e Malab.

2. Sideroxylum Americ[illegible] [illegible] Ironwood Barbadensibus dictum Ligon p. 74. forte Ibera-Putrana Brasilien. Marcgr.

3 Sinapi[illegible] Indicum triphyllum [illegible] foliis. e Maderaspatan.

4. Sisyrinchium African. flo. [illegible] aur[illegible]. forte Sisyrinchium flore aureo Æthiopicum PBP.

5. Sisyrinchium African. fl. [illegible] obsoleti coloris. forte Sisyrinch. Æthiopic. flore pentapetalo obsoleto. PBP.

6. Sisyrinchium Zeylanicum flore caeruleo, parvo, gramineis folijs. PBP. ex Cod. Benting.

7 Sisyrinchium African. tricolor, caule nodoso angustifolium ex Cod. Compt.

8. Sisyrinchium biperatum Capitis. Bon. Spei. e Cod. Comptoniano.

TAB. CCXXV.



[Ta]b. CCXXV.

1. *Siſyrrichium African. trianthophorum* ē Codice Compton.

2. *Siſyrrichium minus polyanthemum flore parvo luteo, radijs aurantijs (seu phœniceo-aureis) elegantiſſimè Striato.* Capit. Bon. *Spei. Breyn.* *Prod. 2. hanc lepidiſſimam plantulam in Hortulo* Dn Doody, *diu florentem summâ cum voluptate conspeximus.*

3. *Smilax claviculata Hederæ folia, tota levis ē Terrâ Marianâ.*

4. *Solanum racemosum Americanum.* Raij Hist. *Solanum racemosū tinctoriū, Americ. folijs & seminib. Amaranthi.* H. Ac. Lugd. *Solan. magnum Virginianum rubrum* Park. *forte Guechilit Tomatl Mexicensib.* Hernand. *Pocan Virginiensib. ex monitu. Cl. D.^ris^* Lister.

5. *Solanum Spiniferum frutescens, spinis igneis Americanum. forte Huitz-Tomatzin, s. Tomalspinosa* Hernand. 108. *nostri tamen ramulus imâ tantum parte spinosus evadit, supernâ mitis est.*

6. *Solanum American. perenne subincanum fructu Pyriformi longiore, spinis plurimis armatum.*

TAB. CCXXVI.



Tab. ccxxvi.
fig. 1. *Solanum Barbadense spinosum, foliis villosis, fructu aureo rotundiore, Pyri parvi inversi formâ et magnitudine. an Cucurbitacei generis, Fructus peregrinus, à Francisco Penitzio missus. Clus. exot. Fructus Indicus Pyriformis grandis intus nigris Cucurbitini generis* I.B. *huc fortè etiam spectat. Tlalamatl. Noo Hispaniæ Terentij apud* Recch.

2. *Solanum pomiferum, fructu incurvo.* C.B.P. *Curbi Solanum* Princ. Frid. Cæsij. *in Tab. Phytoscop. quoddi Melongena vulgò, (i.e.) Nila-barudena Malabarorum.* H.M. P.^{io} *specie non differt. illius est tantum varietas. Pollijon Hortulanis nostratibus dictum.*


3. *Solanum pomiferum magno fructu, ex albo & atropurpureo nitente, foliis & calyce spinosis Solanum pomiferum fructu nigro spinosum* C.B.P. *Solani species Fockij. dicta Javanensibus.* Bontij. 123. *Melantz, ana nigra* Rawolf. Hist. Lugd. *Brounjolly nostratibus vulgò.*

4. *Solanum pomiferum fructu rotundo striato duro* C.B.P. *Mala Æthiopica.* Dod.

5. *Solanum pomiferū frutescens Afric. spinosū nigricans foliis profundè laciniatis* H. Ac. Lugd. *Solan. spinosum arborescens. Cap. Bon. Spei.* Breyn. Fascic. 25.

6. *Solanum Zeylanic. spinosum, folio amplo incano, ad pediculum strictiori. fortè Solanum spinosum pomiferum Indicum album, s. foliis Hyosciami albi majoris* Breyn. Prodr. 1.

7. *Solanum bacciferum Americanum fructu corymboso, ex Insulâ Jamaicensi.*



Tab. CCXXVII.

fig. 1 *Solanum mordens s. Capsicum latifolium, Mali Æthiopici fructu magno, striato, compreſſo, Americanum, Bonnet Pepper Barbadensibus vulgo.*

2 *Solanum Indicum Laurinis angustioribus folijs maximum.* Hort. Reg. Hampt. *ubi datur et hujus speciei altera multo latioribus folijs ex America.*

3. *Sonchus levis Maderaspatanus, forte Muel-Schevij.* HM. *P.* 10.

4 *Symphytum maculosum s. Pulmonaria maxima, folijs quasi Saccharo incrustatis. an Symphytum Alpinum latifolium maculatum asperius, flore caeruleo* HRP.

5. *Symphytum non maculatum asperius perelegans, flore multiplici.*

6. *Symphytum s. Pulmonaria non maculata folijs glabris Americanum flore pallido caeruleo.*

7. *Symphytum minimum Acini folijs bijugis Maderaspatanum.*

8. *Syringa Babylonica indivisis densioribus folijs confertis & minus acutis. sub Ligustri Orientalis titulo in Horto Patavino; siccis hanc [illegible].*



Tab. CCXXVIII.

Fig. 1 *Syringa ſcandens Maderaſpatana Fraxini folijs denſioribus, claviculis donata.*

2 *Tacamahaca folijs crenatis, Sadelhouts. Lignum ad ephippia conficienda aptum* PBP. *Tecomahaca Mexic.* Hern. *an Tacamahac. Populo ſimilis fructu colore Pæoniæ* IB. *Arbor Populo ſimilis reſinoſa altera.* CBP. *a Prom.* Bon. Spei. *accepimus, viv in* HRH. *antea collegimus.*

3. *Telephium max. Africanum flore aurantiaco.* ex Cod. Benting.

4 *Teucrij folijs Frutex Curaſſavicus.* PBP. *Teucrio ſimilis Indica fruticoſa, folijs craſſiuſculis.* H. Beaum.

5. *Teucrium latiori folio villoſiſſimum, calyce ampliori e Maderaſpatan.*

6 *Therebinthus Americ. polyphylla, Palamalatta dicta.* PBP.

7. *Therebinthus Americ. Sorbi aucupariæ folijs, rachi medio appendicibus alato. Arbor Americ. reſinoſa, folijs ad Roſarum folia accedentibus* H[illegible]

8. *Thlaſpi Chalepenſe Linariæ folijs ſiliculis hirſutis.*

9. *Thymelæa Afric. Sanamundæ facie, Ericæ fol. anguſtiſſ.* PBP. *item Erica Afr. arboreſc. Coris fol. fl. flaveſc. ejusd.* PBP. *in* HRH. *collegimus*



Tab. CCXXIX.

fig. 1. Therebinth. Americ. trifolia lucida, Palamalatta vulgò. PBP. *an Myrvala* H. M. p. 3. *Pomifera Indica trifol. fructu Pruni-fol. caudato Raij. forte Tapia Brasiliens.* [illegible]

2. Thymelæa Alpina glabra floribus albis ſubluteis ad foliorum ortum ſeſſilibus an Sanamunda glabra IB. *tom. 1. Thymelæa, fol. Polygalæ glabris.* CBP.

3. Thymelæa incana Menorei fol. & facie, ſurculis admodum fragilibus. Thym. quædam incana Genevenſis Raij. *Est proxima huic, ſi non eadem est Chamæl.* [illegible] *Alp. folio inferne incano.* CBP. *Chamælea hirſuta nomine data.* IB. *tom.* .. *Chamel.* [illegible] *incana* Adv. & Icon. Lob. Belluc. Ind. Pis.


4. *Thym. Capenſis ſericeis longioribus & acutis fol. caule geniculato piloſo. an Thym. Æthiopic. Paſſerinæ fol.* Br. Cent. 1.

5. *Thym. Capenſis Nepæ Theophr. fol. aculeatis, floribus parvo purpureo. forte Thymbra Afric. fol. spinos.* Barthol. Act. Med. *Polygala astragaloid. frutesc. Thymbræ facie & foliis flore minore purpur. fructu corniculato.* Cap. Bon. Sp. Br. Prodr. 2.

6. *Thym. capitata angusto Salicis fol.* Prom. Bon. Sp. *an Salix conophora angust. mucronat. fol. glabro.* PBP. *forte Frutex Æthiop. conifer fol. Cneori.* [illegible] *æmulus Br. Cent.* 1. *has tres nobiſſime recenſitas Thymelææ species D. Patricius* Adair *Vir Sane humaniſſ. & Rei Herbariæ callentiſſimus nobis amice* [illegible]

7. *Tithymalus marit. Barbadens. & Bermudens. s. Paralius minor American. ramoſiſſimus.* Milk-weed. *Bermudensib. vulgò.*

8. *Tithym. arbor American. Mali Medicæ fol. amplioribus tenuiſſime crenatis, succo maxime venenato. sub foliorum basi ad pediculum* [illegible] *(spinarum instar) nascuntur appendices. quod huic Arbori peculiare videtur. Tetlatia Mexic.* Nier emb. *Tetlatia arbor, urens. &* Hdilmis. *Guao* Hern. *Poyson Tree Barbadensib. vulgò. Aula Hamptonia in Plantarum rariorum ditiſſimo Hort. Reg. colleg. & ab Insula Barbadensi transmissam accepimus.*



Tab. [illegible]
fig. 1 [illegible] Germanici folijs, flore pallido. H. Amst. an Tithym. Monomotapens. Myrthifolijs angustiorib. floribus [illegible] H. Beaum [illegible] Trucalli H. M. p. 2. in H. R. eg. Hamp. succrescit.
2. [illegible] folius flore papilionaceo, coccineo parvo. PBP. ex Cod. Benting.
3. [illegible] foliis triphyllos floribus serratis. Massinilia sylvestris bulgò. PBP.
4. [illegible] PBP. an [illegible]-calli H. M. part. 2. in HRH. florens, insigne præbet Ornamentum.
5. [illegible] Afric. arboresc. [illegible] caule spinosus. ex Cod. Comp. Tithymali for [illegible] genus, Planta lactaria Afric. Pini fructuum facie. Br. P. [illegible] 2. [illegible] Tithym. Afr. arbor [illegible], & foliosus lactesc. et Euphorbium fundens s. Euphorbium Africanum arboresc. foliosum & spinosum H. Beau
6. [illegible] arbor Ame[illegible] ferens tetracapsularis singulis capsulis bina semina includentibus. Shagbarke Barbadensibus [illegible] eò quod dicta arbore, Cortex scabritie valdè asperatus est.
7. Trachylepos altera Americana folijs longis mucronatis.



Tab. ccxxxi.

fig. 1. *Tithym. African. spinosus, Cerei effigie ex* Cod. Compton *an Tithym. Afric. Mauritanic. aphyllos, angulosus & spinosus, ex quo Euphorbium Officinarum* F. Ad. Lugd. *Euphorbium.* Dod. Lob. CBP.

2. *Trifolium purpureum montanum adscendens glabrum dulci capitulo magno compresso crassiusculo. Trif. Glycyrrhizites.* Park. *Trifol. dulce montanum Monspeliense* Raji Hist.

3. *Trifol. Lagopoides majus hirsutum, capitulo brevi. Lagopus Hispanicus major.* Clus. Hist.

4. *Trifol. siliquosum rotundifolium glabrum, floribus luteis e Madera spatan.*

5 *Trifol. corniculatum minus, supinum & incanum siliqua singulari Madera spatanum.*

6. *Triticum Polonicum* H. Oxon. *ab ingeniosissimo Hortulano D. Harrison acceptimus.*

7. *Valeriana Alpina minor, planta palmaris.* CBP. *quoq. in Prod. an Montana Nardus.* Lob. Icon.

8. *Valeriana Alpina minima, planta ut plurimum Unciali & biunciali, ex H. Patavino collecta.*



Tab. CCXXXII.
fig. 1 Valeriana min. Cacaliæ folio D. Fagen. Schol. Botan. Valeriana Cacaliæ folio Alpina D. Fagon. Raj. Hiſt. app. in Horculo hilari cultiſſimo D. du Bois. ad Mitchamiam Vicum Agri Surrien. is collectam habuimus.
2. Valeriana Alpina parva Nardo Celticæ ſimilis inodora. Nardo Celtica ſimilis inodora. C.B.P. hanc in Baldo & Alpibus Sumano. conter minis legit Casp. Bauh. & monte Drawenſtein. Auſtriæ D. Burſerus collegit. & Valeriana Alpina parva latifolia titulo ad Bauhinum miſit.
3. Valeriana rubra anguſtis & longioribus folijs Valeriana rubra anguſtifolia IB. tom. 3. à Valeriana rubra anguſtifolia CB. Pin. & in Prod. deſcript. plurimum differt. Lychnidis rubræ Valeriana rubra dicta alterum genus oblongo & anguſto folio. CB. Phytop. an Valeriana marina anguſtifolia, s. minor rubra. Moris. Umbel.
4. Verbena nodiflora incana, Curaſſavica latifolia. PBP. Hort. Beaum.
5 Veronica Alpina frutians Serpylli maj. folio longiori. Veronica Alpina frutescens. CBP. Veronica ſaxatilis IB. t. 3. Veronica frutians. Cluſ. Park.
6. Veronica frutians Serpylli minoris folio circinato. forte Veronica Alpina minima Serpylli-folia Ponæ. Deſcr. Mont. Bald.
7. Veronicæ affinis Indiæ Orientalis Pulegij facie, calycibus tomentoſis.



Tab. ccxxxiii

fig. 1. *Veronica mas repens Pyrænaica folio longiori glabro.* Sch. Bot.

2. *Veronica s. Chamædrys ſpuria latifolia major, non ramoſa Pyrænaica,* Sch. Bot.

3. *Veronica petræa ſempervirens* Ponæ *ad Chamædryn vulgarem falſam accedens* I.B. t. 3. *Chamædrys Montis Summani. ejusd. ibid. Chamædrys Alpina saxatilis* CBP.

4. *Veronica pratensis Nummulariæ folio, flore cæruleo* Schol. Bot. *parum autem omnino differt à Betonica Pauli s. Veronica pratensi, Serpyllifolia* CBP.

5. *Viburnum Americanum odorat. Urticæ foliis latioribus, ſpinoſum floribus miniatis.* PBP. Horti. Reg. Hampt. *alumna.*

6. *Vicia peregrina anguſtiſſimis foliis, ſiliquâ latâ glabrâ. an Vicia anguſtifolia, purpuro-violacea, ſiliquâ latâ glabrâ* D. Magn. Bot. Mon. sp.

7. *Viola Alpina rotundifolia minor* Hort. Reg. Par. *Gramen Parnaſſi aliud.* Hist. Lugd.



Tab.CCXXXIV.
*fig.*1. *Viola rotundifolia montana major s. Pthoræ Valdenſium facie, floribus luteis, Viola Alpina rotundifolia lutea.* CBP. *Viola Martia lutea* IB. *tom.* 3.
2. *Viola cærulea maxima Cucumerinis hirſutis folijs Virginiana.*
3. *Viola Virginiana tricolor folijs multifidis cauliculo aphyllo.* D. Baniſt. *hujus Icon nimiis imperfecta cum Synonym. in Phytogr. Tab.* 114. *exhibetur.*
4. *Violæ surrectæ latiore folio, species peregrina. ex* Codice. Benling.
5. *Violæ surrectæ affinis Pinguiculæ facie* Prom. Bon. Spei. *ex* Cod. Comploniano.



Tab. CCXXXV.

Fig. 1 *Virga aurea, s. Solidago Saracenica latifolia serrata. Consolida Saracenica major* Hist. Lugd. *forte Virga aurea Solidago altera foliis minus ſpiſſis* H.Bleſ. *à Virgâ aureâ s. Solidagine Saracenica* IB. *plurimùm differt.*

2. *Virga aurea Limonii folio, panicula uno versu disposita.* H.R.P. & H.R.Bleſ. *an Virga aurea Mexicana Limonii folio.* Dodart. Mem. *Virga aurea Mexicana* CBP. app. 517.

3. *Virga aurea montana Scrophulariæ folio* Icon. ~~Robti~~. *an Virga aurea montana latiore folio glabro.* H.R.P.

4. *Virga aurea latiſſimo folio Canadensis glabra.* Schol. Botan.

5 *Virga aurea s. Solidago procerior Americana, caule multiplici. Solidago maxima.* Cornuti, 168.

6. *Virga aurea Americ. frutescens, glabra foliis subtùs cæsiis, comis ad summitatem in ramulos brachiatos, implicatis. an Tlalchichinoa Patlahoal Mexicensibus, s. Herba usta 3.ª* Hernand. 292.

7 *Virga aurea montana biuncialis pumila foliis acuminatis. an Virga aurea humilis, Alpina* Moris. Prælud. 323.

8. *Eadem foliorum apicibus obtusis.*



Tab. CCXXXVI.

fig. 1. *Virga aurea anguſtifol. paniculâ ſpecioſâ Canadenſis.* HRP. *Virga aurea fol. levib. non ſerratis.* HRB. *Virga aurea foliis anguſtiſſ.* [illegible] L[illegible]

2. *Virga aurea ſerratis foliis hirſutis Americana, forte Virga aurea Canadenſis* [illegible] *paniculâ minus ſpecioſâ* HRP.

3. *Vitis Idææ foliis & facie Linedanis flore Americana.*

4. *Vitis arbuſtina inſipida foliis in aculeum abeuntibus. Volubilis noſtras* [illegible] *Americana.*

5. *Ulmaria major trifolia,* [illegible] *Virginiana.* D. Baniſter.

6. *Volubilis* [illegible] *viticulis aſperis, foliis medio aculeatis* [illegible]

7. [illegible] *Barbadenſibus dicta.* [illegible] *Ordiem.* [illegible] *Oleo vulgo.* PBP. *item forte Sideroxylum, s. lignum ferreum* [illegible] *ejusd.* [illegible] *ago* [illegible] *de* L. *et* Ind. Occid. *forte Papyracea arbor* [illegible] *Hiſpanis* [illegible] *at* [illegible] Hist. gener. *Guaiabara in Inſula Hiſpaniola ex Oviedo.* Lugd. CBP. [illegible] D. Mund. Bioch. [illegible] *Inſula Hiſpaniola.* CBP. *Guiabara* [illegible] Hist. Lugd. [illegible] *ejusd.* H. L. *Populus rotundifolia Americana.* Park.



b. CCXXXVII.

T. 1. *Ulmifolia arbor Africana baccifera floribus purpureis. Ulmi facie arbuscula Æthiopica ramulis alatis floribus purpuraſcentib.* H. Beaum. *Ulmi facie arbor Curaſſavica.* PBP. *in HRH supremo vere efloruit & fructum tulit. & a Prom. Bon. Sp. ad D.* Patricium Adair *nuperrime allata est, qui & nobis amiciſſime obtulit. an Arbor foliis Ulm. Mexicanis Ayaquicuramo Tlacuilolquahuitl s. arbor picta; & Ocelolquahuitl s. Arbor Tigridis.* Nieremberg.

2. *Urtica racemosa maj. Virginian. mitior s. minus urens. Urtica racemosa Canadensis* Dodart Mem. *Pino Brasiliensib.* Piſon Marcgr. *forte Ana Schorigenam.* HM. p. 2.

3. *Utriaria vegetabilis Zeylonensium Bandura Cingalensib. dicta. Nepenthes Zeylanicum fl. minore.* Breyn. Pr. 2. *Planta mirabilis distillatoria.* Grim. Ep. Germ. *Priapus vegetabilis Monarchis.* Aman. Ch. Pl. *Bandura Cingalensium Gentianæ Indicæ species ejusd. ibid. Anramatiko.* Flak. deſcr. Inſ. Madag. Ogilb. deſcr. Afr. 685.

4. *Uvifera arbor Americana convolvulacea fructu punctato Barbadensibus Checquer-Grape (ie) Uva teſſulata nuncupatur. huic forte spectat Valli-Teregam.* HM. p. 3. *an Ficus arboresc. Afric. Lauri American. foliis majoribus fructu racemoso punctato.* H. Beaum.

5. *Uvifera arbor Americ. per funiculos e summis ramis ad terram usq. demiſſis prolifera. The Mangrove-Grape Barbadensibus dicta. an Nyalel* HM. p. 4. *Sambuci Indica* Bontij.

TAB. CCXXXVIII.



CCXXXVIII.

1. *Xyloboeion Arbor baccifera frondoſa Lauri pinguioribus folijs Americana. Beefwood (ie) Lignum bovinum Barbadenſibus dicta, forte Frutex innominatus 2. lignoſa ligno folijs ad Myrtifolia accedentibus* Marcgr. p. 82.

2. *Xylomaſtix arbor American. Whipwood (ie) Arbor flagellifera Barbadenſib. dicta, a Xylomaſtice noſtrâ, Erima-Tali. H.M. p. 7. haud multum abludit.*

3. *Xyloperiſteron s. Lignum Columbarium Coryli folio ſingulari, ſubtus lanuginoſo. Barbadenſib. Pidgeon-wood nuncupatur. hujus arbor Utriusq. India alum...*

4. *Xylopicron arbor Barbadenſibus. Bitter-wood (ie) Lignum amarum nominata. hæ 4 noviſſime recenſitæ Arbores cum multis alijs rarioribus ex Barbadoes Inſulâ in Angliam allatæ ſunt ab honeſtiſſimo viro Jacobo Reede, qui* Illuſtriſſimi Mecænatis *noſtri* Comitis Portlandiæ *mandatu, in Charibeas Inſulas plurie's ablegatus erat ad explorandum plantas nobiliores Hortum Regium Aulæ Hamptonienſis inſtruendas.*

5. *Zarzaparilla Virginienſib. noſtratibus dicta lobatis Umbelliferæ folijs Americana. an Herbatum Canadenſium, s. Ranaſes moſchatum* Corn. *huc pertinet. alijs judicandum relinquo.*

APPENDIX
AD
TERTIAM PARTEM
PHYTOGRAPHIÆ
LEONARDI PLUKENETIJ



Tab. CCXXXIX.

fig. 1 Xanthium spinosum Lusitanicum. PBP. appendice.

2. Xylocista arbor Americ. Xylosteo similis, ē cujus ligno Cistas vel strinia conficiunt Barbadenses nostrates, ā quibus Prince-wood, & Cabinet-wood nominatur. Periclymeni fo...

3. Zanthoxylum aculeatum Carpini folijs American. cortice cinereo. Tetaiba Marcgr. Fustick-wood Barbadensibus dictum.


4. Zanthoxylum aculeatum Fraxini sinuosis, & punctatis folijs, American. fructu Evonymi. Prickley Yellow-wood Barbadensibus dictum. &

interdum ā foliorum vi caustica, Pellitory of Spain Tree.

5. Zanthoxylum Pyrifolium, Stipite spinoso, Americanum. Arbor flava Herculis minor, the lesser yellow Hercules Barbadensibus nominatur.

6. Zanthoxyl. Americ. Herculis arbor aculeata major Juglandis folijs alternis partim sinuosis. Arbor flava Herculis major, the greater yellow

Tree Barbadensibus nostratibus dicta. in West-ind. H M. part. 5.



Tab. CCXL.

fig. 1 Alcea Bengalenſis Sabdariffæ ſimilis. ex Cod. Bentingiano.

2. Alchimilla alpina pubeſcens minor. HRP.

3. Alnus maritima Myrtifolia Coriarjorum. Button-wood Bermudenſibus vulgò. à D. Iacobo Petever *accepimus.*

4. Aloe Americana Ananæfolijs floribus ſuaverubentibus. ex Cod. Bentingian. *an Aloe Americ. ſerrata floribus coccineis.* PBP.

5 Althæa Maderaspatana Melochiæ anguſtis folijs, fructu ex alis foliorum pediculo curto.

6. Anona Americ. juxta Fluviorum ripas innaſcens &c River Pear Noſtratib. vulgò. hujus Iconem genuinam hoc loco adpingi curavimus, quæ enim pro eâ in Phytogr. Tab. 135. exhibetur, est revera Anona Americana folio ſplendente ex Verâ cruce. PBP. *v. ab hâc plurimum diverſa.*



Tab.CCXLI.

fig. 1 *Anonymus Maderaspatan. Senecionis Hieracii folio similis, spicâ foliaceâ & Hormini adinstar squamatâ, an Belutta-adecamaniseu. HM. p. 10.* *Amarantho affinis* Ind. Or. *spicatus capsularis.*


2. *Apocynum serrato Salicis folio Americanum. ex* Cod. Bentingian.

3. *Arbor Americ. Faginis foliis glabris, crenis rarioribus, p. marginem dentatis. ex Insulâ Barbadensi.*

4. *Arbor Zeylanic, Cotini foliis subtùs lanugine villosis, floribus albis, Cuculi modo laciniatis. Cl. viro D. Tancredo Robinson accepimus.*

5. *Arbor Americ. Salicis folio frondosa, Bermudensib. Birch-Tree (ie) Betula dicta. forte Sabsaf. Syrorum.* Rawolfij. *Hist. Lugd. app. ad D. Petever transmissa*

6. *Carduus Solstitialis, s. Spina Solstitialis quam Allobroges nominant* Aureolæ. Cam. Hort. *Spina Solstitialis* IB. *t. 3. Carduus stellatus luteus foliis Cyani* CBP. *ubi confundit hanc Spinam cum Carduo stellato minore* Columm. *qui et Spina Solstitialis mitior Apula eidem nuncupatur.*



Tab. CCXLII.

fig. 1 Arbor Americana foliis ad Chenopodij ampliora folia accedentibus ex Inſula Barbadenſi.

2. Chryſanthemum Helenij folio Umbone grandiuſculo prominente. ex Horto Sicco humaniſſimi viri D. Benjamin Charlwood accepi.

3. Chryſanth. Virginian. villoſum, disco luteo quinis petalis ornato.

4. Chryſanth. hirſutum. Virginianum auriculato Dulc amaræ folio octopetalon. has Chryſanthemorum Icones hoc loco adjecimus, eō quōd accuratiūs delineatæ sint quām eædem plantæ in Phytogr. noſtr. Tab. 83. adpositæ.

5. Doronicum Alpin. Pulmonariæ aureæ folio hirſuto, flore ſingulari. an Doronici Stiriaci Clusio genus alterum ex H. Patavino collectū



Tab.CCXLIII.

Fig. 1. *Conyza Afric. graveolens, capitulis argenteis. collegi apud Bromptonienses in Hort. cultiſſimo D. Georgij London. qui à Cl. D. Herman nuperrimè [accepit]*

2. *Eupatorium Bermudense latifolium flosculis pallescentibus. Silverweed nostratibus vulgò.*

3. *Eupatorium angustiori folio Bermudense floribus flavescentibus. Hogweed nostratib; dictum. [utrumq;] habuimus à Sagaciſſimo Botanico D. Jacobo Petever. & posteriorem, à Senecione Africano latiore folio nostro haud multum abludere opinamur.*

4. *Ficus arbor densioribus folijs parvis integris Ambonensis.*

5. *Ficus Sirinamensis multifido folio supernâ parte admodum scabro aversâ densâ lanugine molli. Ambaibae altera species, Ambaitinga Brasiliensi: [Pis:]*

6. *Filix palustris mas, non ramosa, pinnulis obtusioribus planis. ex Insulâ Bermudensi.*



Tab. CCXLIV

Fig. 1 *Filix Bermudensis, non ramosa, petræa, pinnulis acutioribus planis hirsutie pubescentibus.*

2 *Filix Bermudensis elegans ramosa, pinnis rarioribus profundè dentatis speluncâ rupium innascens cauliculis muscosâ lanugine refertis.*

3 *Filix ramosa procerior lacunis adnascens, platyphyllos ex insulâ Bermudensi novas has Filicum exoticarum species, cum alijs quibusdam rarioribus eximius ille Botanicus D. Jacobus* Petever *ad nos mittebat, & ex insulâ Bermudensi ab ingenioſiſſ. viro D Joanne Dickinson Pharmacopæo peritiſſimo, et amico suo integerrimo, illic pro tempore commorante, se accepiſse significabat.*

4 *Frutex coralloides marinus Virginiensis an Coralloides fruticos a Planta marina rectior* I B. *tom. 3.*

5 *Guaiacana Loto arboris Guaiaco Patavino affinis Virginiana, Pishamin dicta Parkinsono supremâ æstate floruit in Hort. Comptoniano* Fulhamiæ

6 *Gramen Bermudense frumentaceum folijs brevibus obtusis spicâ craſsiusculâ compreſsâ, antorsum gemino versu, velut in foveis gramsera G-op-Graſse noſtratibus vulgò. a D. Petever habui.*



Tab. CCXLV.

fig. 1. *Gramen Iſchæmon Bermudenſe ſpecioſius, folijs brevibus obtuſis. ab eôdem D. Petever.*

2. *Helicteres arbor Ind. Or. ſiliquâ varicoſâ, v. funiculi in modum contortuplicatâ. Iſoca Murra H. M. p. 6. Frutex Indic. fructu è Styli apice egreſſ*
sextuplici funiculo in spiram convoluto constante Raij.

3. *Helicteres arbor Ind. Occident. fructu majore. Jamaicenſibus noſtratibus - Buttonwood dicta.*

4. *Heliotropium Americanum cæruleum folijs Hormini.* Dodârt. Mem. *Jacua - Acanga Braſilienſium.* Piſon. *Fedagoſa Luſitanis.*

5. *Heliotropium pumilum glabrum, Naſturtijfolicis Americanum.*

6. *Hypericum Virginianum fruteſcens piloſiſſimum. an Hypericum fruteſcens flore tetrapetalo decuſſato, s. Crux S*[ti] *Andrææ. D. Baniſter.*

7. *Lappula Bermudenſis Althæoides ſpicata, fructu orbiculari majore, à D. Petever.*

8. *Larix conifera ex* Promont. Bonæ, *Spei. in H. D. Georgij London collegimus.*

TAB. CCXLVI.



Tab. CCXLVI.

Fig. 1. *Lyſimachiæ ſpicatæ ſimilis, Perſicæ folio. Planta Inſulæ Barbadenſis, floribus ex luteo-albicantibus.*

2. *Lilio-narciſſus Indicus, s. Narciſſus Liliflorus aureus ſtrijs argenteis pictus, florib. amplis cernuis, gemellis, caule magno cepæ fiſtuloſo.* HRH.

3. *Millefolium exotic. Abrotani fæm. folijs tomentoſum. an Millefol. incanum Creticum.* CBP. *quod ſub. 3. in Prod. deſcript. Stratiotes Millefolia* Hon. Bdl. ep. 2. ad Cl. us

4. *Morifolia Virginienſis arbor Loti arboris inſtar ramoſa, folijs ampliſſimis. Morus Virginiana lacteſcens latiſſimo folio.* H. Beaum. *Corylus maxima folio latiſſimo Virginiana.* Hort. Compt. Raÿ. *an Quautlatlatzin Mexicenſibus, s. Arbor crepitans.* 2 Hernand. *p. 88.*

5. *Nux Juglandis folio minor è Vera cruce.* HRH. *forte Nux Jugland. folio Curaſſavicæ fol. minorib.* PBP.

6. *Onobrychis Maderaspatana, diphyllos minor, ſiliculis hirſutis. an Nelam-muri.* H. M. *part. 9. à D. du Bois. accepimus.*



Tab. CCXLVII.

Fig. 1. *Olea Malabarica Fraxineo folio è Maderaſpatan. Arbor Indica Fraxino ſimilis, Oleæ fructu.* CBP. *Nimbo* Acoſtæ. *Ariabepou* HM. *part.* 4.

2. *Ophris bifolia paluſtris noſtras. Bifolium paluſtre.* Park. *hujus exemplar amiciſſimus Vir & in rebus Botanicis exercitatiſſimus D. Samuel Dale Pharmacopæus. & Medicus Braintrjenſis, ad nos benignè tranſmiſit.*

3. *Papaver Argemonè dictum flore flavo perpuſillum. an Argemonè Alpina Coriandri folio.* CBP. *Argemone lutea.* Ponæ.

4. *Phyllanthos Americana anguſtiori & longiori folio ramoſa, caulescens. ab Hemionitidi affini folio ſimpliciter pinnato Phytogr. noſtr. Tab.* 36. *plurimum differt. fortè Phyllanthos Americana frutex flores è ſingulis foliorum crenis proferens* PBP. H. Beaum. *Hippogloſſo forte cognata foliis Oleandri ſerratis.* Br.

5. *Phyllanthos Americ. ſinuoſis foliis longis craſſis & carnoſis. Opuntia in modum florigera. Opuntiæ fortè affinis Sirinamenſis è ſiliorum crenis nova folia producens.* H. Beaum. *Nepalxoch-Cuet-Altiquini Mexicenſib.* Ioan. Terent. *apud* Recch. *fortè etiam Carambaya Braſilienſib.* Marcgr. *quoad deſcriptionem.*

6. *Portulaca Curaſſavic. lanuginoſa Kali folio erectior Phytogr. Tab. 105. cum additamento floris ejus pentapetali.*

7. *Portulaca lanuginoſa procumbens Vermiculatis foliis, floribus tetrapetalis amœniorubentib. capſulis nonnihil acuminatis ex Curaſſau.*



Tab.CCXLVIII.

fig.1 *Phyllitis. Lingua cervina maxima undulato folio auriculato per baſim.* HRP. *an Phyllitis criſpa.* IB. *tom.3.*

2. *Phyllitis ſeu Ling. cervina minor criſpa, folio multifido ramoſa. Lingua cervina minor criſpâ, uno pediculo trifolia.* HRP.


3. *Portulaca ſcandens Acetoſæ ſubrotundis folijs cæſijs Americana.*

4. *Potamogeiton maritim. puſillum alterum* Raij. Hiſt. *Potamogiton marit. puſillum alterum, ſeminib. ſingulis longis pediculis inſidentib. ejuſd.* Raij Syn.

5. *Rubia quadrifolia lævis Cretica flore purpureo Patavinorum.*

6. *Rubia tetraphyllos glabra latiore folio Bermudenſis, ſeminibus binis atropurpureis. à D. Petiver. habuimus.*

7. *Tulipiferæ Americanæ, exactior Icon quàm in* Phytogr. *noſtra. Tab. 117. exhibetur.*



TAB. CCXLIX

fig. 1. Vitis vinifera ſylveſtris, Americana, folijs, averſâ parte, denſâ lanugine, tectis. White Foxe Grape Noſtratibus dicta. hujus ramulum, ſingulari amicitiâ nobis Communicavit Botanicus ille exercitatiſſimus D. SAMUEL DOODY, qui tandem ad Horti Medici apud CHELSEIANOS ſuburbani, ab AMPLISSIMA SEPLASIARIORUM LONDINENSIUM SOCIETATE Præfecturam, jure meritiſſimo evocatus eſt.


2. Arbor Americ. folijs â Concurſu nervorum, imâ parte, longiùs productis, Subtus lanugine candicante tomentoſis Rotenniſſade â SIRINAMENSIBUS dicta

3. Arbor Americana Malabathri Subrotund. folijs, ſubtùs lanugine ferrugineâ villoſis. ex SIRINAM.

4. Arbor Americ. latiori & acuminato folio trinervi, utrinq glabro, & margine leviter crenato, Meſpilboom BELGIS, SIRINAMENSIBUS nuncupatur.

5. Arbor SIRINAMENSIS Canellæ folio, maximo, utrinq glabro.

B



Tab. CCL.

fig. 1. *Arbor Sirinamensis & Antegoana foliis venosis, supernâ parte glabris, subtus densâ lanugine Veluti instar velatis.* Pau-boom *Belgarum.*

2. *Arbor Americ. ampliori folio trinervii inferius albâ lanugine incano forte Arbor racemosa Brasiliana foliis Malabathri* Br. Cent. *forte etiam Muiva Brasiliensib.* Marcgr. p. 117.

3. *Arbor Americana densioribus foliis, pronâ parte, villosis, supinâ splendentibus glabris. Cinamomum putatum ex* Sirinàm.

4. *Arbor Americ. fol. prægrandi, acuminato venuste venoso, aversâ parte villis virentibus obsito, ad pediculum strictiori.*

5. *Arbor Sirinamensis Hydrolapathi foliis, fulvâ lanugine, pronâ parte villosis. Gumme-boom à Belgis* Sirinamensibus *nominatur.*

6 *Arbor Americ. prælongo & angusto mucronato folio, inter Garyophyllum & Piper Orientale medio sapore aromatico. ex Sirinàm variæ adhuc Arbores quibus folia sunt trinervia, & quodammodo etiam specie differentia, in* Viridario *nostro vivo servantur. Hæc autem accepta referimus Munificentiæ maxime* Reverendi D.ni de Marees *Stirpium rariorum æstimatoris eximij. & coronidis* gratiâ, *huic Appendici adjicere nos curavimus.*

[illegible]

Abbreviata Hortorum, Librorum, Autorumque in *Phytographia* citatorum, Nomina, hic explicanda veniunt.

Ac. Reg. Par. Academia Regia Pariſienſis.
Acoſt. Chriſtophori Acoſtæ Hiſtoria Naturalis *Ind. Or.*
Act. Hafn. Caſpari Bartholini Acta Medica Hafnienſium.
Adv. Adverſaria Penæ & Lobelii.
Alp. de Pl. Ægypt. Proſperus Alpinus de Plantis Ægypti.
Alp. de exot. Proſper Alpinus de Plantis exoticis.
Aman. Charact. Pl. Pauli Amanni Character Plantarum.
Aman. H. Boſ. Pauli Amanni Hortus Boſianus.
Andr. Cæſ. Andreas Cæſalpinus de Plantis, lib. xvi.

Baniſt. Joannes Baniſter in Catalogo Stirp. Virginienſ.
Belluc. Ind. H. Piſ. Thomæ Bellucii Index Horti Piſani.
Bocc. Paulus Bocconus de Plantis rarioribus Siciliæ, *&c.*
Bod. à Stap. Joannes Bodæus à Stapel. Comment. in Theophraſt.
Bont. Jacobus Bontius in Hiſtoria Naturali *Ind. Orient.*
Bot. Monſp. D. Magnol Botanicum Monſpelienſe.
Boym. Michaelis Boymii Flora Sinenſis.
Br. Cent. Jacobi Breynii Centuria prima.
Br. Prod. 1 *&* 2. Jacobi Breynii Prodromus primus, & ſecundus.
Br. Faſcic. Jacobi Breynii Faſciculus rariorum Plantarum.

C. B. P. Caſpari Bauhini Theatri Botanici Pinax.
C. B. Phyt. Caſp. Bauhini Phytopinax.
C. B. Prodr. Caſpari Bauhini Prodromus.
Cam. H. Med. Joachimi Camerarii Hortus Medicus.
Cat. H. R. P. Catalogus Horti Regii Pariſienſis.
Cat. H. R. B. Catalogus Horti Regii Bleſenſis.
Cat. H. Joncq. Catalogus Horti Joncquetti.
Cat. MSS. H. Oxon. Catalogus Manuſcriptus Horti Oxonienſ.
Cat. H. Ac. Lugd. Catalogus Horti Academici Lugdunenſis.
Cat. Amſt. Catalogus Horti Medici Amſtelodamenſis.
Cat. Edinb. Catalogus Plantarum Horti Medici Edinburgenſis.
Cat. H. Beaum. Catalogus Rariorum, Horti Beaumontiani.
Cat. Altorf. Catalogus Altorfienſis per Mauritium Hofmannum.
Cat. H. Lipſ. Catalogus Horti Lipſienſis.
Cat. Groning. Catalogus Plantarum Horti Groningenſis.
Cat. Pat. à Tur. Catalogus Patavinus Georgii à Turre.
Cat. Sileſ. Catalogus Stirpium Sileſiæ per Caſp. Swenckfeldium.
Chab. Chabræi Sciographia Stirpium.
Cluſ. Hiſt. Carolus Cluſius in Hiſtoria Rariorum.
Cluſ. Exot. Carolus Cluſius in Exoticarum Hiſtoriâ.
Cod. Bent. Codex Bentingianus *Illuſtriſſ. Comitis Portlandiæ.*
Cod. Compt. Codex Comptonianus *Reverendiſſ. Epiſcopi Londinenſ.*
Col. Ecph. Fabii Columnæ Plantarum Ecphraſis.
Col. Phytob. Fabii Columnæ Phytobaſanos.
Corn. de Pl. Canad. Jacobus Cornutus de Plantis Canadenſibus.
Cort. Jacobus Antonius Cortuſus Horti Patavini Præfectus.

Dod. Mem. Dodarti Memoires. Gallicè.
Dod. Dodonæi Pemptades Plantarum.

Eph. Germ. Ephemerides Medico-Phyſicæ Germanicæ.

Flac. Deſcr. Madag. Flacourt Deſcriptio Inſulæ Madagaſcar.
Fl. Bat. Flora Batava.
Floril. Ren. Florilegium Renovatum Joan. Theodori du Bry.
Frag. Joannes Frago ſus de utriuſque Ind. Simplicibus. Hiſpanicè.
Frid. Cæſ. Fridericus Cæſius Princeps in Tabulis Phytoſcopiæ.
Fum. Hiſt. Fumei Hiſtoria general. Ind. Occidentalis.

Gall. Preſſ. Gallus Preſſanus de Re Ruſticâ.
Garz. Garzias ab Horto de Aromatis.
Ger. Emac. Joannes Gerardus Emaculatus à Jonſono.

Hern. Franciſcus Hernandez. In Hiſtoria Mexicanâ.
Hiſt. Lugd. Hiſtoria Lugdunenſis. Volumina duo.
Hond. Hondii Geographia.
Hon. Bell. Honorii Belli Epiſtolæ de Plantis ad Cluſium.
H. Mal. Horti Malabarici. Volumina X.
H. Reg. Hampt. Hortus Regius Hamptonienſis.
H. R. P. Hortus Regius Pariſienſis.
H. R. B. Hortus Regius Bleſenſis.
H. Ac. Oxon. Hortus Academicus Oxonienſis.
H. Ac. Lugd. Hortus Academicus Lugdunenſis.
H. Ac. Pat. Hortus Academicus Patavinus.
H. Amſt. Hortus Medicus Amſtelodamenſis.
H. Compt. Hortus Rariorum Comptonianus.
H. Morg. Hortus Medicus D. Morgani apud Weſtmonaſterium.

H. Triumf. Hortus Baptiſtæ Triumfetti apud Bononienſes.
Hugh. Gulielmi Hugheſii Medicus Americanus. Anglicè.
Hyac. Ambr. Phyt. Hyacinthi Ambroſini Phytologia.

Ic. Lob. Lobelius in Iconibus.
Ic. Rob. Icones Roberti.
Imp. Ferrantes Imperatus in ſuâ Hiſtoria Naturali. Italicè.
Ind. Or. Indiæ Orientalis. Partes X.
Ind. Occid. Indiæ Occidentalis. Partes X.
J. B. Joannis Bauhini Hiſtoria Plantarum Univerſalis. Tribus Tomis.
Jonſt. Jonſtoni Dendrologia.

Knox. Knox Hiſtoria Inſulæ Zeylonenſis. Anglicè.

Lal. Triumf. Lælii Triumfetti Catalogus apud Fratrem.
Laet. Joannes Laetius Hiſtoria Naturalis Indiæ Occident.
Lig. Ligonis Hiſtoria Naturalis Inſulæ Barbados. Anglicè.
Linſc. Hugonis Linſchoti Itinerarium in Orient. Indiam.
Lob. Obſ. Lobelii Obſervationes.
Lob. Ill. Lobelii Stirpium Illuſtrationes à Gulielmo How editæ.

Matth. Matthiolus in Commentariis ſuis in Dioſcoridem.
Marcg. Georgius Marcgravius de Plantis Braſiliæ.
Martin. Martinii Atlas Chinenſis.
Mentz. Pug. Chriſtiani Mentzelii Pugillus Rariorum.
Merc. Bot. Mercurius Botanicus Jonſoni.
Meret. Pin. Chriſtoph. Meretti Pinax Rer. Natural. Britannic.
Mich. Nut. Michaelis Nutii Faſciculus Herbarum.
Moriſ. Hiſt. Roberti Moriſoni Hiſtoria Plantarum Oxonienſis.
Moriſ. Umb. Roberti Moriſoni Hiſtoria Umbelliferarum.
Moriſ. Præl. Bot. Roberti Moriſoni Præludia Botanica.
Mund. Biochr. Henrici Mundy Biochreſtologia.
Munting. Abrahamus Muntingius de Re Herbariâ. Belgicè.
Muſ. Reg. Soc. Muſæum Regiæ Societatis apud Londinenſes.
Muſ. Court. Muſæum Cortenianum Interioris Templi.
Muſ. Zeyl. Muſæum Zeylanicum.

Nieremb. Euſebius Nierembergius in ſua Hiſtoria Naturali.
Nieuh. Itin. Nieuheuof Itinerarium ad Chinam.

Ogilb. Joannis Ogilbeii Atlas Anglicè conſcriptus.
Ovied. Conſalv. Ferdinandi Oviedi Ind. Occ. Hiſtor. generalis.

Park. Joannis Parkinſoni Theatrum Botanicum.
P. B. P. Paradiſi Batavi Prodromus.
Phyt. Brit. Phytologia Britannica.
Phytogr. Phytographia Plukenetiana.
Piſon. Hiſt. Gulielmi Piſonis Hiſtoria Naturalis Braſiliæ.
Piſon. Mant. Gulielmi Piſonis Mantiſſa Aromatum.
Plot. D. Plot. Hiſtoria Naturalis Agri Oxonienſis. Anglicè.
Pon. deſc. M. Bald. Joannis Ponæ deſcriptio Plantar. Montis Baldi.

Raji. Hiſt. Joannis Raji Hiſtoria Plantar. Univerſalis. Duobus Tomis.
Raji Cat. Joannis Raji Catalogus Plantarum Angliæ, &c.
Raji Obſ. Joannis Raji Obſervationes Itinerariæ.
Raji Cat. Stirp. Ext. Joannis Raji Stirpium Exterarum Catalogus.
Raji Syn. Joan. Raji Synopſis Methodic. Stirpium Britannicar.
Rawolf. Leonardi Rawolfii Itinerarium.
Recch. Antonii Recchi Rerum Medicarum Novæ Hiſpan. Theſaurus.
Redi. Franciſci Redi Experimenta Naturalia.
Rochf. *Hiſtoire des Antilles* D. Rochforti. Gallicè.

Sch. Bot. Schola Botanica Horti Regii Pariſienſis.
Sim. Paul. Simonis Pauli Quadripartitum Botanicum.
Stirb. Citric. Franciſci van Stirbeeck Citricultura.

Tab. & Tabern. Jacobus Theodorus Tabernæmontanus in Iconibus.
Terent. Terentii Notæ in Antonium Recchum.
Thal. Harc. Joannes Thalius in Sylvâ ſuâ Harcyniâ.
Thevet. Andreas Thevetus in ſua Coſmographiâ.
Tranſ. Phil. Tranſactiones Philoſophicæ apud Londinum editæ.
Triumf. Joannis Baptiſtæ Triumfetti Obſervationes.

Veſling Obſ. Veſlingii Obſervationes in Proſperum Alpinum.
Viridar. Luſit. Viridarium Luſitanicum. D. Griſleii.

Zanon. Jacobus Zanonius in Hiſtoriâ Botanicâ. Italicè.

Index Totius Phytographiæ.

Abies. tab. 1. 21.
Abrotanum mas. tab. 121. fœm. 160.
Abſinthium. tab. 1. 73.
Acacia. tab. 1, 2. 73. 121, 122, 123.
Acer. tab. 2, 3. 123. Negundo perperàm.
Adianthum. tab. 3, 4. 73. 123, 124, 125.
Æſchynomene. tab. 4, 5.
Alaternus. tab. 126.
Alcea. tab. 5, 6, 7. 73, 74. 125, 126, 127. 240.
Alchimilla. tab. 240.
Alni facie. tab. 128.
Alni-folia. tab. 115.
Alno affinis. tab. 128.
Alnus. tab. 240.
Aloë. tab. 129. 240.
Alſine. tab. 7. 74, 75. 118. 125. 128. 130.
Althæa. tab. 7, 8, 9. 74. 131. 132. 240.
Amaranthus & Amaranthoides. tab. 10. 75. 118. 132, 133.
Ambroſia. tab. 10.
Ammi. tab. 11.
Amygdalus. tab. 11.
Anagyris. tab. 133.
Anchuſa. tab. 6. 76.
Angelica. tab. 76. 134.
Angolam. tab. 12.
Animifera. tab. 82.
Aniſum. tab. 12.
Anona. tab. 134, 135. 240.
Anonis. tab. 76. 135.
Anonymos. tab. 136. 241.
Antholiſthos. tab. 136.
Anthyllis. tab. 12.
Antirrhinum. tab. 12. 118. 137.
Aphyllon aquaticum. tab. 138.
Apioſcorodon. tab. 137.
Apocynum. tab. 13. 76, 77. 115. 137, 138, 139. 241.
Arbores, & Arbuſculæ. tab. 13, 14. 77. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148. 241, 242. 249, 250.
Ariſtolochia. tab. 15. 69. 78. 148.
Artemiſia. tab. 15.
Arum. tab. 77. 148, 149.
Aſarum. tab. 15. 78.
Aſparagus. tab. 15. 78.
Aſperulæ congener. tab. 149.
Aſter. tab. 14, 15, 16. 78, 79. 149.
Aſtragalus. tab. 79.
Atriplex. tab. 16.
Auricula Urſi. tab. 79. 149.

Balſamum Caprarium. tab. 80. eſt Ricini genus.
Bandura V. Utricaria.
Bellis. tab. 17. 82. 150.
Betonica. tab. 150.
Betula. tab. 151. 241.
Biſtorta. tab. 151.
Biti. tab. 18.
Blitum. tab. 18. 151.
Braſſica ſpuria. tab. 80. 206.
Brunella. tab. 80.
Bryonia. tab. 151, 152.
Bryonioides. tab. 152.
Bucanephyllon. tab. 152.
Bugula. tab. 18. 80.
Buxus. tab. 80.

Cacalia. tab. 153.
Calabura alba. tab. 152.
Calamintha. tab. 153.
Campanula. tab. 23. 152, 153.
Carappa. tab. 153.
Cardiaca. tab. 80. 118.
Carduus, tab. 19. 81. 154. 241.
Carlina. tab. 154.
Carpinus. tab. 156.
Caryophyllus Sylveſtris. tab. 81.
Caryophyllus aromaticus. tab. 155.
Caſſia lignea. tab. 81.
Caſtanea. tab. 156.
Cedrus ſpuria Jamaicenſibus. tab. 77.
Cedrus Barbadenſibus dicta. tab. 157.
Cenchramidea. tab. 156, 157. & huc ſpectat fig. 2. tab. 77.
Centaurium ciliare. tab. 81, 82.
Ceraſus. tab. 82. 97. 157, 158.
Ceraſo affinis. tab. 157.
Cereus. tab. 29. 158.
Ceratia & Ceratiæ affinis. tab. 1. 82.
Chriſtophoriana. tab. 20. 159.
Chryſanthemum. tab. 21, 22. 83, 84. 115. 118. 159, 160, 161. 242.
Cicer Aſtragaloides. tab. 23.
Cinamomum Sylveſtre Americ. tab. 160.
Ciſtus. tab. 23. 83, 84. 161.
Citharexylum. tab. 161, 162.
Citrullus Indica. tab. 164.
Clematis & Clematitis. tab. 84. 162, 163.
Clinopodium. tab. 24. 54. 84, 85. 163, 164.
Colutea. tab. 164, 165, 166.
Conferva tab. 24. 84.
Convolvulus. tab. 9. 24, 25. 85. 166, 167.
Conyza. tab. 168. 243.
Corallina. tab. 26. 168.
Corallinum lignum. tab. 169.
Cordis Indi folio. tab. 168.
Coriandrum. tab. 169, 170.
Cornus. tab. 26. 169.
Coryli ſeu Avellanæ folio. tab. 162.
Crithmum. tab. 169.
Crotalaria. tab. 169.
Cucumis. tab. 26. 85. 170. 172.
Cucurbitifera. tab. 170, 171.
Cupi Malabaricæ accedens. tab. 171.
Cupreſſus. tab. 85.
Curini Species. tab. 171.
Cuſcuta. tab. 26. 172.
Cynogloſſum. tab. 172.
Cynophallophoros. tab. 172.
Cynoxylum. tab. 172.
Cytiſus. tab. 26. 86.

Daucus. tab. 173.
Doronicum & Doronicis affinis. tab. 86. 242.

Ebenus Jamaicenſis. tab. 89.
Ecbolium. tab. 173.
Echinophora Capſularis. tab. 173.
Elatines folio. tab. 86.
Elemnifera. tab. 173. 209. 217.
Elichryſum. tab. 173.
Elichryſo affinis. tab. 27. 86. 174.
Ephemerum Phalangoides. tab. 27. 174.
Epidendron. tab. 174.
Equiſetum. tab. 29. 193.
Erica. tab. 175.
Ericæ facie Polygonoides. tab. 28.
Ericū. tab. 175.

Eruca. tab. 86.
Eryngium. tab. 175.
Erythroxylum. tab. 175.
Eſcharoxylum. tab. 175.
Euedexylum. tab. 176.
Euonymus & Eyonymo adfinis. tab. 28. 88. 94. 115. 176.
Eupatoria. tab. 87, 88. 177. 143.
Euphraſia. tab. 27, 28. 56. 177.

Fagi foliis arbuſcula. tab. 89.
Fagotriticum Volubile. tab. 177.
Ferula. tab. 12.
Ficoides, ſeu Echinomelocactos. tab. 29.
Ficoides, ſeu Cereus. tab. 29.
Ficoides Meſembrianthemum. tab. 117.
Ficus. tab. 178. 243.
Filix, Filicula & Filicifolia. tab. 30. 89. 179. 180, 181, 182. 243, 244.
Flos Paſſionis. V. Paſſiflora.
Fœnum-Græcum Phaſeolòdes. tab. 90.
Fraxinus Alepenſis. tab. 182.
Frutex & Fruticulus. tab. 29. 31. 115. 182, 183, 184. 244.
Fucus. tab. 184.
Fumaria. tab. 90.
Fungus & Fungis congener. tab. 90. 116. 184.

Galactoxylum, tab. 185.
Galega degener. tab. 90.
Geniſta, Geniſtella & Geniſtæ ſimilis. tab. 31. 91. 185.
Geniſto-Spartium bacciferum. tab. 185.
Gentiana & Gentianella. tab. 90. 186.
Geranium. tab. 31. 186, 187.
Gladiolus. tab. 187.
Gnaphalium & Gnaphalio affinis. tab. 31. 187.
Goſſipium, tab. 188, 189.
Gramen & Graminifolia. tab. 32, 33, 34, 35. 91, 92. 119. 188, 189, 190, 191, 192. 244, 245.
Gratiola & Gratiolæ affinis. tab. 35. 193.
Guaiacum. tab. 35. 94.
Guaiava. tab. 193.

Halimus. tab. 36.
Hedera. tab. 36. 93.
Helicteres. tab. 245.
Heliotropium. tab. 36. 245.
Helleborine. tab. 93.
Hemionitis & Hemionitidi affinis. tab. 36. 247.
Heſperis prodigioſa. tab. 37.
Hieracium. tab. 37. 93. 116.
Hippuris. tab. 193, 194.
Holoſteum. tab. 37.
Horminum & Hormino accedens. tab. 194.
Hyacinthus & Hyacintho affinis. tab. 195.
Hyoſcyamus. tab. 37.
Hypericum. tab. 93. 245.

Jacea. tab. 38, 39. 93, 94. 196.
Jacobæa. tab. 39. 196.
Jaſminum. tab. 94.
Iberis. tab. 39.
Ilex & Ilicis facie. tab. 196. 197.
Imperatoria. tab. 95.
Iris. tab. 196.
Jujuba & Jujubes. tab. 197.
Juncus & Juncellus. tab. 40. 95. 197.
Juniperus. tab. 40. 197.

Kaka-Toddali. tab. 95.
Kali. tab. 95.

Lamium. tab. 41. 198.
Lappula. tab. 41. 245.
Larix. tab. 245.
Laſerpitium. tab. 96. 198, 199.
Laurifolia. tab. 96.
Laurus & Lauri facie. tab. 199.
Lauruſtinus. tab. 199.
Lenticula paluſtris. tab. 41.
Leucadendros & huic ſimilis, fortè Tocanhoca Ogilb. tab. 200.
Leucoium. tab. 42.
Leucoxylum. tab. 200.
Lichen. tab. 42.
Liguſticum. tab. 96.
Lilio-narciſſus. tab. 42. 246.
Limonium. tab. 42. 200.
Linaria. tab. 96.
Liquid-ambari arbor. tab. 42.
Lithoſpermum. tab. 42.
Locus Spuria. tab. 200.
Lotus & Loto affinis. tab. 43. 67. 96. 116. 201.
Lucinium. tab. 201.
Lupulus & Lupulo ſimilis. tab. 201.
Lychnis & Lychnidis cognata. tab. 42, 43. 97. 203.
Lychnidea. tab. 98.
Lycium & Lycio cognatus Frutex. tab. 96, 97. 201, 202.
Lyſimachia & huic affinis. tab. 43, 44. 98. 119. 202, 203.

Malva. tab. 44.
Malus Granata. tab. 98.
Malus Perſica. tab. 203.
Mameé arbor. tab. 204.
Mandarú. tab. 44.
Mangle arbor. tab. 204.
Manihot Indorum. tab. 205.
Marrubium. tab. 45. 99.
Matricaria. tab. 45.
Melanacrodryon. tab. 205.
Melanomma & Melanoxylon. tab. 205.
Melampyrum & Melampyro affinis. tab. 99. 119.
Mercurialis. tab. 99. 205.
Meſpilus. tab. 46. 99. 100.
Methonica. tab. 116.
Millefolium. tab. 47. 99. 246.
Mimoſa. tab. 120.
Mirabili Peruvianæ affinis. Baſella dicta. tab. 63.
Muſcus. tab. 44, 45. 47, 48, 49. 100, 101. 205.
Myagrum. tab. 206.
Myoſotis foliis. tab. 205.
Myoſotis Scorpioides. tab. 48.
Myrrhis. tab. 100. 206.
Myrtus Brabanticæ ſimilis. tab. 48.

Nardus. tab. 101.
Naſturtium. tab. 101. 206.
Negundo. tab. 206. perperàm. 123.
Nerium & Nerio affinis. tab. 207.
Niara. tab. 49.
Nil. tab. 101.
Ninzin. tab. 101.
Nir Schulli. tab. 49.
Nux. tab. 206, 207, 208, 209. 246.
Nymphæa. tab. 207. 209.
Nymphææ congeneri accedens. tab. 115.

Ocimum. tab. 208.
Oenanthe. tab. 49.
Olea. tab. 207. 209. 247.
Onobrychis. tab. 49, 50. 102. 246.
Ophioxylum. tab. 210.
Ophrys bifolia. tab. 247.
Orleana. tab. 209.
Ornithogalo affinis. tab. 102.
Ornithopodium. tab. 52.
Orobanche. tab. 209. 211.

Orobus. tab. 210.
Oxys. tab. 102.

Padri Malabaricæ ſimilis. tab. 53.
Pai-paroea. tab. 50.
Palma. tab. 51. 103.
Papaver Argemone dictum. tab. 247.
Paronychia Myoſotis. tab. 51.
Paſſiflora. tab. 104. 210, 211, 212.
Pedicularis. tab. 102.
Pentaphyllum & Pentaphylloides.tab.106. 210. 212.
Perfoliata. tab. 50.
Periclymenum & Periclymeni ſimilis. tab. 103,104. 211, 212, 213.
Perſicaria. tab. 210.
Petaſites. tab. 212.
Phaſeolus & Phaſeolis accedens. tab. 51, 52. 102. 105. 119. 211. 213, 214.
Phoenico-Scorpiuros. tab. 106.
Phyllanthos. tab. 247.
Phyllitis. tab. 105. 248.
Phyteuodes. tab. 215.
Piloſella minima. tab. 52.
Pimpinella Sanguiſorba. tab. 103.
Piper frutex Americ. tab. 215.
Piperi longo ſimile & reverâ idem. tab. 104.
Planta bivalvis Ind. Or. tab 215.
Plantago Coronopus dicta. tab. 103.
Plantaginis Stellatæ foliis. tab. 215.
Pneumatoxylum. tab. 215.
Polygalæ affinis. tab. 53.
Polygonum. tab. 52, 53. 103. 120.
Potamogiton & Potamogito ſimilis. tab.102. 216. 248.
Portulaca & Portulacæ affinis. tab. 105. 120. 215, 216. 247, 248.
Poutaletsjæ ſimilis. tab. 54.
Pruno Sylveſtri affinis. tab. 218.
Prunus, Prunifera & Nuci-prunifera. tab. 216, 217, 218.
Ptarmica & huic ſimilis flore hexapetalo. tab. 53. 219.
Pulegium. tab. 54. eſt rectius Clinopodii Species.
Pyrola. tab. 107.

Quercus. tab. 54.

Ranunculus. tab. 55. 106. Ranunculo adfinis. tab. 106.
Rapunculus. tab. 55.
Reſeda. tab. 55. 107. 219.
Rhamnus. tab. 55. 107, 108. 120. 218, 219, 220.
Rhus & Rhoi ſimilis. tab. 56. 107. 219.
Ricinus & Ricini fructu. tab. 56. 107, 108. 120. 220.
Ricophora. tab. 220.
Ros Solis. rab. 117.
Rubia. tab. 248.
Rubiæ modo ſpicata Euphraſiæ genus. tab. 56.
Rubus. tab. 108.

Saamoúna Piſon. tab. 56.
Sagittariæ foliis & Sagittariæ ſimilis. tab. 220.
Salix. tab. 56. 221.
Salvia. tab. 57. 221.
Sambucus. tab. 58. 221.
Sanicula. tab. 57, 58, 59. 108. 222.
Saſſafras. tab. 222.
Scabioſa & Scabioſæ capitulis. tab. 58, 108, 109, 221.
Schetti Malabaric. tab. 59. 109.
Scorpioides. tab. 59.
Scortea arbor. tab. 222.
Scorzonera. tab. 59.
Scrophularia. tab. 59.
Scutellaria. tab. 110.
Securidaca. tab. 59.
Sedum. tab. 223.
Sena. tab. 60. 223.
Senecio. tab. 60. 112. 223.
Serpentaria repens. tab. 117.
Serratula. tab. 109.
Seſamum. tab. 109.
Seſeli. tab. 60.
Sideritidis facie. tab. 224.
Sideroxylum. tab. 223, 224.
Siler. tab. 223.
Sinapiſtrum. tab. 60. 119. 224.
Siſynrichium. tab. 61. 224, 225.
Sium. tab. 61.
Smilax aſpera ſeu claviculata. tab. 110, 111. 225.
Solanum. tab. 62. 111, 112. 225, 226, 227.
Soldæ Malabaricæ ſimilis. tab. 61.
Sonchus. tab. 61, 62. 227.
Spirææ Theophraſti ſimilis. Hort. Oxon. tab. 63.
Sphondylium. tab. 63.
Spongia. tab. 112.
Stachys. tab. 64.
Staphylodendron. tab. 63.
Symphytum. tab. 227.
Syringa. tab. 64. 112. 228.

Tacamahaca. tab. 228.
Tamarindus. tab. 64.
Telephium. tab. 228.
Teucrii folio. tab. 64. 228.
Teucrium. tab. 65.
Thalictrum. tab. 65.
Thapſia. tab. 65, 66, 67.
Therebinthus. tab. 228, 229.
Therebinthi minoris æmula. tab. 64. eſt Tecomahaca fol. non crenatis.
Thlaſpi. tab. 228.
Thymelæa. tab. 67. 113. 228, 229.
Thymus & Thymum. tab. 116.
Tithymalus. tab. 43. 65. 112, 113. 118. 229, 230, 231.
Trachylepos arbor. tab. 230.
Tribulus terreſtris. tab. 67.
Trifolium. tab. 67, 68, 69. 113. 120. 231.
Triticum. tab. 231.
Tulipifera. tab. 68. 117. 248.

Valeriana. tab. 231, 232.
Valerianella. tab. 113.
Verbaſco congener. tab. 114.
Verbena. tab. 70. 232.
Veronica & Veronicæ affinis. tab. 70. 114. 232, 233.
Viburnum Americanum. tab. 114. 233.
Vicia. tab. 71, 72. 114. 233.
Viola. tab. 114. 120. 233, 234.
Virga aurea. tab. 114. 116. 235, 236.
Viſcum arboreum. tab. 117.
Vitis alba Vinifera. tab. 249.
Vitis arbuſtina. tab. 236.
Vitis Idææ ſpecies. tab. 69. 236.
Ulmaria. tab. 236.
Ulmi-folia. tab. 237.
Volubilis. tab. 69. 236.
Urtica. tab. 237.
Utricaria Vegetabilis. Tab. 237. Bandura dicta.
Uvifera. tab. 236. 237.

Wadoukæ ſimilis. tab. 69.

Xanthium. tab. 239.
Xyloboeion ſeu Lignum bovinum. tab. 238.
Xylociſte. tab. 239.
Xylomaſtix arbor. tab. 238.
Xylopicron. tab. 238.

Zanthoxylum. tab. 239.
Zarzaparilla Virginienſibus dicta. tab. 238.

F I N I S

Ray in the second Volume of his Historia Plantarum speaking of Plukenet, says

"Praeclarus Vir et in Stirpium cognitione nulli secundus."